

Sarmienta

Flor. Penn. prodr. p. 4.

Cal. 5que partibus inaequali. Cor. tubulosa. Silam 3 sterilia inclusa duo fertilia
exserta. Caps. uniloculari circumscissa

308

Sarmienta

5-fida
+ quae 4-fida

Cal. 5-partitus, inaequali. Cor. tubulosa, superne ventri
cosa. Silam. 5. 3: 2 sterilia inclusa, 2 fertilia exserta.
Caps. 1-loculari, circumscissa.

^{prodr. 4. Fl. per}
reperi. Sarmienta El Peru. p. D. t. 1. f. 6. +

Utricularia foliis carnosis, scandens Decill. Peru obs. 3. p.
by t. 43

Habitat in nemoribus Chile copiose.

Caulis sarmentosus, teres, ramosissimus. Rami dependentes.
Folia opposita breviter petiolata, ovata, carnosae, arenariae, sub-
tus albicantis, utrinque punctata. Pedunculi terminales
longi, filiformes, unis vel biflori. Bractea duo, oblongae, eas
bracteolae, sub singulis calycibus. Calyx trilobus, laciniis ^{quatuor} aequa-
lis, ^{quinto} ~~et~~ latior, emarginata. Corolla purpurea, extus pubescentis,
tubus centricosus, obovatus, basi angustissimus, faucibus
coarctatis; limbus ^{quinque} ~~et~~ profundus, laciniis aequalibus. Semina
plura. El Peru. l. 1. p. 1. per. l. 1.

pinnatus Schizanthus flexuosus. 1. pag. 13. Tab. 17.

Habitat in vasis agrorum Chili

Caulis herbaceus, villosus, villis glandulosis, erectus, bipedalis; teres, compressus; rami
alterni. Folia breviter petiolata, alterna, interrupte pinnata: foliola sessilia: ma-
jora laciniato-pinnatifida, minora lanceolata, integra. Racemi ex axillis
superioribus. Pedicelli uni flori, sili formis; bracteae duae lanceolatae ad paginam
corollae. Flores alterni. Corolla coerulea rotunda: labium superius
canaliculatum, in centro macula purpurea notatum. Elementa sterilia
villosa. Fr. Per. l. c. t. Calyx inferus