

Satureja

1. juliana S. verticillis fastigiatis, foliis lineari-lanceolatis
3. ~~thymbralis~~ S. verticillis hispida, foliis oblongis acutis
2. ~~gracia~~ S. pedunculis subtrifloris axillaribus geminis, involucrellis calycis breviori
bus.
4. montana S. pedunculis axillaribus solitariis, floribus fasciculatis fastigiatis
parvis dichotomo-paniculatis, foliis lineari-lanceolatis mucro
natis bracteis longitudine calycis
5. Capitata S. species terminalibus imbricatis, bracteis lanceolatis ciliatis, foliis
lineari-bus cuneatis
6. hortenjis S. pedunculis bifloris
7. spinosa S. ramis spinosis, foliis hispida
8. ziminea S. pedunculis axillaribus trifloris, involucrellis linearibus, foliis
lanceolato-ovatis integerrimis

Juliana l. verticillis fastigiatis, foliis linear-lanceolatis Linn. l. V

Satureya fricata Bauh. pin. 210.

Satureya perennis, verticillis fricatis et densius dispositis Monf. hist. 3.
p. 412. f. 11. v. 17. fig. 4.

Habitat in Aetunia, in Tyrrheni mari apud Florentiam 2

Caulis filiformis, ^{depressus} ~~depressus~~ ^{ramis} ~~ramis~~ ^{prostratis} ~~prostratis~~ ^{capis} ~~capis~~ ^{foliis} ~~foliis~~
~~dicatis~~ ^{apice} ~~apice~~ ^{ramis} ~~ramis~~ ^{simplicibus} ~~simplicibus~~ ^{oppositis} ~~oppositis~~ ^{ad} ~~ad ^{terram} ~~terram~~ ^{vellosis} ~~vellosis~~
foliis peltatis ^{via} ~~via~~ ^{per} ~~per ^{marginem} ~~marginem~~ ^{re} ~~re~~ ^{voluta} ~~voluta~~ ⁱⁿ ~~in ^{causa} ~~causa~~ ^{feriens} ~~feriens~~
verticillis ab ima parte ramorum (vel pedunculis) axillatis multifloris
flore fastigatis. Corolla in foliorum calycibus canescente~~~~~~

Figura 17

~~Tabula 17~~

græca l. pedunculis subtrifloris lateralibus, involuelli calyce brevis
Lin. S. V. pag. 520 Lin. Spei: pl. pag. 794

Plenopodium creticum Alp. exot. 265. t. 264.

Plenopodium minus exoticum, thymi folio majore inodorum Plukh
alm. 110. t. 104. fig. 0

Saturya annua orientalis tenuior, ad singulos nodos florifera Monf.
hist. 3. p. 411. f. 11. t. 17. fig. 2.

Habitat ad Archipelagum &

saecie convenit cum P. montana a qua differt foliis minus
mucronatis, sed proscipue corymbis florum, qui utrinque non
foli, sed bini accedunt quod bractea in hac minus in
montana vero longitudine corymbi. Folia inferiora ovata
Thymi subter purpurascantia, reliqua magis linearia: in
superiora foliorum pagina quasi mucroni splendentes:
qui relucunt a pilis nonnullis brevibus sparsis. Corolla per
mixta ha

non vidi

Thymbra L. floribus verticillatis hispida; foliis oblongis acutis Lin. I. V.

Thymbra Cretica Clus. hist. 1. p. 35. D.

Satureya cretica Bauh. pin. 210.

Thymum creticum Pons verticillatum Barr. ii. 89. D.

Habitat in Creta, Napoli

Trunculus ramosus rami villosi purpureo cinerifloris.

Folia sessilia utraque acuta, mucronata ad lentera punctis
numerose impressis et hirta, semperque utraque fasciati
foliorum in axillis hinc quasi fasciculata. Verticilli
superne in ramis multi flori. Bracteae structura foliorum
longitudine calycis hirta uti calycis profertim margine

Truncus pedalis ramosissimus rigidus rami sparsi inferne glabri
erecti.

Satureja

Calamentha cretica angusto oblongo folio Tournef.

Habitat in Creta herb. Mus.

Caules plures, pedales et ultra, superne ope lenticillofolii. Folia petiolata, lanceolata
integerrima.

hirsuta Satyræ

Hypopur maritima caespit. foliis, spicato flore & purpureo rubro hirsuta. Cup. bot. Cath.

Habitat in Sicilia herb. Mus.

Tota villosa, subhirsuta, ramosa: rami teneri. Folia sessilia, lanceolata, acuta, integerrima, unguiculata, rudimenta ramulorum in axillis. Pedunculi axillares, 4 flori, capillares, six longitudine foliorum. Bractea petalæ, uti laciniæ calycis.

Thymifolia S. ^{Corymbosi} pedunculis ramosis ~~dentatis~~, ^{sub}foliis pubescentibus ^{dentatis} Scop fl
Carn. ed. 2. Tab 29.

mihi ignota

montana l. pedunculis lateralibus solitariis, floribus saepe ciliatis serratis
foliis multinatis lineari lanceolatis l. v. *Gaigu. coll. 2. p. 132*
Wiesn. off. 109.
Saxifraga secunda Lam. ep. 717.
Saxifraga montana Bauh. pin. 210.

Habitat in Helvetia, Narbona. 4 5

Fructu pedale ~~est~~ basi ramosus. Ramis a ferre textu
culi cortice cinere superiore ad lentem hirti cinerascens.

ramuli tetragoni

folia sessilia pallida viridia utraque punctis impressis
saepe unguiculata vel ultra basi ciliata margine scabra
pedunculi axillares oppositi multiflori saepe ^{in culta} foliis

breviori saepe in paniculam foliis duplo longioribus ^{bus} dichotomis
manu extingentes cum floribus in dichotomia pedicella
saepius lineari longitudine calycis. calycis dentes
rigidiissimi subruyentes

montana pedunculis axillaribus dichotomis foliis longioribus
habet Scopoli in flora Carneolica tab 30

rupes
L. pedunculis lateralibus foliis ni secundis, foliis ovato-lanceola-
tis serrulatis Wulf. ap. Gaeyn in coll. 2. p. 130

non vidi

capitata L. floribus spicati, foliis cernatis punctatis ciliatis Lin. l. V.

^{per}
Thymum legitimum Clus. hist. 1. p. 357.

Thymus capitatus qui Dioscoridi Bauh. pin. 219.

Thymum creticum incanum capitatum Vandel. Ic. 097.

Habitat in Creta, Boetia, Hispania, Graecia Palaestina, Barbana &

erect ex ramis primis ramis oppositis subsessilibus vel sessilibus
ciliatis foliis oppositis lineari seminaquiculata margine
ciliata interdum nuda, uti selegues spec. punctata supra ciliata
ciliata folioli foliolum in axilla. Spicis terminalibus
ovato semipollinibus imbricatis. Bracteis ovato lanceo-
latis ciliatis calycis longioribus

terminalibus
ramulorum
ciliatis

Spicis terminalibus imbricatis bracteis lanceolatis ciliatis
foliis lineari cernatis

hortensis L. pedunculis bifloris Lin. S. V.

Satureja altera Cam. epist 407.

Satureja hortensis Bauh. pin. 210.

Habitat in G^o Narbonne^{si} et Italia \odot

Caulis ramosus bracteatus purpureo-piceo leviter villosus.
Folia lineari-lanceolata subpetiolata punctata unguem
cum glabripula pedunculi axillares solitarii oppositi.
folia breviores

Spinosa s. ramis spinosis, foliis hispida Lin am. ac. 4. p. 3174

Satureja cretica spinosa Bon. Ital. 21.

Satureja cretica frutescens spinosa Tournef. Corol. 13.

Habitat in Creta ⁴ ~~4~~ ⁴ usq.

Caulis pedalis fruticosus rigidus ramis in pinnam nudam ter
minatis. Folia bis apices ramulorum opposita, conferta
cuneolata, subacuta, sessilia, basi attenuata, adpressa utrin
que punctis excavatis et pilis raris rigidis albidis, cretici
marginis scabra. Her.

Inter semipedalis, ramis spinis: rami tenues, glabri: ramuli pinnati, canes
centes. Folia cuneato-lanceolata, semper unguiculata, canina punctata, ovato
armata nervo. Fiti nonnulli ad spem. Flores axillares solitarii, sessiles, que
lentis raris villosi herb. 4 usq.

siminea l. pedunculis ad illanbus trifloris, involucri lineantibus, foliis lan-
ceolato-ovatis integerrimis Lin. Am. acad. 5. p. 3994 l. v

Mentha viminea, foliis mucronibus obovatis, pedunculis trifloris alatis

Brown jam. 250.

Habitat in Jamaica

Caules tetragoni. ^{pubescentibus} folia lineata interdum ^{pubescentibus} pubescentibus tomentosa

marginibus
revolutis

interdum glabra. Flores parvi, in brevissimo pedunculo, terni
involucris universalibus partialibusque 2 phyllis, setacea,
calycis breviora. Calycis decem striis exaristatis, terminatis, denti-
bus 5, acuminatis, subaequalibus. Calicem superius trifidum
emarginatum inferius trifidum haec

Caules ramosi: rami ulloque

~~non vidi~~

S. stricta Banks

S. thymifolia } *femilis montana folis*

pulegium

rigida

thymodes

} Banks