

Satynium

eladum Satyrium bulbis fasciculatis crispis tomentosis, foliis radicalibus ovatis, petio-
latis, caule subnudo; nec tamen subtulato. Sw. prodr. pag. 119.
Helleborine foliis liliaceis, radice apphodeli minore Plum. 9c. pag. 106.

190
In mont. ferrat. legit A. Ryan.
Pauli sesquipedalis, teres, glaber, inferne subfoliosus, supeme vagina

4us.
Folia plurima radicalia, petiolata, tripollicaria, elliptica, acuta,
basi attenuata, nervosa, glaberrima: caulina inferiora
circa quatuor, alterna, sessilia, inferum sesquipollicare, reli-
qua minor, remota, ovata, superiora lanicolata, breviora, angus-
ta

Vagina pollicares caulem cingens, tubulosa
Spica terminalis, s. 6 pollicaris. Flores di. stantes, parvi. Bractea
lanicolata, germine breviori, glabra

Cordifolium Satyrium

Habitat in Canariis herb. herb.

Radix fibrosa. Caulis pedalis, erectus, inferne penna Cygnea. cespitiosus, glaber, lani-
folia duo in caule, remota, cordata, amplexicaulia, acuta, venosa, glabra, byol-
leatari - Spica hypoleucis vel parum albis, pinnatis - Bracteae lanceolatae,
longitudine germinis - Labium tripartitum & lineare.

Carnea *Orchis* corolla galea bicolorata, bracteis erectis Hort. Kew. 3. p. 294.

Habitat in Capite bono speciei

Bulbi indivisi. Differt ab *O. bicorne* foliis subrotundis subtus sulcatis; spica compacta; bracteis subrotundis, acutis, erectis. Flores inodori, intus albi extus carnei. Petalis duobus supremis et inferum reliquis angustiora, omnibus extus cinnatis, carina decurrente in germine unde frequenter costatur columna fructificationis longitudine galea Hort. Kew.

biflora Onchis corac Nestani lobis lanceolato acuminato: alis patentibus lin

Am. acad 6. pag. 109 92 + L. V. pag. 807.

Habitat in Cap. bono frai

Publi. indici
folia radicalia aliquot ovata parva. Scapus filiformis, saginis 3. f. 4 foliaceis
Flores saporis duo ad apicem fr. api. Petalum superius breve acuminatum
calicem longitudine petali: duo interiora linearia apice bidentata, fultus
lobo notata, sub superiore occultata ejusdemque longitudinis genitalia
amplexantia. Petala lateralia 2. lanceolata, reliquis longiora patentia
labellum oblongum, apice attenuatum, inter petala lateralia prostratum

non vidi

grandiflora L. Cornu petalis brevior, caula febbi floro lin. Suppl. p. 406. +
S. V. pag. 877.

Orchis africana, flore singulari herbaceo Raj. hist. vol. 3. p. 886

Dica uniflora Berg. Cap. pag. 340. Tab. 4 fig. 7.

Habitat in Cap. b. pr. 2

Caulis erectus pedalis, simplicissimus, laxis vaginatus. Foliai caule
breviora, radicalia lanceolata linearia. Caulina vaginatis
alterna, una remota, lamina lanceolata acuminata vaginis
brevior. Flor terminalis pedunculatus, inclinatus. foliata
nisi raris gemini: posteriorum pedunculo e spathe prioris
longiore lin. flori multo huius maior quam in reliquis speciebus

Grandiflorum. S. galea unicalcarata labello lineari setaceo, foliis
ensiformibus, apice caule unifloro.

racemosa δ cornu petalis brevior, floribus racemosis Lin. Supp. p. 406

L. V. p. 217.

Habitat in C. bono per 2

Folia radicalia ^{resquipolesiana} lineari canaliculata glabra acuta basi
vaginantia. ^{vaginantibus} Caulis erectus, ^{vaginatus} foliis tribus vel quatuor
remotis super in folium patulum desinen-
tes ^{vaginantibus} cernatim unguiculare. Flores 6-8 versus apicem
pedicellati. Bractea lanceolata longitudine pedicelli.

Secundum Pat. galea unicalcarata labello filiformi, spica secunda
caule fletuoso Thunb. prodr. pag. 4.

an eadem ac Patyrum capense Descript. desumpta
a specimine herbarii a Dr. La Mark. communicato

Copeage *S. nectarii* labio latiore obtuso emarginato utrinque undulato lina
Am. 6. pag. 110. n. 93. *S. n. 1809.*

Habitat in C. bono spec. 2

Folia radicalia aequor linear lanceolata substrata fructa. Scapus
foliis alternis, amplexicauli vaginantibus, acuminatis breviori-
bus. Racemus latus. Bractei lanceolati multinervi. Pedun-
culi longitudine florum. Corolla pedalis. subequalia lanceolata
proter labellum latius, reliquorum longitudine, apice obtusi-
simum emarginatum utrinque in medio dente obtuso; huius post-
ice calcar brevissimum obtusum. 5.

Salypium?

Habitat in Cap. b. p. ei

Radix fibrosa

Caulis Scapus petalis foliolis quatuor vel quinque ovato lanceolatis
amplexicaulibus remotis unguicularibus. Bolia radicalia lanceola
ta plura bipollicona angusta. Pica bipollicona floribus distan
tibus paucis. Bractea lato lanceolata longitudine ger sex germi
nis petala duo externa oblonga acuta, interna minora, quantum
subrotundum fornicatum postice cornu brevi obtuso

an *Salypium* hians Lin. *Salypium capense*
sub no. 10 inter *Salypia* herb. invenitur

ferrugineum S. galea unilaterata, labello lancolato cuspidato, spec
multiflora Thunb prodr. pag. 5.
Habitat in cap. b. spei

non vid.

refertur

P. galea unicolorata, labello lancolato cuspidato, spica
multiflora, foliis ensiformibus distincti Thurb. prod. v.
pag. 5.

Habitat in Cap. b. spei

non vidi

Vri petaloides O corolla galea fimbriata obtusa, nectario lanceolato mai-
me, foliis lanceolatis Lin. suppl. p. 390 + L. V. p. 007
Habitat in Cap. bono frei
Caulis pedalis lavis. Folia radicalia plurima caulina alterna
cristata 8, pollicaria amplexicaulia. Spica multiflora. Flores
alterni diffusi. Petalum primum ^{infracti} postice cornu conico lon-
gissimo. 2. 3. tum oblonga, brevissima. 4. 5. tum subrotunda paten-
tia reliquis majora

etelsun S. galea uniuersi arata, labelle lanceolato, foliis
lanceolatis Thunb. prodr. pag. 51.

bifidum S. galea unicalcarata, cornu bifido, labello lanicolato

Thunb. prodr. pag. 5

Habitat in Cap. b. Spei.

non idi

guttalis O corolla galea breviter, labio lanceolato. Lin. Suppl. 399 + S. V
pag. 007

Habitat in Cap. b. frei

Folia radicalia quatuor. f. quinque caule dimidio breviora, lanceolata obtu-
suscula. Caulis prostratus totus vestitus vaginis foliaceis membranaceis
acutis. Spica brevis. Petalum primum ^{acumine ~~protrusato~~} acutis retro
spicantibus; postea corne brevi. 2. 3 genitalibus appropita, valde acu-
minata, basi lata, supremo non breviora. 4 et 5 tum elliptica longitudine
reliquorum

Sagittale O. galea unciali carata, labello lanceolato, foliis lanceo-
latis spica laxa Thunb prod. pag. 8.

Draconis O bulbis indivisis, nectario lineari apice ovato Lin. Suppl. p. 460 t. 5. v.
pag. 807

Habitat in Cap. bono spei 2

Scapus sesquipedalis, crassitie penno an penno, vaginatus totus
foliis. Folia radicalia lanceolata, latitudine pollicaria, basi
demidio breviora. caulena tota vaginantis, reticulato-venosa
acuta. Spica florum paucis remotisifidulis. Bractea lato
lanceolata, reticulato-venosa, longitudine germinis. Petalum
majus ^{pub} ~~formicatum~~ ^{ovatum} ~~in~~ ~~ma~~ ~~lanceolata~~ ~~obtusifidulata~~ ~~postic~~
ca calicem longissimum. Petala lateralia lanceolata duo
utrinque labium lineare apice ovato longitudine petalorum
germen pedicellatum

Draconis I. galea unicalicem, labello lineari apice dilatato, spica
fastigata Thunb. prodr. pag. 5

Cernuum Sat. galea unilaterata, labello lineari, foliis distinctis un-
dulatis Thunb. prodr. p. 5.
Habitat in Cap. s. spei

non vidi

Senella O Corolla galea basi conica, nectario linearis Len Suppl. p 400. *

S. V. pag. 807

Habitat in Cap. boreo sui

Planta longitudine pollicis facie Ophrydis alpino. Folia radicalia
et caulina linearia angustissima longitudine fere plantae. Spica ob
longa: floribus quinque ad octo. Petalum primum ovatum, postica
cornutum basi conica. Secundum et tertium conniventia sub
primosomelia. 4 et 5 lateralia, patentia. Labium lineare.
Lun

Senellum G. galea uniuersa ornata, labello linearis oblongo. foliis
sericeis Thunb. prodr. pag 5.

totum lat. galea unidicantata. Labello lineari canalicolato, caula
flexuoso Thunb. prodr. pag. 5.
Habitat in Cap. b. spei

non vid.

Cylindricum S. galea unica allosa, labello ovato, foliis oblongis nerv
vosi Thunb. prodr. pag 5.
Habitat in cap. b. spec.

non vidi

cornuta 0 bulbis in di Corolla labio minimo subovato, alis patentibus
Linn. S. V. p. 007. Amer. acad. 6. pag. 109 91. *

Habitat in C. bono per

Bulbi in d. v. folia spica multa, alterna, magna lanceolata, basi
vaginantia. Spica laxa. Bracteae lanceolatae, flore longiores. Corol-
lae galea fornicata, oblonga, obtusa. Cornu obtusum breve germi-
ni incumbens. Petala duo lateralia externa oblonga, galea breviora
apice carnosae, crassiuscula, sub galea fere conniventia Lin.

Sat. cornuta var. galea unilobata, labello ovato integro, foliis orb-
iculis Thumb. prodr. pag. 5

~~flexuosa~~ ^{caulis flexuosus}
flexuosa O. caule flexuoso, petalis duobus lineatis furcatis Lin. Suppl. p. 398
~~flexuosa~~ ^{V. pag.}
flexuosum Habitat in Cap. b. p. 4

Capus semper alis filiformis, supra foliolum caulinum flexum
folia radicalia ovata, basi in petiolum attenuata via pedicula
na. Caulina semunquiculana basi vaginaria remota,
lanceolata tria s. quatuor. Recemus floribus 3 s. 5. remotis
pedicellatis. Petalum superum ascendens asurgens, postice
calcaratum: calcar longitudine floris exserto. 23 brevia
linearia apice bidentata. 2 int. 2 extenora lanceolata
primo paulo longiora. Calbum subulatum, basi utraque dente
notatum.

flexuosum Sat. galea uniuersali ovata, labello ovato crispo
caule flexuoso Thunb. prod. pag.

a Thunb. flexuos. Spec. et Suppl. congruuntur

Spathulata D. bulbis indiviso, labio cordato longissime pedicellato Lin Suppl.
pag. 390. S. V. p. 007

Habitat in C. bono p. 4

Folia radicalia, plurima, linearia, caule dimidio breviora. Sica
perispermata, vaginata. foliis acutis f. anopis, latioribus.
Flores saepius duo, alterni. Germin oblongum, pedunculatum
Corolla galea pedicellata, brevissime calicata, cordata. Petala
duo lateralia ovata, acuminata. Labium pedicello filiformi
flore duplo longiore

Spathulatum S. galea unicalicata Labello petiolato ovato
trifido, foliis lineantibus Theat prodr. pag 5

Bractea ad basin geminis ovata. flo. altere filis altere pedunculata
latus. Vagina remota

spathulata O corolla galea calcarata bulbis caducis, petalis duobus linearis
fasciatis

barbata O. Corolla galea excisa, aestivo subtrifido ciliato Lin. Suppl. p. 399x

S. V. pag. 807

Habitat in Cap. bono spei

bulbi oblongi, indivisi, pilosissimi. Scapus pedalis aphyllus, composita penna
anferis. Folia plurima setacea linearia: alia breviora: alia per se
ni longitudine. Petalum supremum ovato. calicari exciso. Lateralia
ovato oblonga magnitudine supremi, patentia, interiora breviora
ad latera genitalium. Labium lanceolatum, ramis ciliatum, ciliis
obtusis longitudine floris. Germen recurvatum lin.

barbatum L. Galea unciali arata, labello ovato multiparti
to, foliis linearibus filiformibus Thunb. prodr. pag. 5

bicornis *Onchis bulbis indivisis, corolla galea bicarata*, bracteis reflexis

Hort. Kew. 3. p. 294 *

Onchis bicornis bulbis indivisis, corolla galea bicarata; labio quinque partito Lin. l. V. pug. 207 Am. Acad. 6p. 108 * 90.

Onchis lutea caule geniculato Buxb. ont. 3. p. 6. tab. 6.

Habitat. ad. Cap. b. Spei 4

Diffusa carnea foliis ovato oblongis subtus lineatis. spica cava; Bracteis ovato-lanceolatis, reflexis, flores fragran-
tissimi odore Caryophyllorum & viridi flavescendes; petala tria inferiora angustiora breviora; columna fructi-
ficationis galea brevior. H. Kew

Capus crassus digitis minimis vagis lobis latis. Bractes flore longiores.

Solea radicalia 2 cordata opposita. caulena 3 f. 4 cutellata
Corolla galea fornicata acuminata labio inferiore annexa
Labellum quinquepartitum lineare: laciniis dyqualibus
Styli corpus oblongum, incurvum, sub apice lobis 2 rotun-
datibus bracteis cordata

vide

bicolorne Salypnum galea bicolorata, cornibus filiformibus, foliis
obtusatis cucullatis Thunb-prodrum. pag. 6

Orobanchoides. Corolla galea postice biloba subbicornata, foliis bifariis
Suppl. pag. 412. 402. t. V. 112.

Habitat in Cap. bon. spei

Racis orobanche. Folia lanceolata caulem ~~vaginantem~~ lineam
bifariam. Spica caule longior, bifaria, dense imbricata
Corolla galea monophylla, obtusa dorso biloba, postice ~~emittens~~
cornicula duo brevissimè obtusiuscula. Labium obcordatum,
concarinè distinctum. Stamen machinula oblonga, subgalea
apice labello bilobo, basi dentibus duobus subulatis. Nectari
infar. Germen contortum

— galea bicarata, cornibus obtusis brevibus, foliis
ensiformibus. Distichis Thunb. prod. v. pag. 6.

mea forte diversa a haec non vid.

vaginatum - Satyrium

Halitid in Cap. b. p. i. La Mark

Caulis ^{crassitie digni} pedalis teretis vaginis foliaceis amplex. lanceolata tri. lat. i
Spica tri. pollic. anis. Bractea late ovata longitudine floris
Galea magna concava postice bicalcarata calcantibus
Longitudine galea apice foveolata labello ovato ascendente
pistala externa nulla interna duo linearia obtusa. Labium tripartitum
lacinis lateralibus oblongis obtusis intermedio lineari longitudine
lateralium obtusis. Columna staminum pedicellata apice folio trilobo
terminata filamenta duo flava linearia basi membranata biloba sursum in
cucullo mascululo staminum inserta anthera oblonga

Orchis bicornis La Mark

an bracteatum Kunth.

bealcaratum Satyrium

Habitat in C. b. p. p.

Caulis tectus vaginis folia cui ovato lanceolata pollicantibus
folia in meo defunt. Bractea ovato lanceolata erecta longi-
tudine graminis. Labium trifidum laciniis lanceolatis. Super-
num oblongum postice cornu gemino filiformi longe
germine longioribus. Nectarii calicis nullum

offens. Orch. bealcarato

~~anstratum Thuabergii~~

periculum - S. gallica bicarinata - cornibus obtusis brevibus; foliis
- ovatis acutis Thunb. prodr. pag. 6
Habitat in Cap. b. spei

non vid.

Stratum L. galea bicallosa, foliis ovatis callosis cucullatis, bracteis rhombicis eratis acutis Thunb. prodr. p. 6
Habitat in Cap. b. Spei

bic-allosum *Syzygia bic-allosa*, foliis ovatis nervosis, bracteis
cuneolatis setaceis erectis Thunb prodr. p. 6.
Habitat in Pop. b. spei

non vidi

bracteata 6 specia bracteis longioribus mixta, lobis trilobis. Lin. Suppl. pag 403. &
S.V. pag.

Habitat in Cap. b. spec.

Bulbi subrotundi. Caulis prostratus. Folia radicalia ovata,
nervosa. caulina ovato-oblonga, plura. Specia multiflora,
densa, intermixta bracteis flore longioribus, ovatis, patenti-
bus. Petalum superius subrotundum foveolatum. Labium
brevis trilobum l.

bracteatum 5. galea bracteosa, foliis ovatis trinerviis, brac-
teis reflexis. Therab. prod. pag. 6.

hircinum Sat bulbis indivisis, foliis lanceolatis, nectarii labio trifido: intermedia
lineari obliqua prominosa Lin. ment. 487. Gayo fl. Austr. vol. 4.
p. 367

Orchis barbata foetida Bauh. hist. 2. p. 756. Vaill. parist. tab. 30. fig. 6
Sequ. veron. tab. 15. fig. 1.

Orchis barbata odore hirci, breviora latioreque folio Bauh. pin.
20. Monf. hist. 3. p. 491. f. 12. t. 12. fig. 9

Orchis radicibus subrotundis, labello longissimo, triplicitate pleia
to ~~tab. 25~~ Hall. hist. ~~tab. 25~~ 1268. tab. 25.

Habitat in Europa australi, siccis foliorum ~~textu~~
Caulis interdum bicultralis. ^{et ultra interdum prostratus cetera} folia radicalia ovata ob
longa bi pollicaria caulina vaginaria lanceolata
spica multiflora saepe pedalis. Stipulae lineari subulatae
longitudine flori pollicares. Petala 3 ~~et~~ tenora ovata
obtusata in galeam conniventia. interna parva subula
ta ~~labium~~ latius laterales semungulares subulatae
undulatae intermedia sesqui pollicaris basi angustior supra pubescens
nectarii cornu germine triplo brevior. Germen fusiforme

unde *Satyris bulbis palmatis, foliis oblongis obtusis, rectarii labio linearis trifido:*
intermedia obsoleta haec Mont. 400. Fl. Jan. 77.

Orchis palmata flore viridi Bauh. prod. p. 30. pin. 06.

Orchis palmata, flore galeniculato, dilute viridi Loef. p. 102. p. 59

Orchis radicebus palmatis galea connivente, labello trifido
calcare brevissimo Hall. hist. 1269. tab. 26.

β. *Orchis palmata batrachites* Bauh. Pin. 06. Vaill. Panf. 153. 131.
fig. 6. 7. 0.

Habitat in Europa frigida aperi.

Caulis palmaris. Folia quatuor in caule basi vaginantia, remota
3 inferiora oblonga multinervia pollicaria simplicia
supremum lanceolatum acutum sessile. Spica sesquipedalica
nis. Bractea lanceolata flore longioris. Petala pallide
viridula tria exteriora lanceolata galeam formantia duo
interiora subulata. Labium dependens, lobis linearibus lateralibus
longioribus. Calicis brevissimi obtusissimi

albidum l. bulbis fasciculatis, foliis lanceolatis, nectarii labio trifido acuto.
intermedia obtusa Mant. 408 & C. Dan. 115

Pseudo Onchis alpina flore herbae Muck-gen. 30. 4. 26.

Onchis radicibus confertis teretibus calicem brevissimum, labello trifido. Hall. bot. 1270 tab. 26.

13. Flore purpureo Hal. l. c.

Habitat in Europa praesertim sylvaticis ^{remota} in fenoia basi vaginante

Caules semipedalis. Folia 4-5 in caula duo inferiora oblonga
obtusum ^{basi parum angustiorum} duo intermedia lanceolata. supremum subulatum

Spica sesquipollicaris cylindrica. Flores parvi albi

Bractea longitudine floris. Petala ^{lanceolata} 3 exteros lanceolata

galeiformia. cornu gemine dionido brevius apice parum
curvo. lacina limbi acuminata intermedia longior obtusior

regnum sat bulbis palmatis, foliis linearibus, nectari calice reflexo indur.
v. fol. l. v. Mant. 488. Jacq. Austr. t. 368. Fl. Dan.

Palma christi minor Cam. epist. 627.

Orchis palmata angustifolia flore nigro Bauh. Pin. 86. Segu. Ver. p.
1735. 15 fig. 17.

Orchis radicibus palmatis, spica densissima, flore reflexo, calice breviss.
limbo Hall. bot. fl. 1291. t. 27.

Habitat in alpebus helveticis, Norvegia et Japonia.

Caulis palmans. Folia radicalia plerumque caulina 3. 4. linearia
angusta bipollicaria. Spica ovata ~~conica~~ densa. Sepala bracte
teo opermine longius valde acuminata. Flo. saturate purpureus
interdum roseus. Petala patentia lanceolata interiora minora.
Labium ovato lanceolatum reliqui majus denticulata. Cornu. minu
to

Epipogon l. bulbis compressis dentatis, caule vaginato, nectarii labio reflexo
nato indiviso Tacc. fl. Austr. v. 1. t. 84

Epipogon Gmelin fl. Sib. 1. p. 12 tab. 2. fig. 2.

Epipactis caule aphylo flore se supinato, labello, ovato lanceolato
calicem ovato turgido. Hall. bot. 1209.

Abitat in Sibiria, Austria et Helvetia *sterilissimis umbratis*

Radix oph. Cralloribus Tolia nulla. Si apud pedali tener
debilis ea inferne vagina membranacea vestita, superne squa
ma ovata. ^{et flore + magis} Spica uniflora. Bractea lanceolata. Petalo
lanceolata duo interiora subulata longiora. Labium lanceolatum
basi appendiculo utraque ovato. Calicis longitudine labii
superum curvatum latitudine fere labii obtusissimum
Germe oblongum pedicellatum

plantagineum lat. bulbis filiformibus, caule glaberrimo, foliis ovatis petiolatis
vaginantibus, nectarii cornu incrassato, labio bilobo, medio acumi
nato Sw. prod. pag. 110

Sedynum plantagineum bulbis fibrosis, foliis caulines ovatis petiolatis
nectarii labio integro An. Aman. 5. p. 400.

Habitat in Jamaica.

Caulis spithameus. Folia nervosa. Petiolis inferne vaginan-
tis latiores. petala duo lateralia patula. Labium oblon-
gum calicem obovatum lin.

Orthocentrus latifolia. Hb. K. 1250 d. 147. fig. 2.

plantagineum S. bulbis filiformibus foliis caulines ovatis petiolatis
vaginantibus. Labio nectarii triplo medio acuminato
cornu brevi incrassato Sw. obs. p. 320 *

Differentia a hinc Diversa vid. Schw. prod.

Castellum latynum bulbis filiformibus, caule hirsuto foliis multinerviis, petiolatis
vaginantibus, nectario cornuto, labio trilobo Sw. prodr. p. 118.
Habitat in Jamaica 7

Specimen meum a Swartz. musum gaudet
caule glabro foliis multinerviis

Adnatum Lat. bulbis fasciculatis, foliis radicalibus oblongis, petiolo longissimo,
scapo vaginato, nectario cornuto adnato, labio deflexo bilobo, emargina
to Sw. prodr. pag. 118
Habitat in Jamaica, Hispaniola 4

non red:

Thoum ~~Ophrys~~ Selynum

Habitat in Domingo ^{pedali} superne inter flores pubescens
Caule scapo squamis membranaceis lanceolatis remotis
Folia radicalia, oblonga nervosa basi attenuata quatuor vel quin-
que. Flores subpedicellati bracteae orato acuminata membra-
nacea. Petala lanceolata uti labium longitudine petalorum
indivisum lanceolatum

an adnotum Sw

grandiflora Ser.

orchnoides lat. bulbis fasciculatis oblongis, foliis lato-lanceolatis, scapo vagi-
nato, neclano cornuto, labio lanceolato acuminato Sw. prodr. pag. 118
Satyrium 7. Brownii Lam. 325.
Habitat in Jamaica 7

Sperale lat. bulbis fasciculatis oblongis, foliis linearibus saepe vaginatis, flori-
bus sperale secundis, labio trilobo, medio majori emarginato Sw. prod. p.

118.

Habitat in Jamaica 7

epens Sat. bulbis fibrosis, foliis ovatis radicalibus, floribus secundis lin

Fl. Dan. 812. Faeyn. fl. Austr. 4. t. 369

Orchis minor, floribus albis. radice repente Cam. hort. III. tab. 35.

Pseudo-Orchis Bank. Pin. 84

Pyrrola angusta folia, polyanthos, radice geniculata Loef. ed. 1654.
p. 62. ed. 1703. p. 210. 4c. 60.

Eriopactis foliis petiolatis ovato-lanceolatis floribus tetrapetalis hirsutis Hal. hort. tab. 22.

13. Orchis radice repente, foliis maculis nigris et albis adpressis Mentz
mez. 3. fig. 4. 5.

Habitat in Svecia, Anglia, Sibiria, Helvetia sylvis &

Folia radicalia ^{polluciana} ^{oblonga} ^{oblonga} ovata, acuta nervosa seu venosa subre
netulus planus ^{foliaceo} ^{conspicua} ⁱⁿ ^{foliis} ^{trunculata} ^{capitulis} ^{pubescentibus} ^{vagina} ^{lanceolatis} ^{tribus}

distantibus. Spica ~~terre~~ bipolluciana. Bracteae subulatae
flores longiores. Petala tria, pedicellifera. Labium lanceolatum
subtus gibberum germen oblongum subsessile

Speciosa Neotria

neotria speciosa Gay. coll. 3. pag. 174

Habitat in amenia meridionali.

Radix fasciculata & tuberosa carnosae laticibus crassitie fere digiti
minimi. Folia radicalia plura, 10, longe lanceolata, acuta basi in
petiolum angustata, undulata, crassa pubescentia semipedalia
caput folium duplo altius crassitie calami, glaber spatii septem
ultra dimidiam partem obitus florum sessilibus. Spatha anguste
lanceolata acuminata, concava inferius 2 uncialis superior
breviter subrepens. floris brevissime pedicellatis uncialis erectis.
Petala rubra &que aequalia anguste lanceolata acuminata
plana 3. exteriorem erecta univisa dorsale basi canaliculato coram
virescente, interiora 2. cum dorsali alternantur & ante hanc hinc profertur
superne patula. hectonum 1 phyllem ovato lanceolatum acuminatum
cum indursum inter 2 petala exteriorem basi styli amplectens
Stigma antic productum in appendice lanceolata acumi
notan longitudinaliter bicularem erectam subtus barbata
Capsula oblonga Corolani 3 valvis Gay.

Satyrium speciosum

minor Neottia

Hallebonni foliis lineatis, radice aphyllae, minor Plum Cat: pag. 9. 4c.
pag. 184. Tab. 190.

Neottia minor Gaeyh. coll. 3. pag. 172.

Radix fasciculata. Stipulae radicales plerae petiolatae, late lanceolatae
acuta obscure nervosa, sordide glaucescentia, crassula glabra aetia
secula 4 pollicaria. Scapus erectus teres sesquipedalis ad lentem
villosus, spathis remotis acutis apliceis aulibus vestitus. Spica
semi-pedalis. Flores secundis praeterea lanceolatis - acuminatis
glabrae longitudine per minus corolla videtur quinque petala
3 exteriora e quibus 2 superiora oblonga obtusa uncinata ^{contantem} villosa
duplo longiora 3 tunc lanceolatae apices patens superne villosa
fuso. 2 inferiora linearia oblonga obtusa longitudine petalae
3^{ae} exterioris sub quo recondita. Neptuni labium subrotundum
emarginatura erigitur. Stigma anticum auctum appendicula
biloculari. Capsula ovata Gaeyh.

Satyrium elatum

clatum lat. bulbis fasciculatis tomentosis, foliis radicalibus ovatis petiolatis, caule
subnudo, nectario subtrilobato. Sw. prodr. 119

Lactus Helleborine foliis leucis, radice appodeli minori Plum-Ge: 190

Patyrum 2. Brownii pag. 324.

Habitata in Jamaica, Hispaniola &

Species patyni repenti

Folia petiolata, radicalia ovata multinervia. Scapus pedalis et ultra
vaginatus. Vaginis membranaceis remotis 4 vel quinque. Spica
tripollicaris secunda. Bractea lanceolata longitudinali
Petala linearia. Germea oblongum an meo eodem cum sehu.

rubescens ut
scapus repens

an ~~meo eodem~~
an no.