

Sauvagesia

1. erecta. S. foliis oblongis serratis, pedunculis foliis brevioribus
2. perennis. S. foliis lanceolatis, pedunculis longitudinae foliorum

Lauridea Vandykei nuper generis Richard

adima Sawagaji

tampanum videtur differre ab exento saltim secundum Specimen
Kobni ut ut dixerit hinc

tenella Sauvagei foliis oblongis subserratis mucronatis, stipulis setaceis ciliatis

Habitat Capono Richard herb. Mus.

Planta digitalis, glabra. Caulis filiformis, simplicissimus. Solea sesiplex, alternata,
diffantia, versus apicem serratura una alterave, interdum tres, superiora
gemina vel ternata. Stipulae foliis breviores, setis nonnullis ciliatae. Pedun-
culi ex axillis superioribus, foliis longiores, capillares, uni flori

perennis
~~Adima~~

Sauagezia foliis lanceolatis, pedunculis longitudine foliorum.

Frond herbaceus minor, foliis oblongis, tenuissime crenatis; stipulis ciliatis; floribus singulis
+ Cantus ad alas Brown. jam p. 179 tab. 12. f. 3.

Habitat in pratis humidis, et ad ripas rivulorum Capana et Guana 4
+ Sauagezia Adima foliis oblongis serratis; floribus longe pedunculatis Tab. 100. fig. a
+ Aubl. fl. Gu. pag. 251. tab. 100. f. a. *

Similis antecedenti. Et forte mens varietas, differt modo caule altiori ramosior, foliis
longioribus longioribus, serraturis majoribus, pedunculis longitudine foliorum, radice
perenni.

~~non~~ creta in Lin

erecta Sauvageja foliis oblongis serratis, pedunculis foliis brevioribus

4. ~~erect herbaceus minor, foliis oblongis tenuissimis crenatis, stipulis ciliatis, floribus singulis axillaribus~~ ~~Brown Jam: 179. t. 12. p. 13.~~

Sauvageja erecta Lin. S. V. pag. 274. Spei. pl. 294. Jacq. Amer. p. 77. Tab. 51. f. 3.

Sauvageja erecta foliis oblongis, angustis; floribus solitariis, brevi pedunculo in
dentibus Cassl. fl. Gu. pag. 254. Tom. 1. tab. 100. fig. 6.

Habitat in Tomago, Jamaica, Surinamo, Guayana

^{altera}
Caulis subramosus angulatus & costa foliorum decurrente, erectus. Folia oblonga, ^{sepi-}
^{us} serrata, ^{angustis} ^{oblonga}, minute serrata acuta, glaberrima subpallida. Stipulae ^{altera}
ad singulum folium lanceolata, ciliata. Pedunculus axillaris, solitarius uni-
florus, foliis brevior.

Habitat in Hymenia aut Cochon. Lin.

ablatis distincto speciei fide raimosa Richard