

Scabiosa

Tomentosa Tab. Corollulis sordis inaequalibus foliis tomentosis
radicalibus pinnatifidis reliquis pinnatis nervis linearibus
Bavan. 40. 2. p. 66. tab. 103.

Habitat in montibus regni Valentini 4

Folia caulina 2-4. Involucrum foliola exteriora longiora
linearia. Proprius interior sita & saepe nigra. Corolla
rotunda. Palea linearis. Semen involucrum glabrum
Bavan.

Daucoides Scab. fol. (corollulis s. f. radiantibus) foliis bipinnatis
et calyce communi villosi pennatifido Desfont. fl.

Atl. pag. 123. Tab. 30

Habitat Algeris.

Decurrens Scabrofoli corollis quadrifidis inaequalibus, calycis squamis ovatis
foliis pinnatifidis: pinnis decurrentibus Thunb. prodr. fl. Cap. p 20
Habitat in cap. b. per

mibi haud nota

humilis scabro collis quadrifidis inaequalibus, calycis syncarpi obtusis, foliis
linearibus dentato-pinnatifidis Thunb. prodr. fl. cap. pag. 20
Habitat in Cap b. per.

non vidi

capitata Scabrosa corollis quadrifidis aequalibus, calycis fereamnis acutis, foliis
lyratis dentatis Thunb. prodr fl. cap. pag. 29
Habitata P. b. per

non vidi

Vinfida *Scabrosa* corollis quoad nifid is aequalibus, calycis lacinis obtusis, foliis
lineariibus integris & nifidisque Thunb. prod. pag. 200
Habitat in Cap. b. per. no.

non vidi

caulis Scabrosa corollis quinquefidis radiantibus, calycis squamis lanicolatis
brevioribus, foliis obovatis mucis Herb. prodrom. flor. cap. pag. 24
Habitat in Cap. b. p. e.

manu ignota

* Corollulis quadrifidis aequalibus.

alpina L. calycibus imbricatis, floribus cernuis, foliis pennatis: foliulis lanceolatis
seratis Lin. Sp. pl. p. 141.

Scabiosa alpina centauroides Besl. ex H. off. 122.

Scabiosa alpina, foliis centaurei majoris Bauh. pin. 270.

Habitat in alpidibus Helvetiis, & Italiis.

Caule erecto tripedali angulato sulcato inferne villosus. Folium
petiolato, pennatifida furthamosa et ultra ma. glabriscula
mamme pubescente pennatifida. Calicis suboppositis lanceolatis
attenuatis sesquipollicibus et ultra intus versus minoribus serratis
petiolis villosis basi connatis. Pedunculis elongatis angulatis
pubescentibus capitulum globosum magnitudine nucis juglandis
calyce imbricatus foliulis ovatis attenuatis villosis. ^{Rayis} ~~lobis~~ ^{lobis} lanceo-
latis utraque attenuatis longitudine calycis apice villosis. Calyce
propriis radicis vixit villosis. Semen corona edentatus dentibus
setaceis alternis quatuor brevioribus

amplexicaulis L.

nyda f. corollis subdiarrhibus, calycibus imbricatis obtusis, foliis lanceolatis serratis ^{ovatis} ~~ovatis~~ ^{ovatis} Lin. Mart. 320 Am. acad. 6. afr. 4.

Scabiosa africana frutescens, foliis rigidis splendens et serratis, flore albicante Com. herb. 1. p. 185. t. 93.

Habitat in Aethiopia

Rami sulcato-angulati glabri. Folia petiolata, elliptica ovato lanceolata sesqui pollicaria serrata, basi acuminata

Folia basi inter acuta, subleata seu rigida crassiora quam in congeneri dum bidentatibus subavenia. Petioli basi connati. Folia sub pedunculati ^{caerent acuminati} ^{paucis lobis} linearia integerrima Pedunculi terminalis trifidus u

Calyx imbricatus foliolois aequalibus subrotundis extus pubescentibus. Pappi luniformis cara extus villosa margine membranacea femina pubescentia angulata Pappi calyculati inaequaliter multidentatus Calyx proprius villosus multidentatus

inferioribus aunculatis integrisque lanceolatis oblongo ovatis

confer figura Comnelm

argentea L.

(Corollis 4fidis subobtusis lobis)
parviflora Scabrofolia inferioribus obovatis crenatis cap. pinnatis
basi truncatis capitulis ovatis calyce proprio interiore
risimo ^{desertorum} Tournef. in fr. 465.

Scabrofolia al. pinnatis ^{strenuata} foliis Boiss. in Mus. tab. 120
as. ferocis, calus annuus, foliis imis fere vix retris
Vahl. Acad. 1782. p. 101.
Habitat Algeria

Simplex Scabra foliis bipinnatis villosis foliolo lineantibus
acutis calycis femineis campanulato maximo caule super
ne nudo De font. fl. atl. pag 125 tab. 39. fig 1.
Habitat Algens

mihi ignota

Transylvanica l. Calycibus paleisque aristatis, foliis radicalibus lyratis caulinis pin-
natis. Hort. Ups. 264. Faq. hort. 2. Tab. III.

Scabiosa altissima annua, foliis agrimonio nonnihil similibus Heron
lug. 16. 539. Monf. hort. 3. p. 46. f. 6. t. 113. fig. 13.

Habitat in Transylvania ☉

Caulis erectus rase pilosus superne dichotome divinus.
Petioli basi ^{obtusis} ciliati. Foliorum lacinae alternae
oblongae serratae pilosiuscula terminalis reliquis major
in supremis laciniolata. Pedunculi apice bipedii
dichotomia apyllum angustatum. Calyx umbri-
cus. Corollae ovatae acuminatae ^{in limbo} exteri orbis ^{in limbo} 5. que parum
angustioribus. Dorsum orbis ~~pilosus~~ palea striatus.
Foliorum calycis

Scabra L. Calycibus imbricatis obtusis, foliis subsimpinnatis scabris rigidiusculis
Len Suppl. p. 110. * S. V. p. 144.

Habitat ad Cap. b. p. c.

Planta herbacea, fruticosa, caule floribusque L. rigido. Caulis teretes simplicis,
scabri. ^{patula} Folia sessilia bipinnata, scabra rigidula, linearia, acuta, cum
rudimentis ramorum foliosis et alii. Flores terminales longius pedunculati,
solitarii. Calyx imbricatus: foliolis ovatis, obtusis. Flosculi inter squamas
calycis, albi quadripedi, inaequaliter Len.

Synaca f. calycibus imbricatis paleisque anfractis, caule dichotomo, foliis lanceo-
latis. Lx. f. v. pag. 144*

Scabiosa frutescens latifolia alba Bauh. pin. 2. G. Menf. hist. 3. p. 46. f. 6.
t. 14. fig. 14.

β. *Scabiosa persica folio*, fl. aemethyferis Vaill. act. 1722. p. 233

Habitat in Syria &

Caules dichotome ramosus rami angulati hispidi hispidi
folia superiora (an inferiora) basi attenuata subsessilia integerrima
nuda pulis rariis adspersa. Flores dichotomis breviter
petiolaribus brevissime pedunculatis ^{foliatis} ~~pediculis~~ verminales peduncu-
lo tri f. tripollitani. Calyx imbricatus foliolis ovatis seta
acuminatis albidis villosis semina villosa oblonga acumi-
nata acuminata pro prope planum brevior acuta ~~seta~~ ^{anata} prope seta
quatuor nigro calyx prope minus canescens setis parvis plurimis
multidentatis

Cucurbita L. corollula subaequalibus, squamis calycinis ovatis imbricatis, foliis pinnatis
vifidis Lin. S. N. p. 144 x

Scabiosa flore globoso nudo Bauh. pin. 207.

Scabiosa fruticans angustifolia alba Bauh. pin. 270.

Habitat in collibus Narbonae & Hispaniae

Caulis erectus peripedalis fruticatus glaber, ramis superne dichotome
ramosis. Folia bipinnata, bipollicaria pinnatifida basi connata

laciniis alternis oppositisque remotis linearibus angustis glabris acutis
integris vel dente uno alterove in basi infima laciniis

Flores ante exple-
tionem globosae
magnitudine
cerasi

caulis lanceolatis alternatis serratis in basi. Peduncululi elongati
interis dichotomi aphylli. Calyx hemisphaericus
vellosus subpinnatis lobis corollae extra Germaniam

Succisa f. caule simpliciter, ramis approximatis, foliis lanceolato-ovatis
Bl. Dant. 279.

2 *Succisa glabra* Bauh pin. 269.

1 *Succisa* f. morsus Diaboli Cam. epit. 397.

β- *Succisa hirsuta* Bauh. pin. 269.

Habitat in campo pascuis humidiusculis &

Caulis erectus vel ascendens superne divinus pilosus. Folia
petiolata oblonga acuta integerrima avenia, pili raris
adspersa, superiora linearia. Pedunculus elongatus

Attenuata. foliis linearibus integris bifidisque Lin Suppl. p. 110. S. V. p. 144

Habitat in capite bono frei 5

Rami tenues vix armati pubescenti. Folia linearia angusta
bipolliciana glabra, ^{integerrima} ~~inermis~~ ramulorum foliorum foliacea
in axillis pedunculis terminalis 3-4 polliciana indivisa
Calyx imbricatus lobis parvis 7. ovatis obtusis interioribus color
ratis pubescentibus corollo extus villosa

Corollula quadripetala, sub caulebus
integrifolia L. foliis indivisis radicalibus ovatis serratis, ramis lanceolatis, caule
herbaceo. Lin. Spec. pl. pag. 142 *

Scabiosa latifolia, purpurea scente flore Clus. hist. 2. p. 2. fig. 3.

Scabiosa montana latifolia non laciniata rubra Bauh. pin. 270

Scabiosa annua integrifolia f. foliis bellidis Magn: Monpel. 231. *

Habitat Monpellii et in Helvetia O

Caulis a punctis minutis purpureo scentibus scaber Saepe cui insident pili
rari. Folia radicalia bellidis ovata obtusiuscula saba acutius

serrata. Caulis ^{elliptica} lanceolatus in petiolum ^{longitudine} attenuatus ^{foliis} serratus ^{respicit}
attenuatus + bipolliciana ^{intidum} basi carinis nonnullis in petiolo
acuminata acumine integro. rami ^{duplex} amplius ^{linea} aequa ^{est} serrata ^{ovatis}

interioribus ^{caulis} ^{ovatis} ^{elliptici} ^{serrati} ^{longitudine} ^{ferre} ^{corolla}. Pappus ^{corona} denticulata ^{setis} novem
inaequalibus inferne oculo armato villosi femina villosa recip

Scab. serrata Faculum pelopon

La mariti var specii
differt herb la mariti

foliis cauleni lanceolato elliptici serrati
petiolatis ramis sesquibus lanceolatis

Folia intermedia pennatifida. Calycis communis foliola ovata - lanceolata.
herb. Gust.

amplexicaulis scabrofa corollulis radiantibus; foliis amplexicaulis lanceolatis integerrimis; radicalibus trifidis crenatis Lin. Mant. 195. * P. V. p. 244

Habitat.

Pauli pedalis, scaber, brachiatus. Folia radicalia oblonga, scabriuscula, crenata trifida lobis lateralibus. Caulina amplexicaulia, lanceolata, integerrima basi latiuscula. Panicula dichotoma. Pedunculi longissimi. Corolla composita corollulis quod trifidis: exterioribus radiantibus. Calyx polyphyllus, longitudine corolla.

Differt a *S. integrifolia* foliis radicalibus non trifidis; caulinis basi latioribus; calyce non corolla dimidio breviora Lin. Mant. l. c.

num mea Lin. caulis punctis nigrescens uti insident
nili reversi. Folia lanceolata infima et radicalia
basi utraque cuneata aucta superiora basi attenuata
amplexicaulia omnia profunde serrata aut suprema
basi latiora integerrima vel basi tantum serrata
Calyx folioli lanceolatis, corolla longioribus calyce
proprius et ^{ref. p. 250 ut in integrifolia} margo. an sylvatica. vel nova
species calyce et pappo fere communi et parthali uti et
Serrateni foliorum a *S. integrifolia* diversa

Tatania L. foliis lanceolatis pinnatifidis: lobis subimbricatis caule hispido h.
L. V. pag. Gmel. N. 1. p. 159.

Scabiosa altissima segetum Trumphet. Ray suppl. 2362

Scabiosa foliis quadrifidis, foliis pinnatifidis: lacinis lateralibus
erectiusculis Cret. Lypf 1744. p. 11. tab. 1. 4

Habitat in Tatania L.

Caules ^{complexicaulis} erguales hispidi erecti. Dichotome ramosi teretes

folia sub pedunculis lanceolatis inferiora pedalia ovata pinnatifida ~~an~~ lacinis
lanceolatis attenuatis serratis vate pilosis. superiora
ovata attenuata. Calyx foliolis ferebus? lanceolatis
interioribus brevioribus exterioribus longioribus
te piloso Calyx propeu fere decem brevibus calycibus
integris villosis nervis

complexicaulis serratis
foliis inferioribus pinnatifidis superioribus ovatis

uralensis. foliis radicalibus simplicibus, caulinis decursive pennatis, paleis an-
theris reflexis Lin.

Murr. in Com. Gott 1782. p. 138-4

non vid.

arvensis. foliis pinnatifidis incisis, caule hispido len.

Pl. Dan. Tab. 447

Scabiosa arvensis Tabern. hist. 442.

Scabiosa pratensis hispida Bauh. pin. 269.

Scabiosa major communior hispida, folio non laciniato. Bauh. hist. 3. p. 2.

Habitat in Europa solo glareoso, juxta segetes ^{in agris} inque pratis &

Caulis erectus sesquipedalis di-hispidus folia radicalia lan-
ceolata utraque attenuata profunde serrata indivisa, caulium
pinnatifida pinnatifida pinnis linearibus lanceolatis ~~lacini-~~ lacini-
mali majori integerrimis, indivisi serratis vel incisi Calyx
communis folioli lanceolati corolla brevioribus

radicalibus lanceolatis indivisi pinnatifidis que

Sylvatica. foliis omnibus indurisi ovato-oblongis serratis, caule hispido. Lin.
S. V. pag 144. Jacq. obs. ¹⁷⁹⁷ 28. Pl. Austr. 4. Tab. ~~162~~

Scabiosa latifolia, flore rubro 11. Pluf. hist. 2. pag. 1.

Scabiosa latifolia rubra non laciniata Bauh. pin 270

Scabiosa montana non laciniata rubra 1. Bauh. pin 270.

Habitat in Austria, Helvetia, Montpelii Sylvaticis. 7

Caulis erectus teres villosus. ^{apice dichotome divisi} Folia amplexicaule palmata suspens

ra minima attenuata acie profunde serrata, acumine integerrimo, pilis parvis raris aspersa. Pedunculi ~~duo~~ villosi dichotomis

elongati aphylli. Calyx polyphyllus folioli duplici serie pariteribus lanceolatis longitudine fere radii pilosi pubescentia. Calyx proprius setis plurimis 10. pappi calyculus magis brevis formis

inequali villosus
Caulis teres pilosus; pilis tuberculis magnis

folia radeo alia
in petiolum
attenuata

~~confertus hist. 2.~~

Crenata *Sc.* foliis radicalibus lancicolato cuneatis serratis, ^{tridentatisque} caulibus pinnatis
trifidis lineariibus

Phytoloma minus, scabrolo parva, floribus ovium lacinateis
atque odori Columae phytolaba 2:2. p. 32. fig. 31.

Habitat neapoli inque ^{Barbaria Zeynem ult} pedales ^{vee raphnem ult} simpliciter basi purpurea

Caulis plaris, erecti ^{scabrolo} foliis ^{scabrolo} dactylis simpliciter basi purpurea
scabrolo ^{scabrolo} villosis ^{scabrolo} villosis. Folia radicalia et inferiora

lancicolato cuneiformia, bipollicaria obtusa, tridentata
vel profunde serrata areola glaberrima. Caulis pinnatis

trifidis inferioribus laciniis trifidis sub
nisi superioribus laciniis cuneatis angustis subtus ovato

armato pilis aequot. Pedunculi elongati scabriusculi
striati apice canescentes. Calyx patens cineriter 12 phyllis

colicis lineariibus villosis ciliatis Pupillae serie corolla
parum brevioribus Corolla dilute purpurea subradicata

laciniis corollularum
radii venulata

radii trifidi. Calyx interior 5que exterior membra
nervi dentatus

Scabrolo crenata corollulis quadris creatis, foliis pini
moribus spatulatis, tridentatis, reliquis pinnatis, pinnatis
complexis tripartitis Cynl. plant. rar. fasc. 1. pag. 11
Tab. 3

gramentia l. Calycibus brevissimis foliis caulinis bipinnatis feli formibus Lin.

f. 11.
Scabrosa capitulo globoso minor Bauh. pin. 270.

Scabrosa capitulo globoso, foliis in tenuis pinnas laciniis divisis Bauh.
pin. 271.

Habitat Moschellii, seorsus vras autumno florens.

Specimen herbe ex hortu upsaliensi cum differentia hennoi non convenit accedat
ad columbanam at flore flavescente nec nisi ralis violaceo rubra
forte ochroleuca

Creteca L. foliis lanceolatis subintegerrimis, caule fruticoso. Lin. S. V.

pag.

Scabiosa stellata, folio non dissecto. Bauh. pin. 271. Monf. hist. 3. p. 6. t. 15

fig. 31.

β. *Scabiosa cretica frutescens*, auricula urfi folio Tournef. corol. 34.

Habitat in Creta et adiacentibus

Creteca culta ^{bipedalis et tripedalis} ~~orgyali~~ ^{ramosa}. folia basi attenuata opposita ^{mediant} ~~mem-~~
basi connata, confertissima, arena canescentia interdum ^{ad} apicem dehte
uno altero. Pedunculus elongatus, uniflorus striatus canescens. Corollula
et ~~tra~~ ^{tra} pelos alba. Calycis ~~obtusif~~ ^{obtusif} foliolis oblongis obtusis calyx
proprius fiti quinque basi hirsutissimus Pappi calyculus mem
braneous radiatus integer, palea ~~idem~~ ^{idem} lineari longitudine calycis

Scabiosa fruticosa folio non dissecto [†] Bauh. 3. pag

272 Limonifolia Scabiosa corallulis quatuorfidis, foliis cuneiformibus integerrimis
subtus rugosis in canis

Scabiosa caphanenſis, fruticosa, laurcola folio, crassa, rotundo, luvii
do, molli, subtus incano Hort. Cath. 196. Raj. hist. 3. p. 238.

^{n. 93.}
Scabiosa sicula, fruticosa, laurcola folio subtus incano Tournef.
J. R. H. pag 463.

Habitat in Sicilia.

Radix superne diaph.

Caulis basi frutescens, erecti, sesquipedales, simplicis, sulci fieri
inter folia
pus fluit floriferus sulcato - angulatus, subaphyllis, pedalis.

Folia ^{inferna} aggregata, vix pollicaria, oblonga, in pedicellum
ramoso -
depressantia, crassa supra glabra arenia, subtus rugosa

forte quod modus
crepescendi eadem ac
in Scab. sicula et quod margine reflexo, e marginata. Scapi ^{inferna} floriferi ^{inferna} usque
specimen herbari potius
a superioribus remotissima basi utrinque dente unico, superiora linearia ^{remota}
ramis quam tota
70 planta

Pedunculi ^{inferna} duo in ferne ex axillis foliorum Scapi, superiora
tria remotissima, terminales: laterales subramosi
vasta

Coranthium commune polyphyllum: foliis lanceolatis, obtusiusculis
tomentosis in canis. Propprium extenius breve inaequaliter dentatu
latur: intenus duplo longior setis quinque purpureis.

Corolla aequales, omnes quinque fido, extus tomentosa.

Pales lineares, basi angustiores, longitudine flosculorum, tomentosa

pterocephala scabiosa corollulæ quinquefidæ ^{caule prodebente fruticoso laciniatis} radiantibus foliis pennatifidis hisp
tis ~~caule fruticoso~~, pappo plumoso ^{lin. l. V. pag.}

Planta vitæ palmaris ^{dichotome} ^{varie difformi} ^{divaricati}
Caulis fruticosus ramosus. Rami teretes inferne nudi squamosi &
capite foliorum ^{unicati} pollicaria ^{hirsutissima} ^{vellosa subtomentosa}
Folia lanceolata extorsum ^{caetera} aggregata iad apicem ramorum
in petiolum alatum ^{de se} sessilia inferne integra superne penna
tifida, laciniis oblongis obtusis.

Pedunculus terminalis solitarius ^{vellosus} aphyllus pollicari ^{hirsutus}

Calyx ^{tricoloribus} ^{in capitulo} ^{nube hirsutus} ^{tricoloribus} ^{in capitulo} ^{nube hirsutus} ^{tricoloribus} ^{in capitulo} ^{nube hirsutus}
Corollula ^{sub radii} parum longioribus majoribus irregularibus

Penanthium proprium parvum radiis 10 corolla dimidio breviora
purpurea ^{plumosa} pappus ^{marginis} brevissimus

Scabiosa ^{caetera}, capitulo pappo ^{menthae} ~~Tournefort~~

^{et} Pteroccephalus perennis humilis laciniatus et incanus
Vall. act. 1722. pag. 104

papposa l. corollis inaequalibus, caule herbaceo erecto, foliis pennatifidis, semi-
nibus aristatis plumosisque-papposis Lin. l. v. p. 146. x
Scabiosa cretica, capitula pappi ~~mentente~~ Tournef. coroll. 24. Boeck. Leyd.

1. p. 130

Habitat in Creta

Caulis erectus pedalis de botome ramosis oculo armato
vellosus teres lavis. Folia polliciana vel parum ultra
pennatifida angustissima fabriuscula Calyx solido
duplex sine exteriori antra purpurifera ^{callosa} terminata
exterior 5. ovata nervosa interior lanceolata. Calyx propri-
us radius 20 ^{semitis} ^{apice} purpurea ^{semitibus} inferne plumosis
semina villosa antra semi pollicari subulata in curva super-
ne purpurifera terminata

in Knautia plumosa plane diversa.

Synonyma Tournef. ad Knaut. plumosa per Knaut

Columbana L. foliis radicalibus ovatis crenatis, caulinis pennatis setaceis. Lin.
9. fol. 220 & 8. L. Dan. tab. 314.

Scabiosa glabra, foliis carnosissimis virentibus Heron. parad. 221. f. 221.

Scabiosa minor Lam: epit. 411.

Scabiosa capitulo globofo, major Bauh. pin. 270.

Habitat in Europa montosis, siccioribus glabris pilulis.
Caulis erectus pedalis raris uno vel altero glabro. Folia radicalia
petiolata obovata vel pennatifida laciniis linearibus oblongis mucis
terminali majori fermora quam in arvensi raris villosa caulina
angustiora. Peduncululus superne canescens Calyculus interior setis
5que pernunciis calyx costella brevior

Foschia lei planta diversa est sed cum folia radicalia desunt certi aliquis
determinare non audeo

pyrenaria S. foliis tomentosis incanis radicalibus lanceolatis integerrimis serratis que caulinis subbipinnatifidis lineantibus
Scabroza multifida alpina exoni Boic. mus. pag. 22.
tab. 6.

Scabroza caule uniflora, foliis tomentosis imis pennatis
pinnis dentatis et semipennatis Hall. hist. no 207.

Scabroza pyrenaria All. fl. Ped. n. 512. tab. 25 fig. 2 et
tab. 26. fig. 1.

Habitat in rupibus alpinis et subalpinis Helvetia
et Italia &c.

Caules plures interdum solitarii, superne exans uno vel
altero interdum simplicius basi tantum foliosus teres
glaber vel villosus incanus. Folia radicalia petiolo
sa pollicaria vel ultra villosissima tomentosa incana
integerrima vel remote serrata basi attenuata
caulina linearia inferiora bipinnatifida, superiora
laciniis fere indivisis villosa at minus quam radi-
calia subincana pedunculis longissimi. Calyx
patens lacinus lineantibus. corollae 12 Conyctidinae
corolla receptaculum hemisphaericum paleis subul-
timis fulcato angulato calyce purpurascente multo
dentis membranaceo coronato. setis 5 que longitudi-
nalem
corollularum

corolla rad. intes
s. fida pallide
purpurascens

folia radicalia saepe
pennata pinnis termi-
nali maxima

maritima l. ^{xxx} Corollulis quinque ped. & radiantibus
integerrimis Lin. Am. acad. 4. p. 304
Scabiosa maritima parva Bauh. hist. 3. p. 7.

Habita monspeliensis

Caulis bipedalis sub levis - Folia radicalia lanceolata obtusa obtuse
dentata, lora venosa, tandem pennati fida. Scrophul. rube canina
femellima. Caulina pennata integerrima glabra, canaliculata
suprema linearia, superior integerrima. Peduncululi longissimi.
Calycis ~~infima~~ infima foliola lanceolata, corolla longiora.
Corolla radiata, quinquefida, albo purpurifera. Anthera
& stigmata purpurea. Paleae setae articulate et fere aculeis
erectis mucronato. Insetis scabris atris purpureis

argentea li maritimi forte eadem
herb La Manth

michi ignota

stellata. foliis dissectis, receptaculis florum subrotundis Lin. Mant. 339

Scabiosa major hispanica Clus. hist. 2. p. 1.

Scabiosa stellata, folio laciniato, major Bauh. pin. 271.

B. Scabiosa stellata, folio laciniato minor Bauh. pin. 271.

V. Scabiosa stellata minima Bauh. pin. 271.

Habitat in Hispania, ^{Barbosa montibus} proferitur in agro Granatensi adversus O.

Pilosa pili tuberculati minuti insidentes. Caulis erectus superne

dichotome ramosus teres. Folia pennatifida ^{longa} 3-4 pollicibus
laciniis terminalibus laciniis oppositis ^{extus} versus majores ^{per} apicem ^{panna-}
nati ^{fove} ^{max} ^{lat} ^{rot} ^{es} ^{et} ^{apice} ⁱⁿ ^{iso}. Calycis foliola lanceolata
attenuata duplici serie. Calyx prope liliis si que longitu-
dine corollae ^{purpuriferae} ^{si} ^{quae} ^{longitu-}
membranaceus ^{multis} ^{rad} ^{at} ^{ur} ^{integerrimus}. Semina pilosula

prolifera l. floribus subsessilibus; caule prolifero foliis indivisi Lin. Mant 329

^{S.V}
Scabrosa stellata humilis integrifolia prolifera Herm. parad. 125. 7. 125.

Habitat in India

Caulis pilosus dichotome ramosus. Folia basi connata
bi pollicaria ^{obtusata} oblonga ^{vase} pilosa inferiora ^{obtusata} subseriata superiora ^{obtusata} integerrima. Flores in dichotomia ^{obtusata} sessilibus solitarii calycis folio
vel ultra ^{obtusata} lata corollae radio ^{obtusata} breviora pilosa prope ^{obtusata} sitis
quaque femina et ^{obtusata} apparet ^{obtusata} stellata

foliis connatis oblongis indivisi supremis integerrimis
caule dichotomo floribus subsessilibus