

Corolla

Corolla mono petala. tubo longitudinaliter fissis. Stigma sessileforme - Antra
infera 1 sperma, Nucleus biloculari

1. Plumieri S. foliis obovatis glabris integerrimis, calyce integro
2. Honigii S. foliis obovatis glabris superne dentato-subrepandis, calyce 5 den-
tato.
3. Jencea S. foliis obovatis villosis mollissimis superne dentatis

1 Plumieri: *S. foliis oblongis integerrimis glabris* Symb. Botan. 2. pag.

Lobelia frutescens portulaca folio Plum. gen. 21. t. 165. fig. 1. Cat. b.
Carol. 1. p. 79. t. 79.

Lobelia Plumieri frutescens, foliis ovali oblongis integerrimis Lin.
fl. reyl. 313. + Spec. pl. pag. 1317+

Corolla *Lobelia* Lin. l. V. pag. 213. Sw. obj. pag.

Habitatio Indis. 5

Caulis frutescens ramifusus, rami teretes glabri. ^{unicostriato} Solia oblonga
basi in pedicolum angustata, carnosa, aerea chervicia
bi pollicaria et ultra, apices ramorum ⁱⁿ approximata
Petiolus oblique inflexus ⁱⁿ axilla ^{basi} lobato. Peduncululi axillares
bis bifidi, ^{conspicue} ⁱⁿ dichotomia ⁱⁿ ^{pediculis} ^{et} ^{pedunculis} ^{reliqui} ^{pedunculati}
peduncululi ⁱⁿ unguiculantibus. bractea bino opposita
ad basin singuli ⁱⁿ gemini ⁱⁿ axillis ⁱⁿ villosi. Calyx brevissimus
corolla intus villosa ⁱⁿ parte ⁱⁿ pollicata ⁱⁿ stylis ⁱⁿ basi ⁱⁿ villosis
stigma ⁱⁿ margine ⁱⁿ pilis ⁱⁿ albis ⁱⁿ copiosis

3 Senecio Scovola foliis obovatis villosis mollis simis superne dentatis

Habitat in Lavage Island & Tobacicus

Rami fusci, villosi, e caespitibus foliorum onunciati.

Folia sparsa, unipolliciana, obovata, petiolata, arena mollia
ter villosa, vincta tamen.

Petiolus oblique insertus, axilla barbata.

Panicula pauciflora, dichotoma, axillaris.

~~Panicula~~ ^{opposita} opposita, ad basin pedicellorum, lanceolata, subaequali
vs.

Calyx quinquepartitus, superius laciniis lanceolatis.

Corolla extus villosa. Tubus ^{in unguiculari} semipollicianis, coriaceus. Labi laci
no lanceolata, obtusa, latere membrana tenui aucta.

Filamenta ad basin tubi inserta, filiformia, longitudine styli.

Anthera oblonga, sub stigma sub subobovata, basi rotundata,
apice transverse.

Stylus unguicularis, linearis, filamentis triplo crassior. Stigma
lypiforme stylo triplo latior, vincte, pellucens, margine
tenuissime denticulatum.

Paniculum globosum, villosum, magnitudine pisi, calyce
coronatum.