

Scandix

1. odorata S. seminibus cylindricis fuscatis angulatis
2. pecten S. seminibus longissimis pilosiusculis lobatis
3. australis S. seminibus subulatis hispido scabris, floribus radiatis, caulibus
lobatis glabris
4. nodosa S. seminibus subcylindricis hispido, caule hispido, geniculis tumidis
5. cespitosa S. seminibus ovato-subulatis nitidis, caule glabro geniculis subtumidis
6. anthriscus S. seminibus ovatis hispido, corollis uniformibus caule laniato
7. procumbens S. seminibus nitidis ovato-subulatis, foliis decompositis, caule
procumbente
8. tripartita S. seminibus hirsutissimis, pilis semine duplo longioribus
9. infecta S. seminibus oblongis extenuis hispido, umbellis confertissimis
hemisphaericis
10. grandiflora S. seminibus pedunculo villosa brevioribus.

grandiflora Scandix.

Habitat herb. Desfont.

Rami striati, ad vaginam pilosi. Folia tripinnata: pinnae alternae 3-4-partite
laciniis linearibus, angustissimis. Umbella radii hirti. Involucella laciniata
laevi, margine membranacea, villosa. Petala inaequalia

Trichosperma scandis seminibus hispidis pili semine duplo longioribus Lin. Mant. 57
+ S. V. p. 207

Habitat in Aegypto ☉

Caules plures, obliqui, semipedales, ramosi, flexuosi, saepe glabri. Folia bipinnata, glabra, subtus pallidiora. Folioleis ovato-canalicatis imbricatis, marginibus serratis; Petiolis subpilosis. Pedunculi oppositi foliis. Umbella universalis radius 3-4 ^{lin} aequalibus; partialis 10-12. subaequalibus. Involucello partialia folioleis 7. subulatis longitudine umbellae. Flores conformae carnei, fertiles. Semina pilosissima, pili semine duplo longioribus Lin. Mant. l. c.

Caules dichotome ramosi. Petioli villosi. Pinnae canalicatae, utraque acuta infimo pinnae fido. lacinae 2-3. imbricatis

grandi flora scandit seminibus pedunculo villosi brevioribus Lin. S. V. 280
Scandix orientalis, flore maximo Tournef. 23.

Habitat in Oriente herb. Royeni

Corolla maxima

Planta semipedalis, tenera. Folia subtrepinnata: pinnis distantibus; linearibus, acutis, ut unguicularibus, integris vel bipidis. Radii umbellae 4, brevioribus, trifloris, ut unguicularibus, integris vel bipidis. Involucella reflexa, oblonga, parva, margine medio brassaeo. Floriculi nonnulli abortientes. Petalum album cuneatum, emarginatum majus. Semina ^{unguicularibus, attenuatis} luteo-steris 10, ope lentis villosioribus, brevissime pedicellata. Stili 2. Petalici persistentes. In herb. meo deficiente.

gi lanica S. femoribus lobatis caulebus ramosis st. natis Gmelin et
3. p. 304. tab 31. fig. 2.

non videatur aut
videndum num ~~sem~~ ^{locis} ~~locis~~ per femina ^{humid} loca ^{num} glabra vel ^{quod} ~~quod~~ ^{semper} ~~semper~~
absque pilis

odorata L. seminibus sulcatis angulatis Lin. I. V.
app. t. 37.

Facqu. fl. austr. 5.

Myrtus God. pempt. 701.

Myrtus major, cicutaria odorata Bauh. pin. 160

Habitat in alpebus alvarnis inque confinibus agri Veronensis et Vien-

ni

Facqu. Rh.
ars. 161.

Caules 4-5 pedales, ramosi villosi, folia ampla tripennata
penna profunde serrata lanceolata serraturis serratis et hinc
pennis confluentibus villosis. Involucella lanceolata
attenuata membranacea. Semina nigricantia nitida
pollucantia

pectent. seminebus rostro longissimo Lin. S. V. p. Fl. Dan. Tab. 044. Fl. austr.
3. t. 263.

Pecten veneni Cam. epid. 302.

Scandix semine rostrato vulgari Bauh. pin. 152.

Habitat in ter Europa segetes ☉

Caulis palmans interdum alter ^{fructus} ramosus pilis raris
adpressis. ^{fructus} Solia mult. ^{fructus} pinnata ^{fructus} pinnis parvis
fidis glabris pilis umbello laterales bifidas, flori
in umbellulis 5-6. sesseples semina bipollicaria testa
breviss.

ylabris

Chilensis *S. pumenum* rostro longifloro, foliulis integris ovata-lanceolata
tu Molin. nat. hist. Chil. p. 103.
Habitat Chili

non id.

Cerifolium L. femini bus nitidis ovata subulata, umbellis sessilibus laterali bus L. V.
Gaerq. pl. austr. 2. t. 154. Fl. Dan. 7. 863.

Chorifolium God. pempt. 700.

Chorophyllum sativum Bauh. pin. 152.

Habitat in agris et arvis Europa australiori O

Cauli sesquipedalis debilis geniculis paucis inflatis, glaber
foliis bipinnatis, foliolo pennatis incisus obtusi oblongi
subullosi. umbello laterali bifida umbellis tri vel
quadri flori femina sex unguiculata

caule glabro geniculis tumidi

procumbens. Scandix seminibus nitidis ovato-subulatis, foliis decompositis Lin S. V.

288. Gron. Voy. 147.

Cerefolium Virginianum procumbens, fumaria foliis Monf. h. 3. p. 303.
f. g. t. 11. fig. ult.

Habitat in Virginia

Caule procumbente pedales. Folia fumaria umbello raro
plenuaque tripartita. Semina nigra antea Wittm. sum. pl.

infesta L. femine extenore hispido, umbellatis confertissimis hemisphaericis Lin.
S. V. p. 2074 Jacq. fl. austr. 1. t. 46.

Habitat.

Caulis erigitur pedalis scaber striatus. Folia radice alia pennata
et folioli oblongi. Insuper caulibus bipinnatis pennis
pinnatifidis laciniis serratis scabriusculis umbello ter-
minali spica umbellula hemisphaerica conferta
involucella 7 phylla subulata non reflexa flores
subradiati. Semina bina. extenuis semen lipidum spini-
culati: extenuis semen scabrum tantum, femina ovata

nodosa, seminebus subcylindricis hispido, caule hispido: geniculi tumidi in spec.
pl. 369 mant. 356. Faerq. hort. 3. p. 25.

Myrtis nodosa annua, semine apertis Monf. Bot. 200.

Cerefolium annuum nodosum, semine apertis majore Monf. hist. 3. p. 383. f. 9.
t. 10. fig. 4.

Habitat in Sicilia ☉

Caulis sesquipedalis habet articulos molles. folia sespleia
bipennata pinnis quinque pennatis in cuspide habens
cucurbitis tridentatis ovatis pollicibus ~~et~~ umbella
oppositifolia pedunculata sic irradiata involuella
subulata 3-5 phylla radiis arcibus 10.

anthusius / seminibus ovatis hispida, corollis uniformibus caule lavi. Len. L. V.
naz Gaerq. fl. austr. 2. t. 154. fl. lan. t. 263.

myrtus sylvestris, seminibus asperis Bauh. pin. 160.

Myrtus sylvestris squicolum Colum. Ephr. 1. p. 110. t. 112.

Habitat in Europa aegentibus terrenis O

^{forma}
Calcei glaber dichotome ramosus. Folia tripennata.
folioli parvi ovati pernatim incisuri petioli et vagina
ubi subtus cinerea. pedis vagina unguiculans margi-
ne membranacea. pedunculi oppositifolii, folio brevioris
6 radiati radice longitudine peduncululi se involuella
4-6 phylla

australis f. seminibus subulatis hispida, floribus radiatis, caulis brevibus lenticulis. Linn. S.

Scandix semine rostrato, italica Bauh. prod. 70.

Scandix cretica minor Bauh. pin. 152.

Ciniso marathnum Col. Ephr. 1. p. 89. 7. 90

Habitat in G. Narbonensi, Italia, Creta

Caules plures palmares vel pedales erecti ^{vellosi} foliosi simpliciter
int. sedum ramo uno vel altero ^{marginati} Anat. folia subqua
tripinnata uti petioli ^{marginati} pubescentia adpressa parva angu
la bis. trifida acuta. Vagina lato margine membranacea
utris sepe lanata. Umbella bifida, radiis 4-6. semina
bis subsessilibus sesquipollicantibus ^{et 1/2} scabris. Involucello
lanicolato acuminato

Scabris

Scandix clavata

stellata

juarcolensis

copensis

) Banks

an mea *Senecio* *pumila*?