

~~##~~ 112

Schoenus

Schoenus. Squamae paleaceae, inferiores vaeuae, superiores
fertilis. Styl. deciduus. Sem. 1, inter squamas superiores

annu Cor: O per oblivionem omissa est?

Byner. altera folia

pilosus 3 Schoenus spicis ^{brevisorbis} capitatis, involucri diphyllo ~~capitato longice~~, culmo
tereti, vagina foliis vaginae pilosis
Schoenus pilosus; culmo tereti, vaginae foliorum pilosis, foliis floribus
fasciculatis Willden. phyt. 1. p. 3. t. 1. q. 3.

Habitat in Guinea ~~teret~~, in Senegal Richard &

O. 209.

Culmi ^{teretes,} sesquipedales, ~~teretes,~~ glabri. Folia culmo triplo breviora, linea-
ria, angusta, subtus, uti vaginae ^{pilosa} ~~pilosa~~: vaginae ore ob integram
fissuram, ore altero ad folium pilis longis albidis barbatae, interior tri-
quadripollicari. Involucrum diphyllo, spicis parum longius
villosum, basi dilatatum utrinque pilis barbato. Spicae termi-
nales, circiter duodecim, unguiculares, ^{compressae} lancolatae, acidae, disti-
ce imbricatae: squamae lancolatae, compressae mucronatae, compressae
duae vel tres infimae steriles, fuscae purpureascentes, carina et
mucrone viridi. Stylus trifidus. Semen globosum, transversum undu-
latum. Setae nullae.

H complanatae

involucrum d. panicula foliosa nutante, spicis congestis anfractis subdivisis
flosculis gemellis nectariiferis Rothb. gran. pag. 64. Tab. 19. fig. 1.
habitat ad Cap. b. spici ^{suprem} altero latere congesto aetereo cavo
Culmibus ^{bi} quinquipedalis erecti tereti. Glia angusta carinata strigula
tr. Hujus magis coria. Sagittis pollicari ~~sp. flavo~~ fusca
Panicula terminali pedali. Pedunculi & procula sagittata 3-5
sagittae magnitudine inaequali spithamei palmato vel vix
seminuquivalari ramis. Furfuribus versus minore et minus ramis
nonnulli ex ultimi simplicissimi fructus canaliculato attenua
to in anitum subtriquelari rami fructibus. Furfuribus bracteis
quatuor s. sub sagittato spicula angusta anfracta spicula parum
largior spicula seminuquivalari furfuribus squamis canaliculatis
flosculis ~~duo~~ corolla duo

Schoenus parviflorus

hystrix

73

Dubii generis: ~~non~~

Schoenus ~~spici~~ terminali folitaria, valvis acuminatis finis serratis,
culmo ~~est~~ appilto. -

Habitat in Cap. b. spici ^{fusco-virescens}

Culmus teres, nodosus. Stipula nulla: vaginae pollicares, aristae, apice
flavescentes, mucrone brevi flavo terminatae. Spica obovata Invo-
lucium nullum nisi squama in fine, reliqua longitudine dimidia.
Spicae ovato-lanceolatae, margine flava. Spica obovata, magni-
tudine fere nulis coryli, ~~est~~ imbricata, fusco-nigrescens: squa-
mae ovatae, rigidae, planiusculae, laevae, margine albidamembranaeae
in anastem acuminatae; aristae squamis longior, patula, rigida, oculo
armato subserotae. Floresculi nulli inter squamas inferiores

Inutili ad rationem non vidi, et Restio non est, forte potius species Abies
~~quam~~ quamvis habitu convenit forte propriae generis

Habitat in ~~Cap. b.~~

Sw. press. 19.

~~quodlibet sit. Culmo in quo folio, ventis de maris, spici uti glomerosi~~
Corymbosum foliis (spici) terminalibus pedunculatis

Thermopsis / Culmo Inquetro folioso, capitulis lateralibus ^{sub}compositis sesquipedibus
foliis ensiformibus carinatis Lin. Mant. 1759. t. V. p. 96.

Schoenus Culmo tereti, spicis alternis aristatis; singula composita

Schoenus humilis spiculis plummis, per ~~foliis~~ ^{foliis} ~~teretibus~~ ^{teretibus} ~~interstidiis~~ ^{interstidiis} Rothb. gram
La Martii fide herb pag 63. tab 10. fig. 2.

Thorni et Habitat in Cap. b. spic.

subdilespine striatus

La Martii Culmus erectus ^{striatus} bipedalis et ultra teres superne
altero latere canaliculato altero convexo. folia carinata
de ^{capna} ~~capna~~ ^{lovi} ~~lovi~~ ^{margine} ~~margine~~ ^{retorsum} ~~retorsum~~ ^{scabra} ~~scabra~~. Capitula

lateralia e vagini foliorum alterna ^{pedunculata} ~~pedunculata~~ ^{oblonga} ~~oblonga~~
sesquipedibus ^{anistata} ~~anistata~~. ^{vagina} ~~vagina~~ ^{trifurcata} ~~trifurcata~~ ^{lateralia} ~~lateralia
^{pedunculo} ~~pedunculo~~ ^{opposito} ~~opposito ^{ad medium} ~~ad medium ^{rumpente} ~~rumpente
^{manantibus} ~~manantibus ^{ramis} ~~ramis ^{filiiformibus} ~~filiiformibus~~ ^{articulatis} ~~articulatis~~ ^{in his locis} ~~in his locis ^{ferre} ~~ferre ^{retia} ~~retia~~~~~~~~~~~~~~~~~~

^{latus} ~~latus~~ ^{apparet} ~~apparet ^{folia} ~~folia ^{linearia} ~~linearia ^{angustissima} ~~angustissima ^{pedunculi} ~~pedunculi
^{longitudine} ~~longitudine ^{vaginatum} ~~vaginatum ^{con} ~~con ^{pres} ~~pres ^{altero} ~~altero ^{latere} ~~latere ^{parum} ~~parum
^{convexioris} ~~convexioris ^{squama} ~~squama~~ ^{lineolata} ~~lineolata ^{glabro} ~~glabro ^{subdilespine} ~~subdilespine
ternata in aristas attenuata anistro ^{rigida} ~~rigida ^{et} ~~et ^{altitudi} ~~altitudi~~
ne aequali~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Index for spiculas
interstidiis
spicula lineari

— tereti folioso — capitulis ^{spicis} ~~spicis ^{compositis} ~~compositis lateralibus oblongis aristatis
pedunculatis~~~~

Aliis certe descriptionem partium fructificationis oculatus
descriptionem alias certe Rothbottius ea de qua loquitur non non omisit. et.
Quod uti speciem delineavit non est species ^{ipsa} sed modo solummodo vaginae lopi
tulorum radum vixit ^{videndum} ad huc non visibilem, in quotquot enim ex illis specie
quae Rothbottio compositis dicuntur, semper dissecui, semper non nisi unam
quam intra alteram penam decreascentem vidi; numquam vero stamina
vel pistilla. Specimina plura tam otius ut supra descripsi, quam Rothböl
lii conspicua. Et Rel. Wiedenowius primus qui est hucus descriptionem partium
fructificationis tradidit, sed quantum ex ipius descriptione apparet
omnino ab omni parte perfectum habuit.

Thermalis 41 Schoenus panicula ^{us} nutans, spicis congestis, & quamvis lanceolatis
 in inferioribus aristatis, interioribus acutis, culmo tereti
 Schoenus Thermalis; Culmo tereti Triquetro folioso, capitulis latera-
 libus compositis subsessilibus, foliis ensiformibus carinatis Lin
man. 179.

Schoenus culmo tereti; spicis alternis aristatis; singula composita
 & piculis plurimis, per totidem bractear interstrictis Rottb. grana.
63. t. 10. p. 2.

Schoenus bromoides; Culmo tereti folioso, spiculis pedunculatis
 & solitariis crassis aristatis Lamarck illustr. 1. p. 137. fide herbarii
ex

Habitat in Cap. 6. Spei

Culmus altus, penna anserina paulo cum tenuior, ~~ad articulos~~ ~~teretes~~
~~ad articulos obsolete~~ ~~obscura~~ ~~Trigoni~~ ~~capitata~~ ~~spicis alternis~~
~~teretibus~~ ~~convexis~~ ~~altero~~ ~~concavatis~~, folia pallide viridis. Folia
 pedalia, remota, sensim minora & magis approximates, demum in
 spathe ^{formis} ~~mutata~~, lineari-lanceolata, sensim attenuata, margi-
 ne carinaeque serrulato-sabra: vaginae bipollicares & ultra,
 integrae, aetate superiore fissae, fissura filis cancellata, basi fusco-
 flavescentes. Panicula magna, bipedalis & ultra: ~~pedunculata~~
diste

Bananea spatheiformis

Spatha foliacea in aristam longam sensim attenuatam et brevior^{em} desinentem
fusco, apice scabriuscula. Pedunculi ~~quatuor~~ ^{tres} quatuor e singula *Spatha*
inferiores longiores, sensim breviores, supremi brevissimi, longior fere semi
pedalis, ^{iterum divinus} reliqui sensim minor^{es} decrescentes et simplices, omnes, uti pedicelli
laxi, penduli, compressi, laeves, nitentes. Spicae tres-quatuor in singulo ca-
pitulo, sesiter vel breviter pedicellati, lineari-lanceolatae, teretes: squamae
lanceolatae, fusco-ferrugineae, inferae ^{superi} ^{interpositae} longiores, aristatae, superio-
res acutae. Stamina tria, squama distincta a pistillo: antherae nigrae, apice
mucrone ^{recta} ~~rigida~~ terminatae. Pistillum interdum a squamae ultimae: germen
minutum: stylus superne parum crassior, bifidus. Setae sex tam ad stami-
nibus masculinis quam foemineis, albae, superne pilosae.

Scirpus thermalis Rothb. *Sc.*: thermalam descripsit et delineavit secun-
dum specimen ^{in officio} ~~in maturo~~ et non est ~~ut~~ dubito quin Linnaeus similem
habuit et tantum modo secundum habitum ad *Silene* nunc amandamus

~~quod in Candia meridionali~~

1777

~~Milnesii Schreb. in me frugibus soluto, ramulis caespitibus et
terminantibus, pediculis bifidis pedicellatis de Mann. P. En.~~

lanceus 37 Schoenus species paniculatis, squamisque lanceolatis, culmo trigono. +
 Schoenus lanceus; culmo trigono folioso, species paniculatis lateralibus, glumis
 speculisque lanceolatis Thunb. prod. 17.
Habitat in Cap. b. spec.

~~Habit in insulis maris pacificae?
 Culmibus terribilibus, superis compressis, antheris, marginibus
 vili. Etia longis pennis, margine aculeato pectore. Coniula pennis
 nodulis, erectis; pedunculatis, vaginis pennis, pedunculatis, vaginis
 marginibus, antheris, pennis, squamis, glumis, pedunculatis, vaginis~~

Schoenus
 Amboinensis

manicus. Culmo tereti, foliis margine dorsoque aculeatis Lin. L. V

Cyperus longus inodorus germanicus Baud. per. 14.

Cyperus longus inodorus major, foliis et canna serratis Monf. hist. 3. p. 237. f. p. 11. fig. 24.

Pseudocyperus palustris, foliis et canna serratis Scheuchz. gram. 375.

Habitat in Europ. paludibus et marginibus stagnorum

Culmi triplex saepe tripedales stricti foliosi. Folia canna ^{deflexa} elongata
patentia margine cannaque aculeato serratis basi in vaginam
tubulosam oblique truncatam pollicarem. ^{coxae} spicula
corymbosi. Corymbi ^{toti} ^{et} ^{quibus} ^{terminati} pedunculati. frequentes et vaginas
superioribus pedunculati ^{tr} pollicares. Intra compressi altero
latere panem convexum parvum 4-5 ^{lineis} unguicularem vel brevior
squama membranae ferruginea subulata sub ^{fructu}
pedicelli 2 vel 3 spicula 6-9 scissiles in ^{fructu} pedicello
oblonga flavo ferruginea ^{partida}, squama lanceolata

undulatus

~~Schoenus~~ ^{sp. nov.} ~~spicis~~ racemosis lanceolato-oblongis, squamis aristatis,
^{Culmo tereti} Schoenus undulatus; Culmo tereti folioso, spicis pedunculatis pendulis ob
longis aristatis. Lin. mant. 170

Schoenus culmo tereti; vaginis lucidis; spicis distichis aristatis, bin
gulis simplicibus, spatha unica cinctis Rothb. gram. 63. t. 10. f. 1

Schoenus undulatus; Culmo tereti, folioso, spicis racemosis, glumis
aristatis Thunb. prodr. 16

Habitat in Cap. b. sp. ex

Culmus bipedalis ~~tereti~~. Solia pauca, remotissima, superius Culmo
longior, filiformis, margine scabra, laxa: vaginæ bipollicares,
fusco-nigricantes, altero latere cancellatae, florali latiores
uti Culmi in folium acuminatae. Pedunculi solitarii, in fenore
remotiores, supremi approximati, laxi, altero latere cancellati
altero carinati, opice trigoni, crassiores, margine squatis scabrae

Spicae plerumque geminae, altera sessilis altera pinnulata,
biflorae, lanceolato-oblongae, ^{longioribus & culis} ~~sempre pollicares~~, fusco-fermyneae: squam
mae cancellatae, com compressae, carinatae in aristam ^{desinentes}
8 los culus terminalis fertilis, inferior sterilis. Antherae crispatae.

Habitat in Cap. b. sp. ex
Stylus tridens. Semen oblongum, trigonum. 91. l. 16. prodr

Stylus tridens Culmo tereti capillari, capitulo hirsuto, in vertice hinc
vertice

Rottböllius non nisi partem superiorem Culmi vidit, Deoque cum eno₂
dem dixit

involueratus 40 ²⁸ *Schoenus* paniculae ^{utur} nutantae ^{multiflorae} congestae oblongae, squamis inferioribus linearibus lanceolatis aristatis, supremis ovatis mucronatis.
Schoenus involueratus; panicula foliosa, nutante; spicis congestis, aristatis, subdivisis; flosculis gemellis verticillatis. *Rechtb. gram.*

64. t. 19. p. 1.

Habitat in Cap. b. Spei sequenti

Maxime affinis praecedenti, at culmus tenuior. Golia et vaginae angustiores: spicae minores oblongae magis distinctae: squamae ovatae

Flosculum terminalem hermaphroditum invenio, alterum vero ^{inferior} semper masculinum, at quod quogue sui esse apparuit ex ipsa lione *Rechtb. lili*, modo quod ambo juxtapositi oppositi sunt. Setae duae praecedentes

A Sch. flexuosa eadem

@ Sch. flexuosa ^o valde dicitur differens. ~~et~~

Anthemum apice mucronato

rotae, mucrone

hamoso. Setae

ut in sequente

Cyperoides Schoenus Culmo compresso semitereti nudo, spicis sesplibus in vola
cratis tortis: infimo involuicrato Retz. obs. 4. p. 84

Habitatio passiu aridis Deglons

Cyperoides triflorus culmo iniquato nudo, umbella trifloro: intermedia sesplis, spiculi
conjugati Lin. h. v. p. 100. M. J. 97.

Habitatio India orientalis.

Culmi pedales et ultra compressi appressi glabri. Folia filiformia
culmo dimidio brevior, laevia fusca. Spica plennaque tri interdem
4⁷ annis unice, terminalis, intermedia sesplis reliqua pedunculata
unguiculari lanceolata oblongo ^{compressa} acuta imbricata. Squama lata
ovata ~~non~~ conicava margine membranacea carinata acuminate
superiora pallide straminea extima minoris stentis subspirali apice
pediculis unde spica quasi dentata. Pediculi sesquipollicares
patentes

triflorus

spica sespli

Iniquato nudo umbella sub trifloro: intermedia

Cladium ⁵/₆ Schoenus paniculis axillaribus terminalibusque ^{specie oblongis} diffusis, Cul-
mo obtuse trigono.

Schoenus Cladium; culmo

Cladium, culmo nodoso, floribus quasi umbellatis, umbellis gradatis
usurgentibus Brown jam. 114

Schoenus Cladium; culmo obtuse trique folioso laevi, foliis antorse
aculeatis, paniculis diffusis, spiculis unifloris sessilibus diandris.
Swaetz. prodr. 19. fl. ind. occid. 1. p. 97.

Habitat in Gamaicae paludosis maritimis

inter superne Culmus nodosus, obtuse trigonus. [#] folia & esquipedalia et ultra, semipolli-
inter flares alte tam lata, carinata, margine carinaque castalaginis serrata. vaginae
ro lateris cavij altero ^{convexi} ^{univerticillati} ^{alternis} ^{plani}
Bisquipollicares, basi fuscae. Paniculae axillares & terminales,
solitariae. Pedunculi ^{altis} ^{latere} ^{convexi}; alteri ^{univerticillati} ^{alternis} ^{plani};
pedales. # conferti, compressi, margine laeves, laxi, supradecomposita

singuli e vagina ^{divisi} ^{trifidi} ^{singuli} ^e ^{vagina} ^{spicae} ^{trifidae} ^{quatuor} ^{sessiles} ^{parvae} ^{uniflorae}
lanceolata attenuata ^{ovatae} ^{fusco-ferugineae} ^{equinae} ^{oblongae} ^{acutae}

Culmus octo- ^{decem} ^{novem} pedalis. Filamenta duo brevissima. Germen linea-
re oblongum: stylus trifidus. Semen ovatum, acutum nitidum fuscum

Swaetz. l. c. Differt a Sch. manicop. culmo altiore; obtuse Panicula
maxima, diffusa; pedunculis pedicellisque longioribus; filiformibus: spi-

37

Alam e Porto nicomit ^{culis minoribus} ^{Swaetz. l. c.}
Swartzii, fructiferis ovato globosis; semibus globosis, fusco alboque variegatis ut tamen diversus ^{vel}

~~perillus~~ S. Culmo triquetra fibroso, foliis setaceis, paniculis aggregatis, floris
lis diandris. Sw. prod. pag. 20. Tw. ii: pl. Tab. 6.

Habitat in Jamaica
Culmi plures altissimi. Digni minimi superne villosuli. Folia culmo parum
brevisis margine tenuissime ciliati. Panicula 3 in apice squarrosa ovata
oblonga. Stylus trifidus semina punctatum ca. 4: Sw.

maniscur 35 ⁴ Schoenus panicula contractus, ^{Spiculis oblongis,} Culmo tereti

Cyperus longus inodorus vulgaris Park. theatr. 1263.

~~Cyperus longus inodorus sylvaticus Germa 24~~

Cyperus longus inodorus germanicus Bauh. theatr. 221

Pseudocyperus palustris, foliis et corina serratis Schenck. gram. 375. t. v. f. 7-11.

Schoenus maniscur, culmo tereti, foliis margine dorsoque aculeatis Lin d. gottl. 270 Roth fl. syst. veg. 96 Roth. fl. germ. 2. p. 46. Jacq. collect. 3. p. 72.

Habitat in Europae paludibus 4

Culmi tripedales et ultra adorsi. Solia e simili praecedenti. Diversus Culmo

Culmi tripedales et ultra. Solia elongata, margine caninaque serrata Pedunculi axillares et terminales solitarii, bis vel ter divisi.

Spicae quatuor - qz sex, sessiles, ^{oblongae, obtusiusculae} flavascenti fuscae nitidae.

Aliam a Porto ricco misit West hinc similem: distans spiculis flori-feris similibus; fructiferis gl. ovato-globosis, fusco-ferrugineis; seminibus globosis, fusco albidoque variegatis. an potius sequens

adulterior? culmi vero teres nisi ad vaginas

panicula magis diffusa

Culicaris Schoenus

Habitat in Florida ^{Deill.} herb. Richard

Culmi glauci viridati, pedales, basi foliosi, compressi. Folia basi frequentia
linearia, polliciana, stria carinata, obtusiuscula, 3. 4 in culmis, remota, margi-
ne villosa-ciliata. Capitula terminalia, 3, fastigata, pedicellati, interdum 3,
ex ala superior

am nō inaequali ³ Schoenus; Diffusus
Subsolitarius, foliis longis simis.

Schoenus radiatus Forst. Prodr. n. 491

nova Caedonia Fabricius Professor VriLonensis

Habitat in capulis maris pacifici 4

Culmibus ^{superne laeves} ~~superne~~ inter flores compressus, ancepis. ^{marginibus laevibus} ~~marginibus~~ ^{laevibus} ~~laevibus~~

us, margine aculeato & scabra. Panicula pedalis: pedunculi

pedicelli margi ^{ne scabri} ~~ne scabri~~ ^{partiales gemini e singula vagina, filis raris filiformes, compres-}

si; vaginae pollicares, sensim minores, remotae, aristatae,

ferruginae. Spicae & solitariae ^{axilla} vel geminae in apice pedicellorum,
parvae, oblongae, teretiusculae, acutae, ^{axilla} subdistiche imbricatae, fuscae: squa-

mae ornatuae, acutae.
Culmi nodosus, spiculae

int. ~~capitulum~~
~~triflorus~~ caulmo tereti articulato lavi, capitulis tribus terminalibus. Thunb.
prodr. pag. 16. sub nomine triflorus
Habitu in cop. d. spec.

77
non vidi

microstachys ² Schoenus pedunculis axillaribus ² subgeminatis
³ sessilibus oblongis, foliis Culmo foliis que filiformibus globosis
Habitat in Cap. b. spec. 4

Culmi plures, semipedales, ^{filiformes} inferiores teretes, superiores ~~semiteretes~~, ^{acutiusculi} foliis cana

Squamis inter
stincti

Folia ^{lanatilata} lanatilata, remota, altitudine Culmi, canaliculata, ex ^{trorsum} ~~trorsum~~
serrulata, rigida: vaginae pollicares, ^{demum bracteae} ~~semim~~ minores. Pedunculi axilla
res, terni gemini, terni, interdum semel divisi, ^{trianguli} ~~trianguli~~, margine serrulati.

Hae nunc reliquis ^{acutae} spicae duae vel tres sessiles, oblongae, parvae, fuscae fuscae: Squama infi
longioribus, interma in mucronem longitudine spicae desinens, reliquae ovatae, acutae,
in genibus ^{carinatae} ~~carinatae~~
ne bi Tripolli
Carso.

hispidulus
hictus 3k

Schoenus

pedunculis axillaribus ^{monostachyis} terminalibusque ^{tristachyis} ~~monostachyis~~

Spicis subglobosis, foliis filiformibus ^{hispidulis}

Habitat in Americae Carolina? Est herbario Lamarckii

pedicellatis

Hispidulus Radix fibrosa. Culmi palmaris ^{nodis} spithamei, ^{angulati} filiformes, ^{angulati} hispiduli. Folia linear superiora distantia, duo ad quatuor in culmo, superiora culmo longiora, linearia, inferne carinata, his margine carinaque hispidula: vaginae breves. Pedunculi axillares, ^{solitarii}, laterales ~~simpliciter~~ vel pedicello unico ductus atque solitarii, terminales interdum gemini; pedicelli versus apicem, plerumque gemini, interdum unicus, pollicares vel minores, alterni, ^{laxi} hispidi. Spica tres, sessiles in capitulo globosa globosa, magnitudine semi-nis coriandri, glabra: squamae subrotundae, concavae, fuscae. Olosculi tres. Stamina tria. Stylus bifidus, purpureus, glaber. Semen globosum undulato rugosum.

monostachyis

Asperatus L. Culmi & liguque setaceis longissimis, floribus tenuissimis anfractis
Rott. grabn. pag. 67. Tab. 16. fig. 5.

Habitat in Cap. b. p. c.

Culmi plures filiformes, pedales sulcati semiteretes, latere plano
canaliculati. Clavescenti basi ferruginei, squamis linearibus distinctis
et laque cancellata atro-purpurea cincti. folia ad radicem basi cono
luta setacea margine subaristata longissima: caulina remota vagi
nae glabrae atro-purpureae nitidae saepe pollicari. Pedunculi at illare
caulini, filiformes, flexuosi retrosum margine scabri subinflati folio
breviores inferiores setosi tapenorei bini et terni. Specio vagina patho
ica margine serrata oblonga, crispata sicula tubulato fusca.
Squamis oblongo lanceolato anfractis, inferius 4. variis Rottb.

Trigono

Setaceis 30 Schoenus pedunculis axillaribus terminalibusque subtrifloris, culmo foliis
que setaceis
Schoenus setaceus; culmo tereti striato, foliis setaceis, floribus latera-
libus Berg in Act. Soc. helv. 7. p. 130 t. 9.

Schoenus setaceus; culmo triquetrop. foliis que setaceis, spicis aggregatis,
floribus diandris Rottb. gram. 62. t. 21.

Schoenus setaceus; culmo triquetro subnudo, foliis setaceis, spiculis
aggregatis, flosculis diandris Swartz. fl. ind. occid. 1 p. 107.

Habitat in Surinamo, Caribaeis, Carolina

Culmi pedales vel minores, setacei, uninodosi - binodosi. Folia duo-
tria, culmo breviora, remotissima. Pedunculis ut axilla superiore
solitariis, terminales plerumque gemini, cum folio setaceo ad basim
pedunculos aequante. Spicae duae - quatuor per, pubescentes, acutissi-
mae, pallide fuscae: squamae infimae ovatae, mucronatae; inter superio-
res lanceolatae. Stamina duo. Stylus bifidus. Semina subrotunda,
marginem compressa, rugosa, bidentata.

Capitata Schoenus

Thuller

Habitat Campis herb. hirt.

Calmi plures

fasciatus 50

pedunculus

terminalibusque, spicis

Schoenus spicis axillaribus (sub & solitariis pedunculatis, squamis ar-

istatis, Culmo filiformi tereti, foliis glaucis
Schoenus fasciatus; Culmis foliisque setaceis longis & imis; floribus
tenuis & imis aristati Rothb. gram. 67. t. 16. f. 5.

Habitata Cap. b. sp. 2

Culmi plures, pedales et ~~ultra~~ ^{adnatis, articulis geniculi remotis} teretesq; in fovea tereti, & superiores
~~premiteretes altero latere~~ ^{canaliculati, basi involuti vaginis fuscis}
altero latere cancellatis. Folia ~~& setacea~~ ^{longa, canaliculata,}
marginibus & scabra: vaginæ caulinae vix pollicares, fusco-nigrican-
tes, nitidæ. Pedunculi axillares, sæpe terni, foliis brevioribus, ca-
pulis res, marginibus scabri, subtristachyi. Spicæ remotæ, pedicellatæ,

subulatae, tenues. Bractea linearis ad basin singuli in aristam desinens, fusca: Squa-
mæ lineares

An Sch. copilla cum Thunb.?

fruct. 4. cap. 10.
Habitata in cap. b. sp.

pedunculus filiformi tereti, capitulo hemisphaerico, involucro polyphylo Thunb

~~Thes.~~ Habitat in India orientali prope Tranquebar Rottler

Culmi plurimi, pedales; ~~teretes~~, flavescentes. Folia culmo duplo breviora
cavo linearia, angusta, planiuscula, glauca viridi, basi ~~concolorata~~
glauca viridi. In volucribus, rarius monophyllum, ~~potentissimum~~
umbella longius: foliola longius tripollicia umbella longior, longius
tripollicata, filiformia, basi dilatata, ~~coctem~~ ~~struente~~ foliorum
capitula ^{triacul} ~~triacul~~ ^{es} ~~es~~, quatuor sessilibus, pappi nigro dimidio minoribus, ~~ovatis~~
obtusis ~~guineis~~, ~~undique~~ ~~ante~~ ~~imbricatis~~, juniora alba, aetate fusca.

capice saepe
sphaeralata

~~Squamae alatae~~
Squamae ~~obovatae~~ ~~concolorae~~. Pappulus ruber singula squama, ~~his~~

te flagulorum spina
lites apiculatis
apiculis curvis

~~par minuta~~, lineari, unisalvis. Stamina tria, alba. Germen
oblongum & styli duo, albi, ~~stymata simplicia~~ ^{indivisi.} ~~Roctus~~ ~~post~~ ~~coctem~~

Corolla membranacea, excavata. Stamina duo, linearia. Antherae
erectae, lineares, flavae. Germen ovato-oblongum, dia. phanum

Styli duo & stymata simplicia. Semen ovatum, & triatum, altero
latere planum, altero convexum Rottler

proprie generis

Stamina tria King

7
laevis 28 *Schoenus spicis capitulis lateralibus, spicis ovatis, squamis mucronatis,*
Culmo trigono +

Schoenus laevis; Culmo trigono folioso, capitulis lateralibus, glumis
mucronatis, spicis ovatis Thunb. prodr. 17.

Habitat in Cap. b. spici.

Schoenus culmo tereti

Schoenus

monoccephala V. Culmo filiformi tranquetro, capitulo globoso sessili; involucro
triphyllo longissimo ^{Phyt. gramin. p. 104. t. 11. fig. 47} Lin. Suppl. p. 104. f. V. p. 101.

See Motenga Rheed. mal. 12. p. 99. t. 53

Græmen cyperoides, spica compacta alba foliis adpressis par
tibus albis, partem vridibus Sloan hist. p. 119. t. 70. fig. 1

Schoenus coloratus, culmo tranquetro, capitulo globoso, sessili; involu
cro tetraphyllo longissimo plano variegato Lin. Spec. pl. p. 84

Habitat in Indiis

Græmen capitatum Rumph. amb. 6. p. 8. t. 3. fig. 2.

Radix repens Culmi solitarii distantes palmari et spithame
mori erecti basi foliosi vaginati glabri folia canalicu
lata glabra culmo solum aeterna margine scabra

capitulum terminale magnitudine nisi sessi? involu
cro² longissima fornicata foliorum tertium angustius

sesqui pollicare Siquamo ovato attenuato dorso line
aridi

Græmen spicatum repens, spica subrotunda herb. Tenore

capillaceus 29 ⁸ Schoenus spicis puberacemosus, squamis mucronatis, culmo tereti
foliis capillaceis +
Schoenus capillaceus; culmo tereti folioso, spicis puberacemosis, glumis mu-
cronatis, foliis capillaceis Thunb. prodr. 16.
Habitat in Cap. b. p. nec.

~~capillaceus 1. culmo angulato nudo, spicis serminalibus sermo foliatis
nudi in Egypt. pag. 103 + B. V. pag. 99.
Habitat in Africa.~~

Coronarius Scilicet in quibus nudo, vaginis foliorum glabris capitulo terminali
sespili involucri ~~foliis~~ ^{patentibus} longo floribus monandris

Habita in nemoroso prope Richardum in eis orientalis Hongy
Culmi plures, striati, basi culmum setacei inquetur

Adix ^{Setae} ~~foliis~~ ^{basibus} culmo breviora, basi vaginantia, ut
bulbosa vaginis. Capitulum sespile p. o. paniculae major. Spicula nuda
ovata attenuata. Involucrum s. phyllum, ^{patentibus} inopia pollicem
foliolo unico sesquipollicem reliqua sespim deorsum
Sabiula lanceolata retusa

fructa

Spicatus ~~X~~ Schoenus culmo tereti, foliis betaceis vaginantibus, florum parvula ~~pa~~
~~g.~~ Burm p. 4. r. 3.
Habitat in Cap. b. p. p.

gradi-florum Dichrocarpum foliis linearibus oblongis utrinque obtusis
v. lobis ciliatis maximis
Anom. gradi-florum Burmanni. x. var. p. p. 1.
Habitat in Carolina. h. b. h. f. f. 1.
Rami teretes, glabri: ramuli nudi Ymnoslophi. corti brevissima reticulata, h. y. v. l.
Laminae utrinque ad angulum obtusum, venosae, supra glabrae, sub
Lenae, cuneatae, utrinque obtusissime, ad angulum, venosae, supra glabrae, sub
dors. tuis pallidiores, venis nudo Ymnoslophi. ^{in obliqua obtusissima} ^{reticulata} ^{h. y. v. l.}
nudi, unis floribus: Calycis folia crebra. Catula obtusata, pallidiora
v. utrinque oblonga.

Subulate. *Rhynchospora corymbis* ^{simplicibus compositis subcompositis subcompositis} ~~compositis~~ pedunculis elongatis inaequalibus ^{rari}
Liliis speculis sessilibus alternis.

Stroemi corniculatis culmo trigetro foliosus, corymbis alto, nris com-
positis laxis densis, speculis corniculatis aristatis La Mart. illust.
1. p. 137.

Habitat in Carolina, Florida

Culmi ^{margine subtriusculi} trigetro: ^{multiflori} pedunculi ^{rare flor} approximati inferiores altiore 3-4
pollicari, superiores ^{stylis} vix pollicari, ^{stylis} compressi, margine scabra
unicuius ^{includit} base ramo trifloro ^{stylis} aucto ~~foliis~~ ~~florati~~ pedunculis multo

his breviora. Speculis in pedunculis longioribus quinque in breviori-
bus et partialibus, subulati ^{e tuberculis minutis stemis scabra} molliora fere pollicari qua nota distin-
gitur ~~hostium~~ ~~seminum~~ ~~seminis~~ ~~longior~~ ~~stylis~~ ~~endurser~~

Semen oblatum compressum magnitudine fere ^{canalis} ^{orulo} ^{armato} ^{pedun}
punctulatur

Cyperoides **46**. Schoenus umbella terminali, Spicis glomeratis, culmo triquetro
procipio Swartz prod. 19 Fl. ind. oecid. 1. p. 110.

Schoenus cyperoides; culmo triquetro folioso, umbella terminali, Spiculis glomeratis Swartz prod. r. 19. Fl. ind. oecid. 1. p. 110

Habitat in montibus Jamaicae australis

Culmus bipedalis, trigonus. Folia semipedalia, linearia, basi carinata,
striata; glabra; carina serrata. Pedunculi est vaginae foliorum ter-
minantium, plures, inaequales trigoni. Spicae in glomerulis termina-
libus; interdum compositae, confertissimae, sessiles, acuminatae, paten-
tes: 3/4 quae inaequales subimbricatae, interiores teneriores; angu-
stiores; minores, uniflorae. Stylus trifidus. Semen obovatum, fere
obcordatum, obtuse trigonum, ferrugineum. Setae duae longitudine
subaequales Swartz. l. c.

feliciformis S. Culmo tereti capillari, capitulo oblongo, involuero triphylo ~~plano~~
prod. pag. 16.
Habitus in C. b. sp.

non vidi

6
 inanis 27 Schoenus aphyllus, panicula terminalibus. gr. 21.
 Panicula ^{quae} ~~paniculata~~ oblonga, involucri acutis, culmo tereti
 Schoenus inanis; culmo tereti aphyllis, panicula terminalibus, glomeris acutis Thunb.

prodr. 16
 Habitat in Cap. b. 3 p. 1

Culmus crassitie pennae arborescens, superne punctis fuscis irroratus. In
 solis cum bracteis spatulae formis, ^{fusco-flavescentes.} duae inferiores approximatae, inaequantes
 remotiores, infima ^{brevi} ~~ovata~~ oblonga, mucrone subulata terminata, re-
 liquae lanceolatae, longiores et longius mucronatae. Panicula terminalis
~~longa~~ - quatuor a singula bractea, ^{capis compressis, laxis} longior ex ^{inae} quales longior ex in-
 ferionibus tri-quadripollicares; pedicelli breves monostachyi - 2 stachyi.
 Spicae oblongae, fuscae pallide fuscae parvae: 3 quae omnes
steriles, oblongae, mucronatae. Stigma obovatum: stylus trifidus. setae
nullae.

† pedunculati

45
 Habitat in Cap. b. 3 p. 1
 F. inanis. Culmo tereti, capitulo ovato, involucro triplyllo Thunb. prodr. pag. 16

hastata *Urtica* foliis oppositis cordatis lanceolatis dentatis spicis ramosis

divaricatis caule fruticoso

Communicavit Dr. Cabanis

Rami teretiusculi superne pubescentes.

Folia petiolata bipolliciana et ultra, grosse dentata, subtus villosa

superius glabra.

Petioles tomentosi hispidi

num. 2 ⁵ Schoenus ap Lyllus, 3 pa paniculis ^{lateralybus.} ~~vesminalibus in volucria~~ ~~more~~
phylla rigida pungentia brevioribus, Culmo tereti apice subulato
gripso ~~per se pille~~
Habitat in Cap. v. 3 pa

Culmus teres, penna columbina fere crassior, desinens in involucri^{um}
pannicula longiore, basi vaginans, Superne subulatum, rectum,
rigidum pungens, flaves fusco-flavescente, simile sub pedunculis
partialibus et spicis ad pedunculis spicis que brevius. Pannicula
contracta: pedunculi tres, quatuor a singula vagina in involucri,
altero latere plano, altero convexi; pedicelli brevis pimi mono
stachyi. Spicæ subsemipollicates, lanceolato-oblongae, fuscae.
Squamæ lanceolatae, mucronatae, carinatae, laeves; flosculus
unicus ter inter squamas terminales. Stamina tria. Germen
minutum: Stylus tenuis bimus, quinquefidus. Setae parvae.
Singularis stylo quinquefido.

. 82 m

Cuspidatus 25 A. Schoenus spicis paniculatis involucri solitario brevioribus, culmo
tereti
Schoenus Cuspidatus; culmis teretibus, subnudis; panicula tenuis sima, lineari
lineari; bracteis annularibus, obliquis, brevissimis, mucrone longissimo termi-
natis Rottb. gram 66. t. 10. f. 3.

Schoenus Cuspidatus; culmo tereti, spicis paniculatis involucri breviori-
bus Thunb. prodr. 16

Habitat in Cap. b. spici virg 24

● Culmi ^{plures} sesqui pedales, teretes, viridi flavescenter. Folia filiformia
canalicula culmibreviora, canaliculata, rigida: vaginae ^{fusco-} puro
scinter. Involucrum bractea ^{fusca} annularis in folium de vacuo altero
latere des. adunatum, spica longior. Spicae quatuor
duae pedunculatae, duae subsessiles; ramulorum ^{quingul} tres in unico
pedicello et tres in altero, subulatae, tenuis simae.

Schoenus teretis culmo nudo subcompresso, umbella terminali composita
in fructu bractea terminali de monte T. Enc. veg. 111.
Habitat in Madagascar.

obtusifolius

Scirpus spicis oblongis congestis, involucri subtriphylla umbella
composita brevioris, foliis linearibus ~~obtusis~~ rigidis

Scirpus obtusifolius; culmo nudo, umbella parva subsim-
plicifolia brevibus angustis glaucis obtusis. Lamark illustra
1. p. 141.

Habitat in India orientali, in Guinea Thonning &
radix crassitie pollicis, ~~vagina~~ ^{basi foliorum} ~~retundis~~ ~~nigris~~ foliorum
basi foliorum ~~vaginam~~ ~~tecta~~, apice radiculis copiosis
filiformibus terminata. Culmi plures, pedales, apice
trigoni

3
 Com par 27 *Schoenus* ^{aphyllus, alternis} *speciis glomeratis, sessilibus pedicellatis, ^{que} involucri monaco solite*
 no, Culmo tereti

Schoenus com par; culmo tereti nudo, spica composita, spiculis geminatis lin
 mant 117

Schoenus capo strictissimo tereti; spicis glomeratis; bracteis subulatis
 Rottb. gram. 65. t. 18. p. 4

Schoenus com par; Culmo tereti aphyllis, spicis aggregatis involucri monaco
 phyllis brevioribus, glumis acutis Thunb. prodr 16.

Habitat in Cap. b. Spei

Culmi bipedales, sulcis exarati superne subulati. Involucrium mono-
 phyllum sub singulo glomerulo, ersitum, ^{capice} laevi subulato laevi subulatum
 basi rigidum, inferius longius serrulato - ^{um} scabrae, inferius longius.

4 Subtus carinatum
nitidum, fuscum

Spicae duae ^{oblongae lanceolatae teretes, nervos breviter pedicellatas}
^{vel tri-junctae sessilibus, oblongae, magnitudine fere tri-grano}
^{diffusa in florae}
 tritici ⁱⁿ squamae infimae ovatae, in superiores lanceolatae, omnes acutae,
 basi flavescens, apice fuscae. Antherae ferrugineae, cuspidate flavo
 terminatae. Stylus trifidus Germen obovatum, tuberculato ^{atque} termina-
tum, Stylus trifidus

Staminodia in locis terminis flosculo terminali, quatuor in reliquis
 numeravit Rottb. qui quoque ^{numeravit} quatuor in reliquis
causis flor. in terminis non
tantum fertiles esse reliquos steriles

8

Spicis cylindricis, spiculis patentibus, bracteis spiculis longioribus

bus

Kyllingia incompleta, culmo triquetro folioso, umbella compo-
sita termi-

Kyllingia *Kaya*
nensis; umbella
terminali: spicis

nae composita, spicis cylindricis, calyce monophylla Faegu. coll. ec. 4.

in Capenna v. Rohr
Habitat locis ⁱⁿ ad Caracas Americae, ^{Zalami}
culmi ^{plures}, bipedales ^{et ultra}, crassitie pennae columbinae, obtuse
trianguli, basi ^{infera} ^{infera} foliis: folia altitudine ^{vel ultra} culmi, ^{semiconglutina}

Sub-actophyllo ^{fero} lata, ^{carinata} vaginae perperascentes. Antheridium uniser-

lamarch. illustr. ^{bale} subhexaphyllum: folium unicum pedale vel bipedale. Umbel-

l. p. 149 ^{lae} radii ^{plures}, ^{trigoni}, ^{tri} ^{quetro}, ^{longiores} ^{bipolliares}: ^{partialis}

quadri radiata. ^{Luciae} interdum ^{quatuor}, interdum ^{solitariae}, ^{cylindricae}, crassitie ^{peninae} anserinae, ^{pollicares} - ^{bipolliares} - spicu-

Bracteis ^{bataeis}, ^{lae} ^{patentissimar}. Calyx ^{bivalvis}: valvulae ^{membranae} - ^{lineae} - ^{lineae}

spiculis ^{longioribus} ^{lae} ^{glumae} ^{ovatae}, ^{marginis} ^{laevibus}

Spontanea, ubi et ^{proprie} ^{est} interdum ^{culta} spicis ^{sessilibus}
quinque - septem, laterales undique horizontaliter patentem, inter

umbella
interdum ^{simplex} ^{medicus} ^{erectus}. Calyx ^{iste} ^{est} ^{bivalvis}, ^{minutissimus}, ^{bracteis}
interdum ^{composita} ^{lae} spiculae ^{maturae} ^{abraduntur}, facile ^{valvulae} ^{quae} ^{post} ^{casum} ^{flo-}

Spicatus 2¹/₂ Schoenus capitulis spicatis involutatis, culmo tereti capillari.
Thunb. prodr. 16. +

~~Schoenus spicatus; culmo tereti capillari, capitulis spicatis involu-~~
~~cratis Thunb. prodr. 16~~

Habitat in Cap. b. spec

~~Scopus~~

~~Habitat in Carolina herb. Guss~~

~~Culm. plures~~

Lakes

19
 aristatus ~~20~~ ^{aphyllus,} *Schoenus* spicis aggregatis, involu squamis cuspidatis, in volucrio mono-
 phyllo, culmo tereti. +
Schoenus aristatus; culmo tereti aphyllis, spicis aggregatis,
 involucrio monophyllo, glumis cuspidatis Thunb. prodr. 16
Habitat in Cap. b. spici

20
 aristatus ~~20~~ ^{aphyllus,} *Schoenus* spicis aggregatis, involu squamis cuspidatis, in volucrio mono-
 phyllo, culmo tereti. +
Schoenus aristatus; culmo tereti aphyllis, spicis aggregatis,
 involucrio monophyllo, glumis cuspidatis Thunb. prodr. 16
Habitat in Cap. b. spici

flexuosus. Culmo tereti foliis, spicis paniculatis, glumis mucronatis
Thunb. prodr. pag 16.

Habitat in Cap. b. ppei

Culmi pedales teretes foliosi. Folia e vaginae hujus tubulosa
fusa nigricantes pollicares remoti folia e vaginae 3-2 pollicaria
na, rigida apice fusca. pedunculi e vaginae superioribus gemi
ni inaequales compressi pariter brevissimi pedicelli inflori spicu
lo teretes oblonga fusca nigricantes squama lanceolata mucronata
flo. unius

non huius descripta Thunb omnino Thunb in Caltens

18.

rufus ~~choenus~~ ^{choenus} spica disticha, spiculis paucifloris, involucri monophyllo, Culmo ^{tereti}

Schoeni compressi varietas Lightf. fl. Scot. 113 p. t. 24. f. 2.

Schoenus rufus; Culmo tereti nudo, spica disticha, involucri monophyllo obtuso longiore, spiculis paucifloris, foliis canaliculatis

Smith fl. angl. 1. p. 45.

Habitat in paludosis Scotiae, Helvetiae &

similis precedenti, Diversus: foliis canaliculatis, angustifolius ^{ibus}
natis, nec sequilineam latos angustioribus. spica tenuior: ^{ibus}
spiculis bifloris plerumque bifloris: stylotripido squamae inferiorae
longitudine spiculae: stylotripida.

cephalotes L. culmo folioso Inquieto; involucrio tetraphyllo deflexo; Capitu-
lo oblongo terminali

~~Leopoldus cephalotes culmo Inquieto nudo capitulo ovato squama
so, involucrio triphylo longo Lin. Sp. plant. pag 76.~~

~~Habitat in India occidentali Jacq. herb. Ta 1 Tab 97. pedale~~

~~Culmis erectis altis; angulis acutis Combus. Solia longa
superiora culmo altiora connata semirigida lata mar-~~

~~gine scabriscula Involucrum striatum setosum
longum reflexum dependens oblongo interdem 2-3 unciali
Spicula numerosa in capitulum oblongum magnitudine
Censurari, squama ovata acuta~~

17
compressus ~~††~~

~~†† Scirpus lateralis~~
Schoenus ~~spica~~ ^{spicula multiflora} ~~composita disticha~~, involucri monophyllo, Culmo subtriquetro teretiusculo

Gramen cyperoides, spica simplici compressa disticha Raii Synops.
425. Schaub. gram 490. t. 11. f. 6.

Carex uliginosa; spica composita, spiculis androgynis inferioribus remotioribus folio longiore instructis Culmo var. Lin. fl. Suec.
Syst. veg. 887.

Schoenus compressus. Culmo subtriquetro, spica disticha, involucri monophyllo Lin. Syst. veg. 971. Poll. pal. n. 30. t. 1. f. 3.
Leers herb. 32. t. 1. f. 1.

Scirpus caricis; Culmo subtriquetro nudo, spica disticha compressa, involucri monophyllo Retz. prod. n. 64.

Habitat in Europae paludibus turfosis

- Rod. & Stolonifera. Culmi palmares - pedales, superne altero hinc parum complanatus, basi vaginis foliorum fuscis foliorum recti. Solia Culmo longiora vel breviora, linearia, carinata, marginibus abtuscula. Spica terminalis, ovato-oblonga, interdum pollicari: spiculae quinque pedicinis oblongae, fuscae, nitentes. Squamae ovatae, acutae. Stylus bifidus, Samen oblongum, trigonum

non ubi nisi in hoc Japonia
interdum

setae plures, & emine longiores, ope lentis retrorsum pilosi

Dolium sub specie plerumque ea longior, ~~specie~~ ~~vidi~~ ~~autem~~ ~~idi~~ ~~di~~ ~~spe~~
Specimina ^{veroy} autem vidi ubi brevius erat, variat quoque speciei angustiori ba-
sal latioribus.

Roberta Dr. calamo Amygdalo, capitulo Vermiculi, confectione pentaphyllo Rata
off: 4. p. 9 +
Glabra Dr. regionis
Raciosa plures comperit a Numeo fusio in loco balneo. Setae emine
eaeque sicuti ad hanc calami capitulum sicutum bene dem
nole invertebantur, noli. Noli. Sicuti plures sicutum
fandi orati, comperit, sicutum: fructum sicutum, sicutum
capitulum: longior, brevissime sicutum sicutum longior
Roberta

16
Triplachyos ¹⁶ Schoenus capitulis tribus, culmo ~~ant~~ ^{super} tereti articulado tereti +

Schoenus Triplachyos; culmo tereti articulado laevi, capitulis tribus terminalibus. Thunb. prod. 16.

Habitat in Cap. b. spec

Dypterus
Atakota in Java herb. musc.

ovatus 17 ^{aphyllus,} Scirpus culmo subcompresso filiformi, ^{vaginae mutuae} spica ovata, squamis oblongis, floribus ^{sub}dicandis.
 Funiculus ^{(medius) minor} clavatus capitulis rotundioribus monis. hist. 3. p. 233. f. v. t. 10

f. 34
 Scirpus capitatus

Scirpus compressus; radice fibrosa non repente, culmo nudo ^{ae} caespitoso subcompresso erecto setiformi, spiculis terminalibus solitariis subglobosis nudis, glumis & laminibus duobus tribusve, stylo bifido Moench. meth.

394

Scirpus intermedia Scirpus ovatus; culmo subcompresso nudo filiformi, spica ovata Vermidicus; aphyllus: nali, floribus dicandis Roth. catal. t. 1. p. 5

Spica oblongo-ovata, subacuta; de ovata, obtusa, compacta, fusco-ferruginea, squamis parvis ovalibus, bracteis rotundatis obtusis Thunb. fl. par. 22.

Habitat in Gallia et Germania humidis & palmaris et ultra. Socii nulla. Vaginae tenacitate.

fl. par. 21 Spica magnitudine fere seminis Cenandi: squamae fuscae, dorso

radix fibrosa virescentes, apice marginis parum membranaceae. Semen flav. pyriforme
 Annuus An radix vera et in Sc. annuo Thunb. in 3. tam & simili est
 Compressus ut et demta quod rotundiorum robustior vix et Differentia indagatur
 flor. ut idem non potius intermedius Thunb. tum annuus. Distinguas culmos
 48 Schrob. spic. 20 19 semituberos. tuberculato oval.

micronatus / ⁵/₆ Schoenus capitato sub globoso, involucri longissimo reflexo, culmo ter-

ti
Nalli 3. Alp Egypt

gramen Cyperoides maritimum Bauh. Theatr. 91

Scirpus maritimus, ^{capitata} caule glomerato Tournef. inst. r. herb. 46 Schenck
gram 367. t. 8. f. 1.

Cyperus capitatus. Schoenus micronatus; culmo tereti nudo, spiculis oratis fasciculatis
culmo tereti nudo, involucri subhexaphyllo, foliis canaliculatis Lin Syst. veg. spec. pl.
capitulo glomerato, 63. Syst. veg. 98.

foliis terminali
Vand. fasc. 5

Scirpus Nalli; culmo tereti, foliis, spiculis terminalibus; confertis, & sessilibus; involucri longitudine foliorum Torrh. desc. p. 15
Cyperus aegyptiacus; culmo tereti nudo, apice spiculis multis compactis, involucri maximo foliis que recurvis Glossin obs. bot. 20.
t. 3.

Habitat in maritimis arenosis Europae australis, Africae bore-
alis, Smyrnae &

Radix bulbosa, crassitie digiti intermedia, & stoloni-fera: & stolones
pedales, squamis lanceolatis ferrugineis tecti. Culmi solitarii,

ruber ^A 17 Schoenus capitulo subrotundo, involuero monophylo lanuginoso, Culmo
Tereti. +

Schoenus ruber; Culmo Tereti nudo, capitulo subrotundo, involuero
monophyllo Lour. fl. Cochinch. 41.

Habitat in Cochinchina

Culmus bipedalis, erectus. Folia graminea. Capitulum rubrum compactum
Involubrum base. Lour. l. c.

nigricans Culmo vesti nudo, capitulo ovato, involucri diphylly valvata
altera subulata longa infl. Swi: 394

Guncius lewis minor, panicula glomerata nigricante Monj. hist. 3.
p. 233. f. o. v. 10. fig. 20.

Guncius Lithospermi femine Magn. monsp. 145. v. 144

Guncio affinis capitulo glomerato nigricante Scheuchz. gram 344

Habitat in Europa paludibus offate exsiccatis 7

Culmi caespitosi erecti fructi spithame, pedales interdum ultra
teretes basi vaginis foliorum fusis vesti folia subulata
nigrescunt glabra ~~interdum polliciana~~ ~~interdum~~ culmo
dimidio brevior panicula terminali fasciculata lanceolata
acuta semper uniqua ulares compressi spithame fusis nigricanti nuda
interdum ~~interdum~~ usque ad viginti involucri foliolum
inferius basi dilatatum oblongum fusis nigricans in fol
in acumine pollicari attenuatum curvato fusis capitula
duplo longior apice fusis alter ovatum multonatum capit
tulo brevior

Schoenus nigricans Thunb prod. fl. Cap.

Bobartiae ³ 14 Schoenus capitulo involuero pentaphyllo brevior, Culmo compresso,
80, foliis linearibus. †

Schoenus Bobartiae; culmo compresso, capitulo terminali,
involuero pentaphyllo Retz. obs. 4. p. 9.

Habitat in Zeylona

Radices plures, congestae tunicis fuscis inflatis bulbosae.

† Involucrum per folia linearia, saepe altitudine culmi. † Capitulum 3 pira
tophyllum; foliis tum, breve, terminale, involu- Spicae plures: 3 squamae
lis decrescentibus canisae, ovatae, carvae, subquinariae Retz. l. c.
longiore novem pollicare
brevisimo 3esqui
pollicare

16 conferatur cum Cyp. cephal. et Cypar. Dubii

pelopus L. culmo tereti aphylo vagini pilosiusculi spiculis terminalibus
tubis ternis involucri aphylo

Habitat in America meridionali

Culmi plures pedales erecti filiformes glaberrimi basi
vaginis foliorum tereti ^{sp.} folia altitudinis culmi filiformi
omni striati pili minuti in striis vaginis oculo armato
videndi vaginis striis ⁱⁿ pili minuti magis compressi
pili longis barbata. Spicula terminalia tres seple
canaliculata compressiuscula ^{terminalia} involucri foliolis ad
pollicem attenuis usque velis

Schoenus pelopus ~~Walden~~ phyt. p. 381. fig. 3

2
Striatum 13 Scoenus capitulo ovato involucri triphylo breviora, culmo foliisque
filiformibus
Schoenus striatum; culmo tereti, capitulo ovato, involucri triphylo Thunb.

prodr. 16

Habitat in Cap. b. spici

Radix stoloniifera. Culmi duo - tres, sed gemipedales, bulbosi, basi vaginis
foliosum involuti; filiformes. Folia culmo breviora, canaliculata:
vaginae latae, fusc membranaceae, fusco ferrugineae. Involucrum
triphyllum; foliola capitulo longiora, basi dilatata, filiformia, praeter
tercia duo vel tria alia inter spicas, breviora, ^{at capitulis longiora} marginibus fuscis,
carina virides. Capitulum pappi parum majus, ovato-subglobosum.
Spicae oblongae: squamae ovatae, acuminatae, fusco-nigrae virides,
stamina tria: antherae lineares, flavae. Stylus profunde trifidus:
stigmata villosa. Semen oblongum. Setae longae, articulatae, mucosa utri-
culata.

Dorso

indius ¹¹ Schoenus capitulum ovatum involucri ^{sub} diphylla breviora, culmo filiformi,
foliis petalaeis.

Schoenus indius, Culmo nudo tereti Venis simo, capitulo parvo nigricante,
involucri brevi undulato subtriphyllo Lamarck. Dict. bot. 1. 740 illustr. 1.

Schoenus capitulum; culmo ^{p. 135} Habitat in India orientali. Ex herbario Lamarckii.
vati, capitulo Culmi plures, pedales, filiformes, teretes. Folia Culmo breviora, petalaeis

ovato, involucri Involucrum diphyllum - triphyllum, subultra petalaeum, capitulo longius;
diphylla Thunb. foliolum unicum ^{interdum} subtri pollicare, interdum ut unguiculare. Capitulum
proder. 16 magnitudine pisi. Spicae quinquae - sex: cal. squamae ovatae, ^{lat. 4} capitulum
aduminatae, fustae, striatae, laninae rufes. Stamina tria.
Stylus trifidus. Semen obovatum, apice mucosum, nigrum, circulo ornato
transversim undulatum. Setae plures.

^{4 uncinata}
filiiformis. 10

Schoenus spicis capitato subternis, involucrio triphylo spicis longioribus
base dilatato scarioso, Culmo foliis setaceis

Schoenus filiiformis; Culmo tereti filiiformi nudo, foliis setaceis, spiculis
subternis fasciculatis, involucrio diphylo ⁱⁿ aequali lamant. illustr. t.
p. 134. monte video Compton.

Habitat in Cap. Sp. In herbario Lamarchii.

Culmi plures, ^{filiiformes} spithamei teretes. ~~folia ulnas~~ Culmo triplo
breviora, canaliculata: vaginosa latae membranacea in folium in
folium acuminatae. Involucrium diphyllum, basi ovatum,
membranaceum, acuminatum, alterum spicis spicis longioribus,
alterum unguiculatae, alterum parum brevius. Spicae tres ^{quae}
tuor. ^{oblongae} squamae ovatae, furcae, striatae, carinae virides, infimae
acuminatae, reliquae mucronatae
differt ab antecedente: Culmo foliis rigidioribus, latioribus: foliis brevioribus,
spicis majoribus.

indicus - Schoenus sulmo nudo tereti tenuisimo, capitulo parvo nigri-
canti, involucri bene sulcato subnigro La Mart. T. Enci;
pag. 135.
Habitat in India orientali

~~parva~~

lateralis P Schoenus spicis capitatis, involucri diphyllo foliolo altero capitulo longior
va, ^{culmi} ~~culmi~~ ^{areolatus} ~~foliis~~ que setas filiformibus

Habitat in Cap. b. spec. Arenosis?

Involucrum

diphyllo, unicum
capitulo brevius
attonum e culmo
continuo longius

Involucrum nullum
nucuphyllum,
brevissimum
proterocapitum
culmi

Culmi tereti Radices filiformes longi, Culmi poriosi, longitudine digiti
minimi, pallide teretes, filiformes, pallide viridei. Folia ex eodem

Vagina ad Culmijusque fere longitudinis et crassitie, plana, rigida.

Spicae tres-quinque, & patio unguiculari in fra apicem Culmi in
capitulo sessile, fusca nigricantes, ovatae, acutae, parvae: squamae
ovatae, obtusae, concavae, vix carinatae

An folia potius culmi steriles?

~~Schoenus
foliiformis teretis
culmo tereti - filiformi - nudo folio setosis, spiculis
subtermitibus, in areis in diphyllo equali. Ca. novem
S. linei longi
Habitat in Cap. b. spec.~~

glomeratus Schoenus

Schoenus glomeratus; culmo trigono folioso, capitulis paniculatis,
glumis ciliatis Thunb. prodr. 17.

Habitat in Cap. b. Spei

Species Dactylois glomeratae. Culmi superne obtuse trigoni. Capitu-
tula semipollicaria, ~~acuta~~ oblonga breviter pedunculata, ovato-
oblonga, geminata.

filiiformis
Lachodes

~~capitatus~~ ~~capitatus~~ ~~capitatus~~
Schoenus ~~filiiformis~~ spicis capitatis subternis, involucri diphyllo, foliolo altero
capitulo longiore, Culmo folisque capillaribus.
Schoenus filiiformis; Culmo tereti filiiformi nudo, foliis 3 etatis;
Spiculis subternis fasciculatis; involucri diphyllo. La Martini

illust. v. 1. p. 135
Schoenus filiiformis; Culmo tereti capillari, capitulo oblongo, involucri ~~diphyllo~~ ^{triphyllo}. Thunb. &
Habitat in Cap. b. spici. Ex herbario La Martini Thouin # prodr. 16

Culmi plures, spithamei, teretes, basi e congerie vaginatum bulbo

si. folia culmo similiaque longitudinis: vaginae fuscae. Involu-

alterum longi crum mono- Diphyllum; foliolum unicum unguiculatum. Spiculae ter- qua-
tudine capituli tuor, oblongae, obtusae, fuscae: Equae oblongae.

marginatus. Culmo capillari, capitulo teretibus, involucri diphyllo, foliolo altero longiore, in
Schoenus marginatus Thunb. prodr. pag. 17.
Habitat in Cap. b. spici.

varius locum obtinet genus ^{prope} Scirpus, si vero placet eos ~~quod~~ tanquam sectio
conjugere cum Scirpis uti ejus sectio distincta, fundamentum divisionis prima-
rium Scirporum culmis polystachjis a fructificatione desuntum, certe praeva-
lebit illud a culmo, panicula nuda vel foliacea pettum quod varietate

Scariosus 6 Schoenus spica cylindrica, ^{acuta} involucri monophyllo spicam aequante
squamis marginis scariosis

Scirpus trigynus; culmo tereti nudo, spica cylindrica squamis lanceolatis basi
lateralis membranaceis Lin. mant. 100

Schoenus densus; culmo tereti nudo folia aequante, capitulo oblongo, glumis
calycinis ^{sub}aequalibus mucronatis spicam involvantibus Bez. cap 10.

Scirpus bulbosus; radice bulbosa; scapis teretibus, canaliculatis, foliis setosis,
spica cylindrica, terminali Roebb. gram 46. t. 16. p. 2.

Habitat in Cap. b. spici König 7.

Taciar Scirpi lacustris, Culmi plurimi, pedales.

Scirpus scariosus; culmo tereti, capitulo oblongo, involucri monophyllo,
glumis marginis scariosis Thunb. prod. 16

Habitat in Cap. b. spici König 4

Taciar Scirpi lacustris. Culmi plurimi, pedales, teretes, basi e radi-
quis vaginarum fusca copiosis fusca bulbosa. ⁶⁰⁰⁰ folia filif. Culmi panem
breuora, canaliculata, marginis laevia, rigida. # Spica pollicaris, utrinque
angustata, fusca: squamae lanceolatae, mucronatae, infima in folium
subulatum, longitudine spicae desinens. Styli trigyni. Semen obler.
gum. setae nullae. latitudine dimidua

vaginae superna
laevae, albae

Unicum vidi membrana squamae involucri longitudine fere spicae
et dimidua epae longitudinis, in alio vero speciminebus brevior et brevior

Scariosus Schoenus

Schoenus

Spadicium
Lupulium 7

Schoenus Spica ovato-oblonga obtusissima, involucri monophyl
lo spicam ^{breiore} subsequente, squamis margine natis

Eriocaulon spadicium; culmo tenuissimo longissimo substriato, foliis
setaceis, capitulo ovato spadiceo laevi Lamerth. Illustr. t. p. 214

Habitat ad ^{in St Domingo} ~~Sierram Leonam~~. Ex herbario Kamatchii

Culmi setacei. Spica terminalis, oblonga, vix unguicularis,
crassitie fere pennae anserinae, oblonga, obtusissima, spadicea,
basi bractea subulata, spica triplo brevior: squamae infimae sub
rotundae, superiores obovatae, basi albi da. Stamina tria. Semina
subrotunda, nigra, nitida, mutica. Setae

Stylum non vidi. Species Eriocauli certe non est, forte quod vultus
ad Schaenoi nunciat.

trigynus? S. culmo tereti nudo, spica capitulo cylindrico involucri
pubulato monophyllo, aequante

~~Serpis trigynus culmo tereti nudo spica cylindrica squa-
mis lanceolatis basi laterali membranaceis Lin Mont
pag. 100.~~

~~Serpis bulbosus radice bulbosa; scapis teretibus canalicu-
latis; foliis setaceis, rigidis; spica cylindrica terminali
Rothb. descr. pag. 46. tab. 16. fig. 2~~

~~Habitat in cap. 6. p. 4~~

~~Culmi plures aequini conicis spicis superne membra-
naceis, bulbosi pedales. Antheri subultra spina striati
folia filiformia rigidiuscula culmorum breviora
vase contracto altero latere canaliculati. Capitulum
terminale pollicare spicam squamis lanceolatis
striatis infima in folia pubulatum longitudine capi-
tuli desinens stigmata tria~~

~~Stenopus S. culmo tereti capitulo oblongo, involucri monophyllo,
glumis margine striatis. Thunb. prod. pag. 6.~~

~~Sch. deustus Bergin
an stenopus Thunbergii ex Lichten~~

passillus 5. Schoenus spicis pubternis, involucri monophyllo spicas aequante, Culmo

trigono Schoenus pusillus; culmo triquetris nudo filiformi; spiculis terminalibus
subfasciculatis sessilibus, foliolo subrecto spicam aequante Swartz
prodr. 20. fl. ind. occid. 1. p. 112. 4a t. 6.

Habitat in graminosis saxosis nemorosis montium Tamae australis

Radicis capilla res, simplicis. Culmi pollicares - bipollicares; ad

Swartz in Donnell Trigoni, capillares. Folia radicalia, altitudine culmi, ejusque

latitudinis; basi carinata, ope latis ciliata. Bractea foliacea sub
spica infima. Spicae tres-quatuor, minutis simae, ternatae,
subfasciculatae, una supra alteram, sessiles, ovatae, acuminatae:
4 quae ovatae, carinatae, muticae. Germen subrotundum.

Stylus basi trigonus, trifidus. Semen subrotundum, obtuse trigonum,
scabrum, oculo armato quasi echinatum Swartz. l. c.

capillaris J. Culmo Inque ~~trunco~~ nudo foliisque capillaribus, spiculis fasciculatis
reflexis involucri, involucri albo diphyllis Sw. prodr. p. 20.
Habitat in Hispaniola.

Hyllinga speciei ex auctoritate ~~Rutandi~~. Spicula 2 florum, floreculi diademi. Stigmata 3.
Summitate terram attingens et radicans

~~nam~~

nigricans 2 Schoenus species fasciculato capitatis, involucri salvula altera capitulo
longiore, culmo tereti; foliisque glabris. foliis vaginis que glabris
9 functus lithospermi semine Monis. bles. 106 Magr. monsp. 145. # 145 cum fig.

Gramen sparteum functus laevis minor, pannicula glomerata nigricante Monis. hist. 3

nigro capitulo
Marrot. pin 67. p. 233. s. d. t. 10. f. 20.

functus affinis capitulo glomerato nigricante Schavitz. gram 349
t. 7. f. 13. 14. 15

Schoenus nigricans; culmo tereti nudo, capitulo ovato, in involucri diphylli
salvula altera subulata longa Lin fl. Suev. 39. Pollinch. pall. 12. 37

Habitat in Europae paludibus aestate exsiccatis, in Cap. 6. Speci Schun
berg 4 plures,

Culmi pedales, inter semipedales, pedales; teretes. folia culmo bre
viora ex apice vagina ruer, semiteretibus; vaginae pollicaris; basi
fusco nigricantia, superne dilutiora. Involuerum diphyllum, alta
inferne

foliorum non inferius a basi ovato attenuatum, capitulo duplo longius, altum
aequum ovata cum acumine, interdum absque. Spicae duae duae

decim plumae angustatae, lanceolatae, acutae, compressiusculae, fusco
nigricantes, nitidae: squamae lanceolatae. Semen trigonum, album.
Setae nullae

Interdum involuerum omnino deest Schoenus nigricans

hybridus Scirpus culmo triquetro aude umbella decomposita, spicis dichotomis sessilibus ^{basis} foliolis
foliis ^{basis} distichis imbricatis ensiformibus obtusis, foliis ~~super~~ ^{marginibus} magis profusa scabris
Habitat in aridis solo duro Regione Noij Folia marginibus scabris

Linea dentato
serrata prope
basin Scirpus
basi

Tacsis omnino Scirpi dichotomi tota glabra glauca, distichis foliis un-
cum basi caulem spicatoses que pollicari vagones, a reliquis omnibus pinnis
intuitu distinguitur foliis ^{basis} distichis imbricatis omnino ut in aloe
disticho, ^{undique} eisdem latitudinis usque ad apicem, ^{glauca} subopacis apice obli-
volvata. a Scirpo dichotomi spiculis foliis, spiculis angustioribus ^{basis}
ribus magis conveniunt ~~et utriusque in terra vix strata~~
umbella terminalis levis pollicari, pedunculis pedicellisque co-
ae glabris altero latere convexo altero canaliulato in ducto
tome divisi ultimi monostachyi spicula sessilibus in dichotomia
spicula lancolata compressis pallide ferruginea disticho
squamo ovato nitida cannata involucrium brevissimum
diphyllum.

bulbosus ² Schoenus spicis glomeratis, glomerulis alternis, bracteis solitariis, culm
foliisque setaceis

Schoenus bulbosus, culmis triquetris nudis, florum glomerulis alternis,
foliis lineari-filiformibus Lin. mant. 178.

Scripus capensis; spicis foliisque setaceis, basi alatis; capitulis glo
meratis, per bracteas setaceas intermixtis Roettb. gram. 53. t. 16. f. 3.

Habited in Cap. b. p. König 7

Radix bulbosa, vestita rudimentis foliorum praeteritorum. Culmi

Anvolvum: Spithameae val. pedibus parum ultra, teretibus, filiformes. Tolia
folium setaceo culmo parum breviora, canaliculata: vagina dilata, membrana
um ad singulumica. # Spicae glomeratae, ^{ovatae,} sessiles: glomerae parvae: glomeruli alterni,
glomerulorumque circiter quatuor, inferior remotus, reliqui approximati & folium
longius

setaceam ad singulum glomerulum siue longius: Pyramae
ovatae, concavae, infima acuta, reliquae obtusae, purpureae
striatae, Antherae aristae cuspidatae. Stylus trifidus.
Setae nullae.

Spadus Schoenus

Habitat

~~Leb. Rech. foliosi~~

~~Culmi obtuse triquetri, glabri. Solca unguem lateri, extrorsum margini
ne striata.~~

habes

invenitur in Tar Sciro sub nomine *Diplasii*

* Culmo nudo
+ spicis terminalibus
Ferrugineus; Schoenus spicis subgeminatis involucri valvula altera longitudine
spicis aequante, Culmo tereti

Schoenus ferrugineus; Culmo tereti nudo, spica duplici, involu-
cri valvula majore spicam aequante Lin fl. Suec. D. 1. n. 37. D.

Bot. 2. Syst. veg. 97.

Habitat in Europae paludosis

Similis Sch. nigricante, diversus: Culmo spicis haecis vel parum ultra
foliis pollicibus vel minoribus, vix longitudine vaginarum, venio-
ribus: spicis duabus: Equana est infima in involucri foliolo alu-
minata spicis parum longiore.

Folii ratione longitudinis vaginae multo breviora in hoc quam in
paucis.

Schoenus

Habitat ad fretum magellanicum herb. Mus.

habes

lat. folius ~~44~~ Schoenus, Pedunculis axillaribus, spicis alternis, spiculis subquaternis
caulis in quetro locis.

Habitat in Porto ricco Ventenat 4

Pulmus altus, crassitie pennae anserinae, erectus, articulatus, acuta
trigonus, angulis serrulato-scabris Folia pedalia, interdum ultra
pollicem lata, ensiformia, utrinque ^{per utrinque per vaginam decurrentia} ~~in~~ marginem serrulato-scabra,
utrinque trinervis, et sulcis ⁱⁿ per utrinque nervis oppositis; nervi
in pagina superiore & calvi: Vaginae internodiorum breviores, acumi
ne folio opposito, ovato terminatae. Pedunculi ~~caulis~~ ^{collati} ~~et~~ ^{solitarii}
bi-tripollicares, compressi, anapites, margine scabri, spicae ~~at~~ ^{compositae}
compositae, approximatae, brevissimae. Bractea oblonga, ^{carinata,} ~~caulis~~ ^{acumina}
sa, ciliata. Spiculae tres-quatuor in ⁱⁿ trigulo pedunculo, confertae
bimae, semianquiculae, teretiusculae, bifariam late imbricatae
valvulae dicitur quatuordecim, ovales, ^{lanceolatae} ~~caulis~~ ^{attenuatae,} ~~caulis~~ ^{unicatae,}
multiplicationem eandem non vidi, ~~et~~ deoque tantum modo per seculum
dum habitu ad Schoenos retuli

Rappon ~~C~~ culmo folioso, umbella supra decomposita speculis umbellato
Esplendens Linn fl. Ind. Spec: plant. p. 66...
Habitat in India orientali

ictus ch. culmo folioso
-spec: Ind.

angustifol. 42 Schoenus paniculis elongatis, spicis congestis Teretibus, sub-
spatha
latis, culmo tereti.

Gramen fluviatile geniculatum, panicula foliacea virginiana Monis. hist. 3
P. 103. sect. p. t. 3. ff. 7.

Gramen junceum stans, caule articulo, virginianum, Cyperi panicu-
lis inter folia prope summitatem prodeuntibus. Pluk. alm. 1797 301.
f. 1.

Cyperus racemis simplicibus lateralibus solitariis distinctis, spicis alternis
patentibus Gron. veg. 131. Ed.

Schoenus teretis ^{cyperus} spathaceus; Culmo tereti, spathis alternis mucronatis panicu-
las obvolvuntibus, spicis alternis patentibus Lin. spec. pl. 63.

Cyperus spathaceus, culmo vaginis foliorum vestito, pedunculis pin-
natis lateralibus Lin. Syst. veg. 100

Habitat in Virginia

Culmi altitudine Sacchari, erecti, striati vaginis foliorum tota tereti. Folia

frequentia, bipollicares et ultra, sursum sensim minora, linearia,
laevia: Vaginae semipollicares, striatae, ore fusco marginatae. ^{striatae} Pedunculi

superne e vaginis foliorum, eaque parum longiores, solitariae, filiformes,

compressae, ore latis margine denticulati. Spiculae binae vel sex, sessi-
les ^{aeternae} semipollicares, parum distantes, teretiusculi, tubulati: flosculi sex;

var. *teretis*
flexuos.

valvulis linear-lanceolatis, striatis, margine ferrugineo membranaceo, infima sterilis.
^{Stigmata}
Stamina tria, alba. Germen cinctum setis sex-decem ferrugineis, ope latis retrorsum
denticulatis. Stylus ~~bifidus~~ ~~Stigmata~~ duo Stylus squama longior: Stigmata duo, ad
laxem villosa. Semen lineare, compressiustulum

non proprie generis cum betae ad basin an Schoenus ad Boerhaave

flexuosus 49. ^{paniculis erectis,} Schoenus ^{subgladineae} (specie longioris paniculatis oblongo, squamis ovato-lanceolato-
truncato-natis, culmo tereti
Schoenus flexuosus; Culmo tereti folioso, specie paniculatis, glumis
mucronatis Thunb. prodr. 16

Habitat in Cap. b. sp. ^{articulatus}
Culmi pedalis vel ultra, teretes, ^{articulatus} folia remota, bi-tripollicaria,
linearia, attenuata, planiuscula, rigida, apice nigra; vaginae nigrae,
nitentes. Pedunculi ex vaginae superioribus, gemini, inferne remotis

pollicares

res, vagina longiores, inaequales, compressae, parciales brevissimi; pedicelli
tri-stachyi. Nivae oblongae subgladineae, grano tritici: ^{minores} uni-

florae: ~~aequales lanceolatae~~, in aristam sensim minorem attenuatae ^{camina-}
tae, infima longitudine spicae, striata, reliquae laeves. Stamina tria.
Stylus trifidus: Stigmata pubescentia. Germen obovatum, obtusum.
Setae nullae

Habitus. Primae sectionis. Culmi ^{erecti,} tenodes, folia ^{radicalia} ~~radicalia~~, basi cul-
mum vaginantia. Secundae sectionis. Culmi ^{erecti,} nodosi, foliosi, ^{rigida} ~~rigida~~ ap. nodos
vaginae integrae, plus minusve fuscae. Pedunculi axillares om-
nis divisi, terminales magis, altero latere convexi, altero plani
vel canaliculati

Crispiores

Dactyloides 42
glomeratus Schoenus capitulis paniculatis, spicis squamis lanceolatis
acutis, squamis acutis in pinnis ciliatis, Culmo superne trigono

Schoenus glomeratus; Culmo trigono folioso, capitulis paniculatis,
glomeris ciliatis Thunb. prodr. 17.

Habitat in Cap. b. spici

Facies *Dactylis glomeratae*. Culmi ^{inferne vacillat} superne obtuse trigoni. Vaginae
superne, alternae, ^{longitudine capituli,} sensim breviores in foliis ^{in ciliatum} desinentes, in primo
sesquipollicare. Pedunculi gemini et singula vagina, breves.

compressi. Capitula semipollicaria, orato-oblonga. Spicae ~~lance-~~

Con fertis simae

latae #: squamae lanceolatae, infima attenuatae, infima longitudine
spicae ciliata, reliquae subciliatae, in di-
trina. Stylus trifidus. Semen oblongum, trigonum. Setae nonnullae

P. 225.

Plerumque Culmo vacillat: foliis, spicis paniculatis, glomeris mucronatis: Thunb.
prodr. pag. 16.
Habitat in Cap. b. spici

Conyza P. culmo subtriangulo nudo, capitulis terminalibus ^{glomeratis} aggregatis involucri
pentaphyllo ~~caespitibus~~ reflexis

Habitat in India orientali Honig

Culmus erectus, pedalis ultra longus fuscus compressus pilis subtri
quetis aphyllis striatis glaber. Folia radicalia culmo dimidio

breviora basi cuneata ^{glomerata} caninata apice convoluta glabra, margine

lobis Caputula terminalia ^{glomerata} aggregata 5-7. oblonga sessilibus ^{perispermis} nigro
panum majore ^{glomerata} spiculis copiosissime parvis squamis albedo cuneis for
mas mucronata subincava apice sacciformis post capum florum punctulatum

Involucrum pentaphyllum reflexum folioli rudiusculis inaequalibus basi
cuneatis extus involucri brevissimum reliquis capitula

longioribus ^{involucri} bipollacatis vel illegia breviora

an *Conyza* Thunb

Secundus 20. Schoenus Spica Secunda, spiculis ovato-bulbosis approximatis sub
involucralis, Culmo tereti filiformi, foliis setaceis

Schoenus bulbosus. Lamart. illustr. t. p. 136. β fide herbarii apud

Schoenus bulbosus; Culmo tereti filiformi, spicis racemosis secundis,
involucris solitariis Thunb. prodr. 16

Habitat in Cap. b. Spai Lamart.

Culmi plures, pedales vel minores, bulbosi. Sedis Culmo breviora: vaginae
nae membranaceae, purpurascens. Involucrum foliolum ad basi
spicae unius vel alterius. Spicae tres-viginti, geminae conicis pa-
rum majores, nitidae: squamae ovatae, apice carinatae, concavae,
basi flavescentes, superiore fuscae, mucrone flavo terminatae, mar-
gine alba membranaceae. Strobili plures. Stylus tripartitus.
Semen obrotatum, altero latere parum carinatum, basi acuminata
tum, oculo armato transversim undulatum. Setae nullae.

Distinctissimus a Scirpo capensi Rottböllii vel Schoeno bulboso

Linnaei, quoniam Schoenus bulbosus Thunbergii vero huc pertinere
videtur, quamvis secundum differentiam spicae racemosae sunt

dicuntur.

Cynulenus Schoenus

Habitat ad Sierram Leonam herb. Thauri

Culmi filiformes, teretes, striati, pedales. Solia radicalia, filiformia. Capitulum
terminalis, oblongum, unguiculare

Enicaulon spadicum La Martk
~~habes~~

Cymosus ~~48~~ Schoenus Culmo triquetro folioso, umbella ^{terminali} composita, spiculis ovatis striatis
Wilden. Spec. pl. 1. p. 265. +

Habitat in America boreali?

Culmus pedalis, erectus, foliosus. Folia linearia, cyperina, glabra, ca-
rinata, numerosa in culmo, superiora umbella longiora. Umbella
terminalis, uncialis, ramis umbellatis inaequalibus. Spiculae ova-
tae, acuminatae, magnitudine seminis senapis, ovatae, tres semper
glomeratae, sessiles. Squamae ovatae, acuminatae, nervosae, brun-
neae. Involucrum univ. pale polyphyllum, foliolum unicum um-
bella longius, reliqua multo minor: parziale nullum Wild. l. c.
Ex autoritate Wildenowii huc locari, quamvis inflorescentia aliena
a Schoeno, ^{rum} an Scirpus polyphyllus?

Schoenus incanus Forsk. descr. 12 + minime huius generis et nequidem ordinis, forte
errore editoris, qui minus recte nomen Forsk. nomen ex ejus Schedulis tradidit.

Schoenus Fabri Herb. est varietas monstruosa millis villori

An eadem cum Scirpo polyphyllis? Forsk. descr. 12. p. 1. involucrum ovatum

Rolle d. culmo Forsk. descr. 12. p. 1. involucrum ovatum, univ. pale polyphyllum, foliolum unicum umbella longius, reliqua multo minor: parziale nullum Wild. l. c.

gracilis *Rhynchospora* ^{spilis} ~~longicaulis~~ ^{spilis} ~~spiculata~~, & ^{culmo} ~~culmo~~ ^{filiformi} ~~foliis~~ ^{linearibus} ~~cul-~~
~~mo filiformi laticaulibus~~
Schoenus gracilis; Culmo triquetro folioso longissimo filiformi; spicis latera-
 libus pedunculatis Swartz. prodr. 19. Pl. ind. occid. 1. p. 109.

Habitat in sylvis montium altissimarum Jamaicarum

^{angustifolia}
~~Diversa~~ ^{ob} ~~nigra~~; Culmo foliisque ~~trifido~~ ^{tenuibus}, pedunculis remotis & imis
 anticedente culmo nec sensu summam partem approximatis: spicis ~~trifidis~~ ^{subulatis}; ~~Stylis trifidis~~
 multo tenerioribus ^{hac bifido tenuioribus}
 foliis angustioribus ^{laxus, filiformis}
 & remotioribus: pedunculis tri- ^{per pedalis}, foliis longissimis, marginibus serratis Pedunculi solitarii
 dum culmis remanentibus ^{stylis trifidis} secundum Cel. Swartz & in Specimine ab ipso com mune
 tribu ^{trigyna est} ^{secundum} Cel. Swartz & in Specimine ab ipso com mune
 Stigmata tantum duo observari

~~Hypoclyptum~~ ~~corimbo terminali composito, calmo vaginato~~
~~nemorum~~ f. ~~Machorina~~ ~~spica subglobosa, stylis bipartito~~
~~calmo triquetra~~

~~Beera~~ ~~Kaida~~ ~~Rheed. Mal. 12. p. 109. t. 58.~~

nemorum 47. ~~Schoenus~~ ~~nemorum~~ ~~culmo triquetra folioso, corimbo~~
~~terminali composito folioso. Symb. bot. 3. p. 8.~~
~~Beera-Kaida Rheed. Mal. 12. p. 109. t. 58.~~
~~Habitat in India orientali.~~

Culmus erectus, pedalis et ultra, ^{triqueter} glaber, vaginatus. Folia
culmo duplo longiora, pollicem lata, glabra, cavinata
trinervia, margine et carina retrorsum scabra. Co-
rimbus terminalis, compositus. ^{subternis} ~~Et~~ spicula ~~triseria~~
in singulis pedicello Folia ad basin pedunculorum partialium
et pedicellorum; infima corimbo longiora; in sequentia sen

sim breviora. Octires ferruginea, bifida, acule, sci-
cule subterno in singulo pedicello, undique imbricata; ^{multiflorae} lenel-
lo lineari-oblongo, obluse; fructifero globoso vix mag-
nitudine piperis nigri. Syvama infima steriles, flosculi
unicos sub singulis reliquis, oblongo-subrotundo, subca-
rinata, glabra. Calix oblongus, syvama brevior, ^{bivalvis} val-
vula linearis, concaeva, tenuis, acuminata, opae lentis
willosula. Filamenta duo syvama longiora, Anthere erect-
ae. ♀ Germen sublenticulari, ^{sepe ad basin nullis} stylis bipartitis, syvama lon-
gior. Semen globoso-compressiusculum, base styli breviter et
obtuse acuminatum, rugosum, nigrum.

a Schoenic differt calyce bivalvi intra syvama; a Machorina setarum de-
fectu et habitu; a Hypolyptis paleis persistentibus et habitu diversissi-
mo; forte rectius novum genus proprii generis.

ket
Ded
but

1 ex africa
2 India?
Culm. epet.