

Schotia

speciosa L.

Simpliifolia Schottia foliis simplicibus

Habitat in Guinea Thonning &

Tridax ramosus, six oxyalis? folia petiolata, alterna, bipollicaria, ova-  
to oblonga, apice rotundata, integerrima, trinervia, tenuisima  
venosa, Nova que glabra, supra nitida. Petiolus brevis. Stipula cadu-  
ca. Racemi laterales, erecti, longe pedunculati. Pedunculus com-  
muni, superne angulatus, inferne tomentosus. Pedicelli breves, uniflori,  
cervi. Flores conferti, viridi nigricantes. Calyx campanulatus, semi-  
pollicaris, <sup>caniscentis</sup> intus purpurascens, limbus squaridus: laciniis rotundatis.  
Corolla subaequalis. Petala 5, oblongo-ovata, calyce duplo longiora, tubo  
calycis imposita, brevia unguiculata. Filamenta 10. inferne pubescenti-  
tubo calycis inserta, corolla parum longiora, declinata. Germen pedicella-  
tum, oblongum; pedicellus longitudine corollae. Stylus subulatus. Stigma  
acutum. Siliqua Legumen Thonning.

Zanthoxylodes Gayana

Habitat ad Senegal herb. la. Manthui &  
Rami glabri, crassius, <sup>teretes glabri cortice fusco purpurascete</sup> pennis cygneis, aculeis magnis, frequentibus recurvis  
parvis adpressis. <sup>edore sunt om</sup> folia pennata cum impari, tripeza: <sup>reticulata</sup> foliola subopposita,  
lesqui pollicaria, oblonga, obtusissima, cum acumine brevi, glabra, subina-  
eae, supra nitida, arena, subtus punctata obscure venosa. Petioli acu-  
leis recurvis. Racemi <sup>superne</sup>, approximati, decompositi, inermes.  
Flores aggregati, sespites

arbor ad littora maris a Senis quasolus <sup>altitudo sua fructus gerit</sup> humilior, remota in interiori  
regionis magnitudine fere quercus, junior aculeatissima, antiqua  
caudice inermi aculei <sup>rami pennata</sup> pyramidati crassi. Folia 4-6 parva foliola  
1-2 pollicaria interiora parva <sup>in planta tenella</sup> <sup>glomerata</sup> <sup>aculeata</sup> Petioli supra caralculatus, flores <sup>racemoso</sup> paniculati  
sessilibus. Petala obovata. Stylus curvatus. Stigma <sup>inversatum</sup> Capsula  
magnitudine peperis. Sem. unicum anellatum  
Thoungui differit foliis pennatis cum parifoliis <sup>super</sup> <sup>subvenoso</sup>

*Speciosa* Schottia Jacq. collect. 1. p. 93.

Guajacum album Lin. Spec. p. 547. t. V. 396\*

Theodora speciosa Medic. monogr. p. 16. t. 1.

Habitat in Cap. bonospei.

Rami rigidi. Folia alterna, pennata, octojuga. Petiolus communis marginatus, articulat, canaliculatus. Foliola ovato-oblonga, opposita, integerrima, mucronata, glabra, rigidula, perennia, basi interneae brevissime abbreviata. Stipula ramis appressa, subulata, minima. Flores racemosi.