

Schrader

Scandens Schradera folio ternatis ovatis dentatis Willdenow in Gmel. Journ.
Der Naturw. 1. pag. 3. Tab. 2.

Habitat in Guinea 5

~~pusilla~~ ~~Cochin~~ - ~~foliis lanceolatis integerrimis subtus ciliatis, nervis punctatis~~
~~pulverulentis~~ ~~capulis dispersis~~ ~~lour. fl. Coch. pag. 501.~~
~~Habitata~~ ~~Cochinchina~~
~~Arbor medicinis. sacris terminalis.~~

non vid.

pendula, scandentem tamen etiam vidi, sex vel octopedalis, apicem versus tantummodo ramosus. 27

Flores terminales, conglomerati, septem ad viginti quatuor in capitulo, pentandri vel hexandri, interdum in eadem planta, interdum in distincta.

Bacca unilocularis, polysperma, intra calycem unicolatum, inflatum, persistentem

Semina plurima, minuta

Crescit in altis montibus montis infula Montserrat.

Planta junior et inflorescens gaudet foliis amplis lanceolato-oblongis
Atterens modo parasitica radicans. Semina indurata in carne. Fructus
in rubraceis baccatis semper bilocularis Richard

Schradera

36

Character Essentiali Calyx margo superius, integerrimus. Corolla quinque vel sexfida. Stigmata duo. Bacca unilocularis, polysperma

Schradera capitata

Hanc, uti quam plurimas plantas in solo Montserratensi ante plurimos annos primus detexit Ryan inque Europam misit.

Rami tetragoni, glabri, cortice cinereo, apice fusci, articulati: articuli bipollicari
bus.

Folia involucri Folia petiolata opposita, patentia, bin. vel quadripollicaria, elliptica, integerrima, floribus in involucri apice obtusa, basi parum acutiora, subcoriacea, utrinque glaberrima, a venis obscure nervosa.

sw. prodr. Petioles pollicares, fuscescentes, Stipulae nulle.

pag 62. Pedunculus terminalis, solitarius, compressus; sursum parum latior, bipollicaris. Bractea ^{ea} ^{dua} utraque ad basin pedunculi membranacea, pollicaris, oblonga, obtusa pedunculi basin late vaginantes. Flores plures, receptaculo caroso innatis, base ^{base} involucri cum recept. involucri. Involucrum cum receptaculo connatum, margine liberum, lobatum.

Calyx margo superius, integerrimus, basin corollae ante cingens.

Corolla ^{submembrata crassa} ~~crassa~~, monopetala. Tubus unguiculari, sursum versus sensim latior: intus inferne glaber, superne hirsutus. Limbus quinque-vel sexpartitus: Laciniae carnosae, lanceolatae, parum reflexae, supra versus faucem plano, anticae triangularares et lateribus compressis, carinatae, carina denticulus carnosus triangularis ad basin carinae; subtus plano.

Stamina. Filamenta vix ultra. Antherae quinque vel sex, lineares, inter lacinias limbi, erecti, ultra tubum limbo ^{triplo} duplo breviores.

Perigonium. Germen inferum, basi tetragonum, lateribus parum impressis, angulis acutis. Stylus unicus, tubo corollae brevior. Stigmata duo, crassa, oblonga.

Pericarpium. ~~ultra~~ ^{in parte} lani, poly sperma. Bacca unilocularis, polysperma

Quod plane recedit, tam a Characteribus generis Fuchsia Plumieri et Fussiai, uti et a Skinnera Forsteri ad hanc filio ad Fuchsiam calata, quam a Linnaeo in Generibus plantarum Holmii 1764. et data descriptione patet. Calyx enim ^{in fundis bali formis} non quadrifidus ^{cuique} et Corolla tetrapetala ^{anthera didyma} et Bacca quadriocularis et habet sive Plum. et Fussiai et Forsteri, nec stigma simplex corolla octofida Laciniae alternis inferioribus et stigma simplex ut tradit Linnaeus. Genus itaque esse distinctum non dubito, quod nomine amici optimi et botanici celeberrimi Henr. Ad. Schraderi auctoris Spicilegii flora germanica condecorare volui. Prope locanthum collocanda Observata Ryani in loco natali, uti plantam descripsit, tam illustratio, cui addeere libet Planta parasitica radicum arborum, caule sublygoso, plenimque parum