

Thumacheria

monogyna. Cal. simplex. Cor. Tripetala Petalo Vno unico majore
cri po. Stam Anthera ^{sesquialter} quinqueseñata in latere interiori filamenti

Saganea
flexuosa Schumacheria

Habitat in desertis Sicyliæ König 5

Caules ramosi. Rami teretes, glabri, articulati: articulis bipollicari-
bus basi parum crassioribus, ab articulo ad articulum flexuosi.

Folia facie l. castaneis, alterna, breviter petiolata, 4-5 pollicaria
elliptica, parum attenuata, basi apiceque acuta, remote bina-
ta; pennaturis mucronatis, utrinque glabra, supra oblique remote
nervosa; axillaria, subtus venosa. Petiolus vix unguiculans, trique-
ter, supra & marginibus oblique acutis canaliculatus. Stipulae nullae.

Pedunculi axillares et terminalis; sesqui pollicares, pariter gemi-
nati vel terni in canis, alter interdum bifidus; basi foliolis caducis
subsistenti. Flores spicati, secundi, duplici serie. Bractea duo
ad basin calycis. Calyx pentaphyllus, sericeus: foliola tria extero-
ra, parum longiora, duo interiora exterioribus longiora latiora.
Corolla tripetala: petalum unicum reliquis parum majus, crispum.
Stamina numerosa, in corpusculo ^{pub} uncinato connata usque fere ad
apicem connata, ad alterum latus germinis, longitudine calycis, extus

convexum, intus cavum. Anthera numerosa, a medio filamentorum ad apicem
in seriebus quinque subsessiles, erectae, lineares ^{intus. versus} exte-
riori ~~exteriori~~ ^{interiori} parum stygati
inferiores. Germen superum, unicum, subrotundum, hirsutum.
Styli 3, glabri, capillares, simplices, superne incurvi. Stigma airu-
tum. Embellus mihi ignotus.

Abysinica Salma

Sperlingia

Pyroflua