

Schwenckfelda

Tant villosa (an in omnibus?) fc. Penn.

Sabicea sw

Schwenckfeldia

Sabicea cuneata Aub fl. Guian.
Habitat in guiana Son Ambo no 62
Rami terete, incano tormentosi. Solaia petiolata, opposta ellipti-
ca lanceolata integerrima nervosa avenia 3-4 polliciana punc-
ta utrinque tormentosa cana adhuc supra glabra acuta
perpetuum ponit decurrentia. Petiolis angustis latis lacinias tri-
pula et unguis inter soleas linearis oblonga, obtusa adpreso in
cana integra pedicolo dimidio brevior repudiis flore axillaris spissis
foliari. Calyx basi imbricatus bracteis ovatis ex his lacinias. Corolla
tubulosa in canis spades. Corolla hypoleuca ^{hypocnemis} caput tubulariformis
pollicans ex hoc hospite lacinia lanceolata intus glabra

Descripta in Sw. flor. am.

umbellata Schwenckfeldia

Schwenckfeldia umbellata; foliis ovatis acutis, pedunculis astillantibus
umbellatae. Bl. Peru. 2. pag. 55. Tab. 200 figura

Habita in Andum nemoribus.

Glabra. Caulis suffundens, volubilis. Rami teretei. Venae hispidae
doleo oppositae petiolatae, ovatae, acuta integriformis, venae liniatae, patentiae,
planae. Petiolae pollicares. Hypoleuca interfoliacea, opposita, ovata, petiolis
concreta, acuta, integriformis, persistenter striata, magno. Pedunculi astillantes,
petiolis paulo longiori, patentia, solitariae. Flores umbellati; involucrum rotundatum
breviter pedicellatae. Umbella composta, trifida. Involucrum duplificatum;
lea; foliolis ovatis lanceolatis, acutis, integriformis, persistenter striatis.
Pedicellis linearibus subulata ad basin pedicellorum. Corolla alba. Calyx
hirsuta, albitans. Bl. Peru.

Folia ovato oblongo attenuata.
exterioris tripli florae pedicellatae

Pedunculi partiales vernis, tenui petiolis

Rosaceæ

Habitat Limo. Dombey herb. Thomini

Caulis herbaceus, prostratus. Sola vir pollutaria, cuneata, acuta in petiolum
attenuata, integriflora, uti tota planta glabra, avenia, crenata. Flores astil-
loides, solitarii, sesiles. Stamens 5. Style 1.

et Tamilea Potulacea sim

3 Triflorum ~~Troftcum~~
pedunculis oppositis trifloris, foliis petiolatis.
Habuit in Madagascar? an de Horvito habui
Pauli erecta; sequipedalis, simplicia, venis semine pubescens.
Solia opposita, petiolata, patentissima bis. Tripollionana, lanceolata,
duple angustiora quam in T. perfoliata, apice attenuata, ante
gerrima, supra simpliciter venosa glabra, pubescentia palli-
Venella subtus tomento cora venosa. Petoli pubescentes stipulis brevioribus.
la incana. Stipule basi lata pubulata, adsperso vix anguiculari.
Pedunculi astillares, foliarii, erici, pubescentes, triflori, apice: bracteis
binis pubulatis calycis parum brevioribus. Flores sexples: bracteae tubu-
latae ad basin florum calyces fere egantes.
Calycis laciniis pubulato, fere semi unguiculare vel parum ultra.
Fructus oblongus, glaber, longior laciniis calycis parum longior, calyx
per siffente coronatus.

Swartzfeldii species.

aspera S. foliis ovatis acutis a sparsis subtus villosi caule volubili Aubl. fl
Gu. 1. pag. 194 Tab 26.

Habitat in Guiana. Herb. Guj

Pauli Heres, pilosus, scabriusculus. Solea opaca, in pollu*anti*
brevis petiolata elliptico-ovata, scabriuscula, anum remota
acuminata, in ^{marginata} ~~marginata~~, utraque pelis raro adspersa, pubes ^{brotii} pelli
dura. T. locis axillaris, vestigia laticinae longae
vulnus. Stipulae subrotundatae

notodit

aliam ab aubl. diversam Richard forte de Dan

cineraria Lab. foliis ellipticis acutis tomentosis pubescentibus, floribus subfusiformibus
Sw. prodor. pag. 46.

Sabicea cinerea Aub. fl. Qu. 192. tab. 75.

Habitatione Godrici oceidentalis

non vnde

herba sub. foliis ovato lanceolatis acuminatis hispatis, floribus pedunculatis

See Prodri pag 46.

Habitat in Jamaica

sgn vdi