

Scilla

Sella officinis amoena

Folia linearia basi canaliculata, sursum planius tripartita

lana unguem lata Scapi plus est foliis, paucis altioribus

Striati angulati subantheris ^{apice pluribus} 1-2-3. floribus Bracteae minutae

^{ovoides subrotundae} Petala basi ^{connatis} campanulata, superiore patula alterna
angustiora apice crassiora cum mucore intus
versa, omnia coerulea basi pallida

Mnemon

be florum Forst. Charit. Gen. 1. ~~Ann. Sept. p. 107. l. V. p. 55 Forst. Com. Gott. 1789. p. 21. tab. 1.~~

Habitat ad foetum Magellanicum ^{herbacei ramorum} in Nova Zelandia in rupibus 4

Cespites ~~faris cooperens~~. Caules bipollicares compositi caputosi. folia opposita
sessilia basi connata linearia subtus ~~angusta~~ ^{caninata} supra plana glaberrima
confertissima, acrosp. Nervi terminales gemini sessiles in apice ramulo
nun exiguus vides. Squamula 3 minuta diaphana ad basin floris

numéro Scilla

des font-habes

1 *maritima* Scilla nudiflora bracteis refractis ^{geniculatis} *Lin. Sp. pl. p. 442. & S. V. p. 328.*

Scilla hispanica Clus. h. 1. p. 171.

Scilla vulgaris, radice rubra Bauh. Pin. 73.

13. Scilla radice alba Bauh. Pin. 73. Seb. mus. 1. t. 44. fig. 4. 5.

Habitat in Hispania, Sicilia, Sardinea, Barbano, Regno Lettona annosa. 2

Folia lanceolata fructu. Scapus ante folia, longissimus multiflorus.

Flores albi sparsi: Bracteo lineari lanceolata refracta genu in medio
superum flexa, subtus callosata *Lin. l. c.*

- 2 hyacinthoides Scilla racemo cylindrico multifloro, petalis germine sesquilon-
gionibus, pedunculis coloratis, ^{bracteis} foliis lanceolatis Hort. kewl. p. 445
& Scilla hyacinthoides racemo longissimo, floribus subverticillatis peduncu-
lis patentibus Lin. Suppl. p. 201. f. v. p. 329. ~~Faig. coll. p. 61~~
- 3 Crinitozalum enoporum orientale Tournef. loc.
- 1 Bulbus eriophorus Clus. hist. 1. p. 172.
- 2 Bulbus eriophorus orientalis Bauh. Pin. p. 47.

Habitat

Scapus tripedalis a medio ad apicem floens, comuliferus. Pedicelli
conleui, pedicellis tribus: quatuor proximis subverticillatis
~~Stipula~~ ^{bracteis} minimis a pedicello parum remotis. Corolla minima,
rotunda comuliferas. Germina alba. Lin.

racemo longissimo multifloro, pedunculis multifloro, pedunculis coloratis
bracteis minutis foliis lanceolatis

Gaiguani
hyacinthoides Scilla

Scilla hyacinthoides Gaigu. Coll. 1. p. 61.

Habitat

Bulbus squamosus. Folia plura pedales, nitida, acuta flaccidula
basi semipollicem lata. Scapus teret longitudine ^{floris} foliorum. Racemus
si odor Hyac. orientalis, unctus 20 nutantibus pedicelli at vicem
eui. Bractea grana subulata virentes aut coeruleae. Petala plana
elliptica pallide violacea margine pallidiora. Stamina petalis breviora
in Gaigu.

Diversa ab hyacinth. Lin

antherioides. S. racemo elongato, floribus longitudine pedicellorum

Scilla antherioides racemo longo spicati, floribus
brevi pedunculosis equantibus, basi bracteatis Poir.

D. pag. 170

Habitat in maurentania Schousboe

affinis hyacinthoide

Scapus sesquipedalis, teres glaber. Racemus semipedalis. Petala
lanceolata herb. Desfont

bulbiferus - fl. ^{complanatis} racemosis pendulis, foliis ensiformibus siapo-teroni
bus aequi e bulbiferis

Habitat in India orientali

Scapus palmatis folia anguste utriusque ~~Heruato~~ . floris parvis
copiosis

3 Liliohyacinthus Scilla racemo oblongo paucifloro, bracteis longitudine pedicellorum
foliis lanceolatis

Hyacinthus stellans, foliis et radice lili Bauh. Pin. 46. Clus. hist. 1. p. 189.

Scilla Liliohyacinthus Lin. L. V. p. 328.

Habitat in Bithynia, Aquitania, Hispania, Pyrenis &

Folia lato lanceolata inferne angustata scapo parum brevior.
scapus semipedalis. Racemus sesquipollicaris pauciflorus
filiis, pedicelli alterni 9-13. unguiculari (hyacinthoidei pollicari)
caes. patentes (filiis) patentes. Bractea subulata longitudine
fiori. Corolla major equam hyacinthi.

4 peruviana. *Sella corymbosa* radice *caulis* *fastigiatis*, foliis *lanicollatis* *ciliatis*
Eriophorum peruvianum Clus. hist. 1. p. 173.

Hyacinthus stellatus peruvianus Clus. hist. 1. p. 182.

Hyacinthus indicus bulbosus stellatus Baud. Pin. 47.

Sella peruviana corymbosa confecto conico Lin. Sp. pl. pag 442 * N

13-

Pl. Nag 328

Habitat in Lusitania, Hispania inque Barbaria agris &

Bulbus tunicatus magnitudine Puni majoris. Folia radicalia, plura
pollicem lata utraque attenuata, palmata. Capus foliis paucis
brevior a basi fere florens. Pedunculi ^{filiformes nonnulli conferti} ~~filiformes~~ ^{nonnulli conferti} ~~nonnulli~~ ^{conferti} in *Corymbum*
hemisphaericum. Bracteae aridae subulatae longitudine fere pediculi
cellorum. In montana. Culta major folia absque ciliis, inflorescentia
tamen eadem.

4-5. *Tetraphylla* *Scilla* acaulis, floribus fasciculatis, foliis quaternis ovato-lanceo-
latis den. Suppl. pag 260 *

Habitat in Africa

Folia radicalia, patentia, cruciata, cordato-lanceolata, sessilia, nervo
sa, longa. Capus nullus. Flores foliis dimidio breviores: pedunculis
scilicet misetaceis, unifloris copiosissimis. Petala lanceolata mar-
gine membranacea. Filamento petalis breviorum. Antheris oblongis
germen subrotundum, sesquiangulare obtusum. L. L. C.

mea ex herb. J. B. H. an eadem cum ~~herb.~~

~~na~~

5 Italia Scilla racemosa conico oblongo Lin. Mant. 364. * S. V. p. 320

Hyacinthus bellianus italicus Bess. Cyff. verm. 2. tab. 6. fig. 1.

Hyacinthus bellianus cinereus Colons. Clus. hist. 1. p. 104.

Hyacinthus bellianus praetatus cinereus Bauh. Pin. 46.

Habitat

Solia eniformis. Scapo unguem lato, scapo altiora. Scapus pyramideus.

Racemus oblongus, pedicellis erectis, pedicellis longitudine florum. Bractea
subulata albis & longitudine pedicellorum. Flores patens petalis linearibus
acutis, latibus reflexis, albis aut caeruleis

6 *amona*. *Bella floribus lateralibus alternis subnitentibus, scapo angulato lin. l. v.*
roy. 329. *Taigu-flor. Austr. vol. 3. t. 218.*

Hyacinthus bellianus Byzantinus Bess. *Eyfl. serm. t. 13. fig. 3.*

Hyacinthus bellianus conuleus minor amonus Bauh. *Rn. 46.*

Habitat forte Byzantii, unde venit in Europam 1590. 7

Solia in *figura* *scapo* *altorum* *pollicem* *sepe* *lata*, *obtus.* *Scapus* *spithameus*
ra *medio* *floriferis*, *flores* *dispartes*. *Pedicelli* *pollicares*, *laxi*. *Bracteo-*
lyquamula *minuta*. *Corolla* *plana* *conulea*, *Petalum* *lanceolata* *sepe* *unguicula*
na *basi* *lineolis* *duobus* *albidis*. *Germe* *globosum* *magnitudine* *pepi*, *flavum*
stylus *longitudine* *germenis*.

7 Campanulata Scilla bulbo solido, racemo multifloro oblongo subconico, corollis
campanulatis erectis, bracteis bipartitis pedunculo longioribus, foliis lanceo-
latis Hort. Kew. t. p. 444

Hyacinthus hispanicus stellato flore Plur. Cur post. 20.

Hyacinthus stellaris, saturate concolor Bauh. pin. 46.

Scilla Hispanica Mill. Diet.

Habitat in Hispania

Variet. H. non scripti: bracteis pedicello longioribus.

8 ^{gilla} bifolia floribus racemosis, foliis lanceolatis - linearibus subternis in scapo elevatis Hort. kew. 1. p. 445

Hyacinthus conicus mai. minor Tuck. hist. 857.

Hyacinthus stellans bifolius germanicus Bauh. Pin. 45.

~~*Hyacinthus*~~
Scilla bifolia floribus erectiusculis paucioribus Lin. l. V. p. 329.

~~Gaequ. f.~~ Austr. vol. 2. tab. 117.

13 *Hyacinthus stellatus*, albo flore Clus. hist. 1. p. 104.

Habitat in Gallia, Germania

Folia ~~linearis lanceolata~~ obtusiuscula longitudine scapi. Scapus
palmaris et ultra. Racemo conico pedicelli supremi sensim breviores

9 Verua Scilla bulbo tunicato, racemo paucifloro bracteato, corollis campanulatis,
foliis linearibus canaliculatis radicalibus pluribus Hort. kew. t. p. 498

Ornithogalum hispanicum minus Clus. hist. 100. Ger. em. 166.

Ornithogalum umbellatum flopiulis ex albo subconcoloribus Bauh. Pin. 70.

Scilla verua corymbo hemisphaerico paucifloro bracteato, foliis subulatis
linearibus canaliculatis Hudf. flor. Angl. t. p. 142 +

Habitat in Insula Mona, Cambria, Scotia & Toris, Hispania

Radix bulbosa, tunicata, fusca, magnitudine nucis avellanae. Scapi 2
Cylindrici teres, teres, glaber. Folia longitudine fere scapi. Flores
a tribus ad 8. culta ad pedicellum pallide concoloribus. Corymbo hemisphaerico,
bracteis persistentibus membranaceis, concavis, acuto longitudine
fere pedunculati Hudson. l. c.

10 *Leptanica scilla* racemo oblongo conico, petalis lineatis Lin. L. V. p. 329
Hyacinthus stellaris conuleus; staminibus a viridi luteis Bauh. Pin. 46.
Rudb. Elyf. 2. p. 34. fig. 4

Habitat in Leptanica

Similis *Scilla amona*. Scaquid teres. Racemus oblongus, subconicus. Floribus distanti-
bus, petiolo fere brevioribus. Petala elliptica, obtusiuscula, sulcato-lineata
nascantia. Stamina petalis paulo breviora: Antheris flavis hinc

non videt

10 *Gaponica*. *Sicla florum umbello terminali fastigiato* Thuab. fl. Jap. 137*

Habitat in Gaponia

Stipulis erectis, simplicibus, glabris, palmatis. Bracteis in scapo et sub flori-
bus alternis, membranaceis lanceolatis, exsertis adpressis, unguem
lanceis interstitiis brevioribus. Corolla patens albo purpurea. Petala
in unguem attenuata, oblonga obtusa unguem alba. Filamenta
infera basi petalorum inserta. Germen ovatum. Stylus filiformis.
Stigma caputatum lobatum.

Descript. fl. foliorum deservatur

non vid.

11 autumnalis Stella foliis filiformibus linearibus, floribus corymbose, pedunculis nudis
ascendentibus Longitudine floris Cen. I. V. pag. 329.

Hyacinthus autumnalis minor Clus. p. p. 185. Ger. em: 110.

Hyacinthus stellaris autumnalis minor. Bauh. Pin 471.

Habitat in partibus siccis Angliæ, Hispaniæ, Galliæ, Sennæ &

Solia digitalis Longitudine sepi. Flores in cæta racemose pollicari
- Bractea nulla. Corolla magnitudine pif, longitudine pedicelli

unifolia Scilla folio teretiusculo, late re subpresso C. S. V. p. 329

Bulbus monophyllus flore albo Bauh. hist. 2. p. 622.

Ornithogalum plicatum unifolium, flore niveo odorato Griseb. Lupt.

Habitat in Capitania dicitur Gussone herb. Vahl

Bulbus magnitudine nucis Conii. Tolum unicum lineas basi vaginas
scapo longior. 8 lora tres septem. Bractea subulata, longitudo corollae. Petala
unguiculata, lanceolata. Scapo palmari. Racis fere stultis. in praesentia
Gussonei flori unius. 11. distant. Pedicella capillaris. Bractea brevis
petala lanceolata coerulea, canna virescente folium lineare, 11.6 po
altior an diversa

obtusifolia L. folus ovato-oblongis obtusis, racemo longispediculis, floribus pedunculo brevioribus Torr. et.
Habitat in barbara

michi ignota

orientalis. Sp. floribus racemosis erectis. foliis ellipticis cuneiformibus
Thunb. in Act. Soc. Lin.
Habitat in Japonia

non vid.

numidica. L. foliis linearibus planis, floribus racemosis, pedunculis
florum longioribus Pers. et.
Habitat in Africa boreali

michi ignota

Lingulata foliis linearibus - lingulatis, floribus spicatis; bracteis
pedunculis longioribus Poir.
Habitat in Barbana

non vid.