

Serpis
6 culmo tereti polystricho

~~hottus~~ hululeto ~~hululeto~~

84 Obscuri vel Dubii generis
Lateralis ~~Scirpus~~ Scirpus panicis ovatis lateralibus sessilibus pedunculatisque

Torph. Descr. 15. +

Habitat in Arabia

In herbario Torphälaci non aderat

Culmus triqueter? pedalis et saepe ^{cubitalis} ~~pedalis~~ basi foliosus. Pedun-
culi laterales, fasciculati, filiformes, inaequales, pollicia-
res. ~~Spicae~~ ^{perigonae} ~~perigonae~~, margine membranaceae

In herbario Torphälaci non aderat

quama ovata

Congifolius Siquis? Culmo Inquetro: foliis involucriisque Congifolii
nervosi, corymbis sessili compoſito Act. ſci. h. n. P. p. 1. pag 106
Habitat in America merid.

a H. americana non differt
non vidi

capitulans ~~Scirpus~~ Culmo tereti nudo, panicula coarctata laterali,
 fructu capitulans Lour. fl. Cochinch. 44

Tundus indicus porosus Pluc. cur. post. 64.

Habitat in Cochinchinae et Chinae paludosis.

Culmus quadripedalis, sesquipedalis. Solia brevissima, ante con-
 soluta. Stigmata tria. Capsula triloba, polysperma
 Lour. l. c.

An tunc species?

capitulans Scirpus Culmo tereti nudo, panicula coarctata laterali,
 fructu capitulans Lour. fl. Cochinch. 44.

indica Hippuris fraps nudo, radice tuberosa L. fl. Cochinch. pag. 16.

~~Cyperus dulcis Rumph. amb. Lib. 10. C. 3. 8. 3. fig. 1.~~

~~Habitat in aquis Cochinchina.~~

~~Tubera pilosa nigra Edulia. folia subulata. longa, erecta, congesta.~~

~~Scapus 4 pedalis simplex. Vero synactis fistulosus; membranis interstici-
tuis. Spica terminali, coarctata longa reticulata, squamosa
crassitie fere ulmi. Stigmata 2. oblonga. Semen unicum sagittata
spica totum~~

Scipi spici
non vid.

an lupus yaceni

86
elleyhanianus, ~~Scirpus~~ ^{Scirpus} culmo tereti arido, fructu globosi quaterni Molina hist.

~~non~~ Chil. pag 129 +

Habitat Chili

non vidi

87
Capensis

~~84~~

Scirpus

~~ulmo~~ Virento folioso, spicis capitatis, involucro diphyllo

to Bur in prodr. 3. +

Habitat in Cap. b. Spei

Cappulani Scropus culmo tereti nudo, panicula coarctata laterali, fructu Cappulani

Lour. fl. Coch. pag. 44.

Amicus indicus procerus Clus. Cur. post. pag. 64.

Habitat in China et Cochinchina in paludosis.

Culmus 4 pedalis cespitosus. Folia brevia ante convoluta. Rhizoma subulnari

trijuncta 3 Cappula 3 loba 3 valvi polyperma

ad Feni^o

an super generis
non erit.

88

~~90~~ Scirpus Willem. herb. maur. 9 +

Habitat in insula Mauritiæ

Culmus basi foliosus. Folia culmo dimidio breviora. Involucrum poly-
phyllum, umbella longius. Umbella composita. Spicæ ovatae Willem.

C. C.

umbellati Scirpus culms nudo umbella terminali simpliciter involutio
bivalvi transverso La Mart. Tab. Enc. pag. 141.

Habitat

quantum a specimen herb. La Martini conjice licet ex specie differat
a femineo Lin. Umbella radii 6. Speculo oblongo in fungulo radiis.
Culmi subcompressi

89-4+ Scirpus Willemi herb. maur. g. +

Habitat in insula Mauritii

Radix fibrosa. Culmi inferne foliosi. Folia graminæ, culmo dimidio breviora.

4 ~~no~~ olucinum polyphyllum, ~~corymbo~~ corymbo longius. Spicæ ovatae, ætiguæ
in corymbo conglomerato. Radicelli flexuosi Willem. l. c.

ternis

capullani s. culmo nudo capullani, specis pedunculatis intermediis s. s. p. l. i.
An. s. v. mant. 321.

~~groner juniceum per pupillum, capulla cuius folia ~~theopneum~~
Pluk. alm. 179. t. 156. fig. 5.~~

groner pupillum, junici capitulis minimis, ad basin foliolis
brevibus acutis Burm. zeyl. 100. t. 47. fig. 2.

Habitat in Virginia, ~~Theopneis~~, Zeylona.

Folia capullana vix longitudine digiti. Culmi foliis vix con-
gruis vel crispioribus foliis setaceum sub umbellis specis longius
specis terminalibus 3 ovatis. Squama ferruginea canna vix, ob-
tusa. Cu

non vidi

Conyza foliis ⁹⁰ 98. Scirpus? culmo triquetro: foliis involucrique longioribus nervo
4to, corymbo sessili composito Act. Soc. h. n. par. 1. p. 106 +
Habitat Cayenna

Sumatrensis Kuhl. umbella terminali: spicae sepalibus pedunculatisque cylindricis
Squamosis, involucri universalis polyphyllis, partiali nullo Retz. Obs. 4. p. 13.

Habitat in Sumatra

Scap. cyperthiucæ pedunculatæ

an mea Retz. Culmus pedalis triquetris folia altitudine culmi
in involucri ^{in involucri} Anvolucri ophylla longissima
marginis scaberrima. Anvolucri ophylla longissima
inæquali spica pollicari fasciculi speculo subulato

91-92
reticulatus Scribn. Culmo glaberrimo, nudo apertis, umbella composita
foliacea, involucri folii superficiem reticulati La Mark. T. Eng.
pag. 142 illustr. 1. p. 142 +
Habitat in Carolina

non vid.

~~juncus 25~~ ~~aphyllus,~~ ~~culmo~~ ~~terminali~~ ~~filiformi,~~ ~~spica~~ ~~involucro~~ ~~aequante~~ +

92-94 juncus, aphyllus; culmo terminali filiformi nudo, spica ovata terminali
involucro aequante Forst: prodr. p. 6. +

Habitat

Specimen Schoeni credit Wilsonow

mutatus Scirpus Culmo triquetro nudo fructu cylindrico Terminali Lin. Am.
S. p. 391. * Spec. pl. p. 71. * L. V. p. 48

Habitat in Jamaica

Similemus geniculato, sed Culmus triquetus, molliusculus nec arti-
culatus Lin.

^{fructu}
an mutatus Roth? huius retinetur ^{an} patina diversa gaudet sed hoc forte sola
differentia nisi squama figurata differt michi haud pa-
ra cognita

anomalus ⁹³
~~anomalus~~

Scirpus ^{anomalus, culmo trigonuo folioso, spiculis}
ovatis, floribus corollatis in fimo dianosis su-
perioribus dianosis ^{culmo folioso}
Retz. obs. 5. p. 15 +

Habitat in India orientali

Culmus subpedalis, trigonus. Folia ad basin multa, longitudine
culmi # plana, trinervia, nuda inermia; in culmo tria hinc
similia, sed breviora. Involucrum folium sub infimo pedunculo
panicula quadruplo longior, hinc simile sub secundo pedun-
culo, sed panicula vix longior, reliqua folia sensim breviora
omnia ^{ciliata} & caltra. Panicula sesqui pollicaris; pedunculis bre-
vibus, semiteretibus, cilia tri-quinquefloris, ciliata & abris
pedicalli brevis simi, squamis duabus vel tribus ve lanceo-
latis. Spicæ imbricatæ squamis obtusis. Corolla dipetala;
glumæ æquales, compressæ, carina ciliatæ. Stylus sim-
plex: 8 Stigmata duo Retz. l. c.

pollicem dimi-
cium lata

~~Vix huius generis esse videtur Proprii generis esse videtur~~

anomalus Scirpus spicis ovatis, corymbis floribus corollatis
in fimo dianosis superioribus dianosis, ~~pedunculis~~
culmoque foliosis

bivalvis *Saxopus*

Habitat herb. La Martini

Culmus pendulus. Umbella radii 7. cum capitulo in medio, 1-2-3 floro. Squa
ma ovata, mucronata apice ferruginea. Involucrum diphyllum radii
stipulo brevibus, rectum

94
eriophorus 90. Scirpus spicis ovatis obtusis setis exsertis, involuero pentaphyllo umbella
supradecomposita longiore, culmus folioso.

Cyperus miliaceus ex provincia mariana, panicula villosa aurea
Pluker. mant. 62. t. 419. f. 3.

Cyperus miliaceus maritandus, spicis seminiferis magis confertis
rubentibus lanuginosis Raii suppl. 620

Scirpus paniculatus, foliis floralibus paniculam superantibus
Gron. virg. 12.

Eriophorum Cyperium; culmis teretibus foliosis
paniculis supradecompositis proligera,
spiculis subternis Lx. spec. Pl. 77.

Scirpus eriophorus; altissimus; culmus foliosus, triquetrus: panicula
amplissima, decomposita; spiculis copiosissimis, rufidulis, ovatis
omnibus distincta pedicellatis; setulis peristyllinis exsertis Michx. fl.
bor. amar. 1. p. 33.

Habitat a Virginia ad Georgiam &

Culmus obtuse trigonus, crassitie per nae anserinae. Folia longissima,
canadota, margine carinaque scabra. Involucrum ^{puberulo} subtriphyllo
umbella longius, basi ferrugineum: portio aequanae nonnullae.
lanicolatae, ferrugineae. Ochreae pollicares, ferrugineae. Umbella
supradecomposita, spithamea: radii capillares, ultimi gemini mono

Stachys cum spica sessili in centro. Spicae fructiferae semine canabris panum ma-
 jores: squamae oblongae, carinatae, mucronatae, ferrugineae. Semina trigona, albida.
 setae squamis longiores, gilvae
 Varii emendat ab *Eniophoris* et *Scirpis* propinquis, setae praeterea, ut
 mon et *Mitchaux* numero determinato ad sunt et solummodo diversae a *Scirponum*
 quod longiores et laxiores sunt.

Prolystachys - *E. culmi* *vestibula*, folia plana, nervis pedunculata *non* *in*
grana *prolyste* *demonstratur* *parvula* *grana* *brach.* *pan.* *24.*
~~*Abditos* *in* *Europa* *ab* *ignota* *varietate* *et*~~
~~*mutuere* *umbella* *in* *era* *folia* *plana* *extrema* *setae*~~
~~*plana* *vall.* *tab.* *16.* *fig.* *2.*~~

Habitus ^{primae sectionis} (Culmi capitato). Folia nulla ~~excepto s. fluitante~~ et capillari nisi cul-
mi feriles, excepto s. fluitante et capillari. Spica terminalis. Involuerum
nullum. -

Secunda sectionis ^{prima subdivisionis:} (Culmi basi foliosi, apice elongati. Spicae plures, la-
terales, feriles. Involuerum subnullum. - Secunda subdivisionis: Cul-
mi foliosi, in paucis tantum apicilli. Folia vaginantia in plurimis e-
nodes, basi foliosi, in paucis omnino apicilli; in ceteris articulati, folio-
s. foliis vaginantibus; vaginis integris. Spicae plures, termina-
les, aggregatae capitatae, vel in paucioribus distinctae. Involuerum fo-
liosum, in paucissimis nullum. -

Culmi s. speciosi coloribus foliorum subnullis

