

Schleranthus

1. annuus S. calycibus fructibus patentibus.

2. perennis S. calycibus fructibus clausis.

3. polycarpus S. calycibus fructibus patentissimis spenis, caule subvillosis

perennis *Scleranthus calycibus fructibusque clausis* Lin S. V. p. 415. Fl. Dan. tab.
563.

Polygonum minus polycarpon

Vnava lincianum, flore majore, perenne Rai angl. 3. p. 160. t. 5. fig. 1.

Achemilla gramineifolia, majori flore Vaell. parif. 4. t. 1. fig. 5.

Habitat in Europa campis apricis arenosis &
Similis procedenti differt foliis angustioribus petalis calycibus pallide
viridis laciniis lanceolatis obtusis apice concavis erectis margine
albidiis

_____ obtusis

Volva basi ^{mediante} *membrana hyalina connata*

1 annuus *Lycianthus calycibus fructus patulis* Lin. h. v. pag 415. Flor. Dan. 504.
Polygonum minus altum Tabern. h. 1217
Anthyllus valentina Clus
Polygonum gramineo-folios majus erectum Babch. lin 201

Habitat in Europa arvis arenosis. Rami apice dichotomi
Caules digitales diffus. ramif. folia opposita subulata y labra articuli
multo breviora cinnata. Flores sessiles terminales y breves dichotomi
solitarii. Lacina calycis subulata patentes in fructu maturo

———— lacinae acutis

3 polycarpus *Scleranthus* Calycibus fructus patentissimis spinosis caule subvillosis
in Am. acad. 4. p. 213, 214. p. 415
Sermiculata montana nova Col. Lethr. 1. p. 295. 8. 294

Polygonum montanum sermiculato foliis Bauh. Pin. 201

Polycarpus Dalech. hist. 444

Habitat in Moxpelia et in Italia ☉

Caules diffusi, ramosi, subvillosi. Folia subulata patentissima remota
est in dicto omni in p. 100

Flores spiles axillares secundum totam longitudinem caulis parvi

Calyces sulcati laciniis sulcatis patentissimis rigidis absque margine.

membranaceo

differt a reliquis floribus non corymbosis ad apicem. Calycibus margine
membranaceis