

Scoparia

1. Dalei f. foliis terous, floribus pedunculatis  
2. pincum f. foliis quaternis, floribus sessilibus  
    bena  
3. arborea f. foliis oppositi integerrimis subtus tomentosis, corymbo supra decomposito  
    Inchoatomo

Dulcis Scoparia <sup>Scoparia</sup> foliis ternis floribus pedunculatis Lin. V. pag 37  
Scoparia ternata foliis lanceolatis apice serratis, ramis ternatis  
neibano villosa Torrh. descr. pag 21. n. 7.

30

~~39~~  
41 40



Duple's  
~~Orb.~~

*Scoparia* foliis ternis, floribus pedunculatis L. S. V. pag. 157. Jacqu. Amer. 17.

*Phytanoides americanum*, flore albo tetrapetalo Pluk. alm. 296. tab. 215. fig. 1.

*Veronica americana* erecta frutescens et ramosa Heron. parad. 241. t. 241.

*Veronica frutescens* erecta dulcis, hexangulari caule Sloan Jamk. 1. p. 195. tab. 108. fig. 2.

*Lamoloides* Boeck. luegd. 2. p. 265\*.

*Capriana* foliis ternis, corollis quadripartitis Hort. Cliff. 320.

ps. Tupacava Raf. Bras. 246.

Habitat in Jamaica, Curacao, Arabia O

*Scoparia ternata*, foliis lanceolatis, apice serratis; ramis ternatis; nectario villosis Dorrh

Desf. pag. 31.

Caulis erectus, ramosissimus, pedalis. Rami tetragoni, erecti glabri. Folia petiolata, ternata, <sup>subpelticantia</sup> lanceolata, <sup>in nervis acuta</sup> a medio extrossum versus serrata, glabra. Pedunculi axillares uniflori, longitudo in petioli. Cavities corollae basi pilosi (Nectario Dorrh).

Aborea Scoparia foliis oppositis integerrimis subtus tomentosis, corymbo supra deo composito  
trichotomo  
Scoparia aborea foliis alternis integerrimis, corymbo supra deo composito trichotomo lino.


Suppl. pag. 125

Habitat in C. b. spetz

Racis Oleo. Rami tetrayoni, alternatim superne compressi, sub foliis latiusculis  
Folia opposita (non alternis ut hab. l. v.) brevia petiolata, lanceolata, integerrima.  
In f. 3 pollicaria supra glabra, subtus tomentosa. Corymbus valde compressus  
trichotomus, dein dichotomus, foliolum lineari opposita ad ramificationem  
Calyx inanis



*Dulcis Seopana*



Scoparia

Habitat ad Rio Janeiro herb. Guss.

Caulis et rami villosi. Sola ternata, petiolata, semipollicina, oblonga, simpliciter  
venosa, plerumque obtusa, inaequaliter serrata, subtus pallidiora, nervis pilosa. Pedun-  
culi axillares, solitarii, foliis brevioribus. Calycis foliola lanceolata  
forte modo varietas s. Dulci



procumbens Scoparia foliis quaternis, floribus sessilibus Gaerq. Amer. 12. L.V. p. 157. Gaerq.  
pl. Am. f. p. 21. \*

Habitat in America calidiora et arenis maritimis C

Habitus s. dulcis via semipedalis, caule dichotomo, procumbente. Folia <sup>quaterna</sup> parva subtulata, acuminata, rigidula, duo opposita parum breviora. Flores sessiles, parvi, albi in dichotomia ramusculorum et axillis. Tubus corollae superne fimbriatus, basi laciniis basi nudi Gaerq. l. c.