

# Scutellaria

1. orientalis *S.* foliis cordato-oblongis serratis incisè puberulis tomentosis, fructibus <sup>imbricatis</sup> rotundatis.
2. Lupulina *S.* foliis cordato-oblongis serratis incisè glabris, fructibus imbricatis rotundatis tetragonis, bracteis longioribus in tubo.
3. alpina *S.* foliis cordato-oblongis serratis incisè glabris, fructibus imbricatis rotundatis tetragonis, bracteis tubo corollae brevioribus.
4. latiflora *S.* foliis ovatis attenuatis serratis, racemis lateralibus.
5. galeniculata *S.* foliis cordato-lanceolatis crenatis, floribus axillaribus.
6. hastifolia *S.* foliis integerrimis lanceolatis inferioribus hastatis superioribus sagittatis.
7. minor *S.* foliis cordato-ovatis vel integerrimis subhastatisque, floribus axillaribus.
8. hyssopifolia *S.* foliis lanceolatis sessilibus integerrimis scabris.
9. havanaensis *S.* foliis cordato-ovatis crenatis, floribus solitariis axillaribus, corollae labio utroque bifido.

10. purpurea s. foliis petiolatis cordato-ovatis dentatis, racemis nudis terminalibus, corollis labio utroque bifido.
11. indica s. foliis subovatis crenatis petiolatis, racemis nudis pedunculatis
12. integrifolia s. foliis oblongis subpetiolatis crenatis, bracteis oblongis integerrimis
13. peregrina s. foliis cordatis obtuse serratis, spicis elongatis villosis <sup>secundis</sup> subrisosis
14. alba s. foliis cordatis obtuse serratis rugosis opacis, spicis secundis bracteisque ovatis villosis, vilis eglandulosis
15. altissima s. foliis cordato-oblongis attenuatis serratis, spicis secundis pedunculo calycibusque villosis subrisosis
16. cretica s. villosa, foliis cordatis obtusis obtuseque serratis, spicis imbricatis bracteis fetacis.

betonicifolia Scutellaria foliis cordatis obtusi crenatis, racemis nudiusculis,  
pedicellis subverticillatis

Habitat in Bonaria

Caulis erectus, pedalis, simplex, tenuis sine pubescens.

Folia petiolata, <sup>pollicaria et ultra</sup> profunde crenato-serrata, venosa glabra, venosa  
subtus ad costam punctata

Pedunculus terminalis, elongatus, superne floriferus, inter flores  
allosus. Bractea ovata, acuta, parva. Pedicelli utrinque 3.  
intermedius primum florens.

Calyx pubescens, oblique truncatus, integer.

Corolla calyce duplo longior

bifidum L. foliis cordatis, verticilli <sup>Corollam</sup> bifloris <sup>solitarius oppositi</sup> galea

bifida laciniis divariatis

Lamium parvum, flore albo, cum labio superiore bifido Till

hort. P. f.

Lamium bifidum: foliis cordatis, acuminatis, corollae labio superiore bifido, laciniis divariatis glaber

Caules semipedales decumbentes basi ramosi folia duo vel tria parva inferne superiore ~~caeruleo~~ approximata dein nulla nisi sub floribus inequaliter profunde forata attenuata

ter leviter villosa. Verticilli <sup>oppositi</sup> approximati 6. 6 flori  
Calycis villosi laciniis subulatis. Corolla magnitudine lamii purpurei faucibus inflata extus villosa

Scutellaria

Habitat in Carolina herb. Desfont

Caules plures, simpliciter, erecti, pedales, villosi. <sup>villato subtanescenti</sup> Folia subsessilia, inferiora <sup>stipitata</sup> oblonga, remote serrata, utrinque acuta, superiora lanceolata, integerrima. Flores superne, axillares, oppositi, solitarii. Pedunculi uniflori. Corolla villosa, semipollucari

*pulosa* Scitellana

Habitat in America boreali herb. Rich.

*Pulosa*. Caulis herbarius, erectus, non pedalis, simplex. Folia petiolata, non per  
pollicaria, ovata, basi parum acuminata, obtusa, nervosa-venosa, obtuse grosse  
serrata, basi versus et apice integerrima. Flores in racemo ter madi  
non secundus. Folia floralia integerrima, flore breviora

parvula Scutellaria

Habitat in Carolina Richard

Planta palmari vel ultra, pubescens, subramosa: Rami simpliciter. Folia sessilia unguiculata vel minor, ovata, obtusa, integerrima, subtus nervosa. Pedunculi axillares, solitarii, uniflori, folio duplo vel triplo breviores.

*Scutellona folus cordati obtuse serratis villosi, bracteis racemorum rhombis ovatis*

Habitat ad Mississipi

Rauli herbaceus, villosus? Sola petiolata, pollicaria et ultra, venosae obtusae, supra  
glabrae. Racemi terminales solitarii vel terni. Bractea acuta, longitudine  
calycis, sepalis, parva, concavata. Flores villosi



Sintellana

*Casida orientalis* praeterea folio flore luteo Tournef. Cor.

Habitat in oriente herb. Mus.

Planta palmari, pubescens, basi ramosa. Folia petiolata, oblonga, unguiculata, innata. Spica terminalis, femipollinaris. Corolla extra villosa. Folio floralia primum reliquorum modo angustiora.

• *Teucrii folia Scutellaria*

*Scutellaria Sineapsi Teucrii crassifolius profertis foliis floribus purpureis Plukn.*  
Amalth. 170

Habitat in China Inca valle

Caulis fruticosus, erectus. Rami villosi. Folia petiolata, unguiculata, ovata, ut  
supra, venata, utrinque villosa, subtus venosa canescentia. Racemi terminales,  
pollicares. Flores oppositi, solitarii. Calyces villosi. Bractea pedicello brevior, oblan-  
go obtusa, parva.

Sicillano folus hastatis <sup>2</sup>supremis floralibus lineari lanceolatis

Habitat in aegropi monte vides Commeson herb. Jusf.

Caules herbaceus, ramosus, glaber. Folia petiolata, pollicaria, caulina subovata, hastata, acuta, integerrima, venis lanceolata hastata, floralia suprema lineari lanceolata glabra, subtrinervia, venis Racemi axillares et terminales. Pedicelli oppositi, foliari, uniflori, folio florali breviores. Calyx glaber. Flores magnitudine Sicil. lateriflorae purpurascens, ore et albida  
varietas caulibus foliis que minoribus

*Herpeta Scutellana* <sup>subtus incana</sup> foliis ovatis crenatis, floralibus oblongis integerrimis, calycibus

*Herpetosmia*

Habitat herb. Lus. 2

Caules ff suffruticosi, ramosi, diffusi, peloso incani. Folia petiolata, unguiculata, obtusa, utrinque seriatim 3-4, nervosa, villosa. Racemi terminalis, pedunculati, 5que pollicares. Bractea oblonga, basi in petiolum acuminata, mucronata, semiunguiculares. Pedicelli oppositi, remoti, solitarii <sup>bracteati</sup> folioflori breviores. Corolla longitudo bractearum, villosa.

orientalis L. foliis incisi subtus tomentosis, pinnis rotundato-angoni Lin L.

✓  
Cassida orientalis, folio Chamædrys; flore luteo Tournef. corol. 11. itin 3.  
p. 306. t. 306. Commel. rar. 30. t. 30 Mart. Cent. 10. t. 10.

Scutellaria foliis pennatifidis Hort. Cliff. 3164

β. Scutellaria orientalis micana, foliis laciniatis, flore luteo Tournef.  
corol. 11.

Habitat in Armenia et Mauritania 4

Caules ramosi obscure tetragon, rami <sup>truncati</sup> villosi-canescentes. Folia opposita  
petiolata, cordata-oblonga serrata equaliter incisae serraturis obtusi  
unguiculata, supra secundum venas lacinata subtus incana. Spica  
pollicaris et ultra. bractea ovata calycis longioris. Flores oppositi  
breve pedicellati. Corolla pollicaris lutea ciliis pubescenti

Cupulena L. foliis cordatis int. is serratis acutis glabris, pinnis imbricatis  
rotundato-tetragonis Hort. Ups. 1734 Gmel. Sib. 3. p. 229. T. 40  
Cassida alpina sibirica, magno flore albido Tournef. G. R. 4. 182.  
Habitat in Sibiria, Tartaria &

Dico

Caulis tetragoni <sup>subtus albipalli</sup> infera subullosa parum cinerescens. Folium petiolata  
cord. obtuse serrata unguiculata. bractea ovata parum  
acuminata longitudine tubi corollae. Flores flavi. Diversa  
ab orientali per tantum foliis subtus non tomentosis.  
varietatem vidi floribus tubo flavescente galea purpureo  
violacea

alpina. S. foliis cordatis inciso serratis <sup>crenatis</sup> acutis glabris, spicis imbricatis rotun-  
dato-tetragonis hinc. Spec. pl. pag. 334 & all. fl. Ped. em. n. 142. Tab. 26 f. 3

Teucrium alpinum inodorum, magno flore Baud. prod. 116. pin. 247.

Habitat in alpebus Helvetiæ, vallis augustæ

Paucis Tetragonis inferne vix villosis semipedales ramosi. Folia superiora  
brevis sine petiolata utraque glabra vix pollicana obtusa.  
Spica demum elongata bracteis ovatis acutiuscula ternaria  
villosi uti pedunculis Corolla conice pubescentes tubo bracteis  
longior. Similis P. lupulina

Cateniflora L. <sup>olus</sup> floribus corubus, ranna scabris, racemis lateralibus Lin Spici  
reg. 1367

Scutellaria paludosa repens virginiana major, flore minore Monf. h. 13.

p. 416.

Habitat in Canada, Virginia &

Caulis ramosi. S. glaber folia petiolata glabra ovato-oblon-  
ga attenuata serrata subtus pallidiora. Racemi axilla-  
res oppositi folio duplo longiores. bractea oblonga flore longiora  
flores parvi corulei. pedicelli utraque feta ut in galenicis

— foliis ovatis attenuatis glabris —



galeniculata L. foliis cordato-lanceolatis crenatis, floribus axillaribus  
P.V. Fl. Dan. t. 637.

*Lysimachia galeniculata* Dalech. hist. 1060

*Lysimachia coenoclea* & *galeniculata* f. *gratiola coenoclea* Bauh. pin. 246

Habitat in Europa Littoribus et paludosis

Caulis ramosi tetragoni, tenuissime villosi basi radicanter folia in  
fere suppetiolata superiora sessilia ultima integerrima. omnia  
scaberrima

*hastifolia* L. foliis integerrimis: inferioribus hastatis: superioribus sagittatis  
Linn. fl. suec. 539. p. 5. V

Habitat ad littora Suecici rarus &  
an varietas *S. galeniculata* ?

Similis *S. galenicula* et folia integerrima, petalo parum longiore, utriusque  
que lobis basi auriculis utroque floris adnatis caulibus in piceis  
calycis utriusque lobis pubescentibus. Caulis simplicis primus pedalis  
palmaris. Spica longitudine caulis secunda lassa, patens  
interdum rami duo ad terram

minor f. foliis cordato-ovatis subintegerrimis, floribus axillaribus. Lin. S. V.  
All. fl. Ped. n. 1444

*Casida palustris minima*, flore purpurascente Raj. angl. 3. p. 244.

Habitat in Angliæ paludibus 4

Caulis glaber, tetragonus, ramulis rami simplicissimi. folia petiolata  
semiunguicularia canaliculata, interdum hastata, in aliis specimine  
ovata obtusa basi integra supra ad centem pilis raris. Flores  
oppositi pedunculati ex axillis ad apicem ramulorum  
flores triplo minore quam in hastifolia cui satis parvis

*Casida palustris minima* flore purpurascente Lind. bot. Alp. 216.

tab. 9

*Lysiphefolia* L. foliis lanceolatis. N. Mant. 414.

*Caspia* manana *Lysiphefolia* Petw. in Act. angl.

Habitat in Virginia

Caulis erectus. folia sessilia integerrima scabra. Corolla latissima  
superius canna pilosa ten

sessilibus

integerrimis scabris

Caulis villosus. folia petiolata, sesqui pollicaria, lanceolata, basi  
vix attenuata, integerrima, villosa, acuta. Pediculi opposi-  
te oppositi. pedicelli racemosi.

~~amblyopoda~~

Ravennensis. foliis cordato ovatis crenatis, floribus solitariis axillaribus, corollae  
labio utroque bifido Jacq. obs. 2. t. 30. t. v. p. 5474

Habitat in Italia occidentali

Planta procumbens, herbacea, lanella. Folia glabrescens, petiolata, vix  
semipollicaria. Eloci pollicares corollae. Corolla galea trifida

non vidi

Scutellaria

purpurea Scutellaria foliis petiolatis cordato ovatis dentatis, racemis  
nudo terminalibus, corollis labio utroque bifido Flw. prod p. 89  
Habitat in Cantoi Marktfeld.

Caules herbacei, prostrati, spithamei, simpliciter, obscure tetragonii,  
glabri.

Folia petiolata, pollicaria, utrinque glabra, subtus pallidiora, suba-  
renia, remote obtuse dentata.

Racemus terminalis, flexuosus, sesqui pollicaris.

Pedunculis communis et lobis pubescenti. et longe distantes; alteri

Calyx <sup>fructu</sup> obliqua trinecarius, ante erimus.  
fructu minuta in pediculis, nulla in pedunculo communi.

Corolla pubescent, calyci duplo longior.

indica L. foliis subovatis crenatis pilosis petiolatis, racemis nudis pilis

Lin. Spei. pl. pag. 8364

Scutellaria sinica, betonicae folio, floribus albis Plukh. amalth. 190. t.  
441. fig. 1.

~~Scutellaria amara Rumph. amb. 5. p. 459. t. 170. fig. 1. 7.~~

Habitat in China

Planta minor foliis suborbiculata, subovata, obsolete serrata.  
Racemus terminali. Bractea lineares brevissimi. Calycis brevis  
sini absque tubo oris. Corolla angusta longiuscula

Delectur totum syn: Rumph. cum huius vest. pertinet

ovata Si. folis ovatis, floribus axillaribus H. & A. bot. Kew. V. 17

nili exot.



integrifolia L. foliis sessilibus ovatis: inferioribus obsolete serratis; superioribus  
integerrimis Lin. L. V

Sicut allena coerulea virginiana, lamii aut potius tenuis folio, minor

Plukn. alm. 330. f. 313. fig. 4.

Habitat in Virginia, Canada. Vedit Pursh

Caulis pubescens spithameis erectus folia oblonga crenata  
saepius pallidiora basi attenuata, pubescentia. racemus ter  
mi nalis brevis. bractes integerrime opposita calycis longioris  
Calyx pubescens

---

foliis oblongis subsessilibus crenatis, flori bracteis  
oblongis integerrimis

pergyna L. foliis subcordatis serratis, spicis elongatis secundis Lin. S. V. p. 547  
Spei: pl. ray 0364

Camium pergrinum f. Scutellaria Bauh. pin. 231.

Cassida Colum. Eiphr. 1. p. 107. V. 109.

Habitat in nemoribus Florentis, Liburni

Caulis erectus ramifus pedalis purpureus obtuse tetragonus, non  
vellosus. Folia petiolata obtuse serrata pallidiora, spicis  
terminales spithamoi flores distantes bracteis oblongis, acutis  
opposito. Pedicellis ex ala singula bractea brevis calyx pilosus  
ubi pedunculus pilis apice glandulosis

Scutellaria Columno villosa caule erecto bracteato, foliis cordati lobatis  
necnon internodiis longioribus All. fl. pedem n. 145. Tab. 04. fig. 2.  
varietatem salubri credit All. potius ad pergynam amandanda  
pilos glandulosos

cum racemis pilis glandulosis villosis <sup>ramis</sup> et caulis non uncinatis

albida L. foliis subcordatis serratis rugosis opacis, fructu secundo bracteis ovatis  
Linn. Mant. 240 IV. p. 548

Scutellaria Teucriifolia: flore albo Bauh. hist. 3. p. 291.

Caspica flore et albo palliditate Col. Lephr. 1. p. 196. var.

Habitat in oriente 4

Similis S. peregrina at caules magis canescentes, folia utroque petio parvis  
minoribus bracteis majoribus calycibus petalorum foliorum serratis  
majoribus, flori albi majoris, confertiores

petio glandulosis

altissima L. foliis cordato-oblongis acuminatis serratis: speciebus subnudis  
Lin. S. V.

Scutellana orientalis altissima, utrius folio Tournef. Corol. 11.

Habitat in Oriente.

Caulis erectus sesquipedalis ramifus. Tetragonus angulis obtusis  
leviter pubescentibus. Folia petiolata profunde obtuse serrata;  
serraturis mucronatis, glabra. Tri-lobelliana superiora minora  
Pedunculis terminalibus uti bracteis et calycibus pedicellis  
glandulosis. Bracteis ovatis integerrimis. Flores oppositi secundis  
Folia cordata, acuta. Bracteis oblongis, integerrimis. Flores distincte  
herb. mus

---

speciebus secundis

*Cretica* L. villosa, foliis cordatis obtusis obtuseque serratis, spicis imbricatis.  
bracteis setaceis Lin. Spec. pag. 236\*

*Cassida cretica* fruticosa, folio cetero albo Tournef. Corol. II.

Habitat in Creta

Natura Nepeta, tota hispida. Calycis Sutellaria. Corolla *Tenebris* mi-  
nuta extrusis: lobum superioris minimum emarginatum an  
*Tenebris* species Lin.

*Synonym* Tournef. ~~non~~ huc pertinet bracteis enim in specimen  
Tournef. ~~non~~

non vidi

Column no 1.

Scut. quadrati  
virens } Bank herb  
fulva

Comp. tab. 170. fig. 3. tom. 5. videtur esse Vandella  
vel Colum. Koenigii