

Scytala

Longan *Pistalia foliis pinnatis, bacis globosis subloribus Lour. pl. Cochina*

ney. 233

Habitat in Cochinchina et China &

Arbor mediocri. Folia impari pinnata opposita vel alterna
cuneolata, glabra, subtus gemma, subtus floriferantia
Racemi terminaliter filamentosae. Corolla subrotata.
Bacca binata, semipollicari pallide rufa.

non vidi

crinita Syzygiae bacis puberulis crinitis, pulpa semini coalita.

Dioscarpus crinita Lour. fl. Cochinch. pag. 234

Rampontan Mont. javan. Lib. 6. p. 23 fig. 109.

Habitat in sylvis Cochinchinae et Javae.

Arbor medicinis. Folia imparipinnata. foliola lanicolata
glabra. Racemi crinitati terminaliter. Bacis puberulis
pollicariis rubra villis plumis longis coloratis circumdata
binata.

informis ^{Sicytalia} Democarpus fructu tuberculoso irregulari

Democarpus irregularis Lour. fl. Cochinch. pag. 234

Habitat in sylvis Cochinchinae

Arbor medicinis. Rariora folia et flori ut in Longan. Racemi
terminales; pauci flori. Germen et fructus gemini.

non vidi

7 Edulis Saponaria ^{indur.} foliis pennatis: folioli lanceolato-oblongis, rachis simplicibus, fructibus
baccis mucronatis. Hort. kew. 2. pag. 36.

Cyrtalia. chenop. Garten de fruct. 1. pag. 197. Tab. 42. fig. 3.

Dimocarpus Lichi foliis pennatis: baccis cordatis Squamofis Louisei: fl.
Cochin. pag. 233. (ed. Ulesip.)

Inermis. Rami teretes, glabris, cortice punctato.

Folia petiolata, subopposita (partem in specimenis quod coram habeo) abrupte
pennata, trijuga: foliola petiolata, subopposita, sicut lauri Caspae, Tripolli
Casae, intima minora, lanceolata-oblonga, utrinque acuta, acumi-
nata, glaberrima, leviter obscure venosa, subtus glauca.

Petioles supra plani usculi, rursus supra scabres, glabri.

Racemi terminales, decempositi; pediculi et pedicelli leviter
fomentosi.

~~Coryifolia~~ Sapindus inermis, foliis pennatis foliolis lanceolatis glabris univo
terminali, rachi simplicibus, ^{si}.

Habitat in India orientali? Dedit a Schumacher. 3

Folia pennata ^{4-5 polliciana} tum pari, 5 puga. Foliola petiolata, ^{4-5 polliciana} infima op
posita ^{superiora} ^{inferiora} alterna, ^{Coryifolia} ^{4-5 polliciana} lanceolata, infima canesca
to oblonga, integerrima, glabra venosa, supra nitida subtus
pallidiora, acutiuscula.

Petoli vestiti ^{si} pilis

Peduncul Raiemus compositus. Flores conferti brevissime pedicella

^{si}
Calycis tomentosi ^{si} incani

5 Dulcis Saponaria inermis foliis pennatis: folioli ^{oppositi} lancolato-oblongis; rachis simplicis,
fructibus muricatis Hort. kew. 2. p. 46.

La. Dji Offic. 4, 92. 204.

Lein ci Boym fl. pa. tab. D.

Li-tchi Du Haede chin. 2. p. 144. fig. in tab. ad. pag. 154

Liphia sive Liphion India orientalis Zan. hist. 147. t. 100.

Habitat in China, Tunquin, Cochinchina &

~~Folia 9 juga opposita pennata. Foliola alterna infima cum opposita
breve petiolata utraque subacuta basi altero latere angustata, supra
nitida 3-4 pollicaria interiora minora. Racemuli in pedunculo
communi alterni. Calyx floris congesti. Calyx tomentosus.~~

Glaberrime cortice fusco punctis cinerascens. Folia petiolata
subopposita superne, ⁴trijuga, ²clim pari pennata; Foliola petiolata
opposita lanisima utraque acuta, subtus glauca supra nitida
bis. tripollicaria. ^{trijuga}Panicula terminalis, pithamou rubescens

Sinos arpus Lichi, folis pennatis: bacis cordatis (male) squamosis

Louiso fl. Cochinch. 1. p. 131.

Cyrtalea Zaestren