

Sciale

orientale Sciale glumis hirsutis, squamis calycinis subulatis Lin. S. V. p. 125.

Gramen orientale fecalinum, spica brevi et lata Tournef. Corol. 39.

Habitat ad Archipelagum. herb. Tournef. Ved. et Turf.

culmi plures, gemiculis infractis; palmare, filiformes. folia lanceolata,  
pollicaria. Spica semipollicaris, villosa; aristata. sulcula striata. folia ad  
latera florulorum lanceolata

cervale P. glomeratum Ciliis scabri Lin. S. V  
hybernum Sciale hybernium vel majus Bauh. pin. 22. Theatr. 425.  
vernum β. Sciale vernum f. minus Bauh. pin. 23.

Habitat. C  
Culm. apice villosus

folia cetera villosa spica quadripollicari valvulis calycinis  
pubulatis angustissimis bifloris valvula canaliculata in antheram  
reflexas canna et margine ciliata

*Erechtium seiale* Glumis extrosum ciliatis Lin. IV. p. 125

Gramen *Erechtium* spicatum seicalinum altissimum, tuberosa radice Tournef. Corol.  
39. Scheuch. gram. 22.

Habitat in Creta.

~~Culmi bipedales erecti glabri striati. Folia angusta plana villosa  
Spica sesqui-pollicaris crassiuscula digitata term.~~

Planta herb. Vaillantii non consent cum descriptione Lin.  
non vidi

herbarium Seede fructu brevi ovata diffructa, flosculis villosissimis breviter  
ornatis La Mart. V. Enc. pag 210  
Habitat in Hispania Vall  
an orientale

vellosum l. glumam ciliis vellopi, squaræ calycinis cuneiformibus  
lin. l. v.

gramen scialinum maximum Park. theat. 1144.

13. gramen ereticum spicatum scialinum, glumis ciliaribus  
Tournef. cor. 39. Barb. cent. 9. p. 21. t. 41.

Habitat in Europa australi, et in oriente. frequentem Romæ legi  
Culmus bipedali glaber et natus. Folia angusta utroque velloso  
plana. Spica sesquipedaliana <sup>cannata</sup> crassitie digiti intermedia  
valvula calycinis <sup>verso</sup> <sup>complanata</sup> <sup>longis</sup> <sup>trifloris</sup> <sup>superne</sup> <sup>subtrifloris</sup> <sup>inferne</sup>  
scabre cavo margini membranacea ciliata apice truncata  
aristæ longitudine valvula scabræ. flosculi tres valvula exte-  
riori lanceolata in <sup>lanceolata</sup> <sup>aristam</sup> <sup>depressis</sup> <sup>marginis</sup> <sup>et</sup> <sup>canna</sup> <sup>super-</sup>  
ne ciliata floræ et sterili flosculi duo inferoræ aristati.

gramen hodeacum, d. Fischeron major, ciliaribus glumis densis  
Banal. ii. 122. no. Scherlehr. gran. pag. 21. tab. 8. fig. 4. a.  
b.