

Sedum

Claritate speciem non mihi placet. utlenit ydax di. d. Silen
examine ~~subtrahentur~~

rubens Sedum

Sedum atratum Gacq. fl. Austr. tab. 8. fig. 1. Wulfen
Sedum rubens pumileum, tandem sanguineo rubrum, foliis tereti obovatis crassifolius, adpressatis;
Cyma subsessili subquadripida pauciflora; petalis albis rubro carinatis Gacq. Coll. 1. p. 302.

anglicum Sedum foliis subrotatis adnatis sessilibus gibbis alternis, cyma ramosa
bifida Auct. Ang. 196.

Pulchellum Sedum

Habitat in Carolina herb. Ruth

Caulis basi ascendens, erectus, strigosus, glaber. Folia sessilia, unguiculata, verticillata.
Spicae superne, axillares, solitariae, terminales vertice, recurvae, bipollicares. Flo-
res secundae. Petala subulata. Stamina longitudine corollae.

ternatum Sedum.

Habitat in America boreali herb. Rich.

Caulis herbaceus, digitalis, adscendens, glaber. Folia glabra, inferiora ternata obovata, cuneiformia, integerrima, superiora linearia. Cyma terminalis, trifida cum flore centrali 10 andro. Reliqui octandri

pupillum Sedum

Habitat in Amer. sept. herb. Richard
Caulis bi-f. 3 fidus; serqui pollicis anis

habes

Sedum

Sedum minus e nepe St. Vincentii Gray bot. app. 1879. Catal. pl. angl.

Habitat herb. Mus.

Caules semipedales, simpliciter. Folia parva, verticillata. Cyma cæca, cum pediculo intermedio unifloro.

echinatum Sedum

Sedum echinatum creticum

Habitat in Creta herb. Mus.

Radix annua. Caulis palmari et ultra, tuberculatus, glaber, ramoposus
rami adscendentes, et vititudine cauli, superne dichotome divisi. Pediculi
pubescentes. Folia sparsa, semipollicaria

323.
verticillatum sedum foliis quaternis Lin. Am. Acad. 2. p. 252. V. 4. fig. 14. & L. V. p. 429
Sedum aparinet facie, Tauromenitanum Raii extr. 233. Mon. hist. 3. p. 473.

Habitat in Europa maxime australi, et Siberia G. Herb. Mus.

Caulis pedalis, erectus, teres. Folia lanceolata vix digitum longa, aequaliter

+ raro quina serrata, basi, acutiuscula, minus carnosae. Flores in suo genere parvi Lin.
Am. l. c.

Caules venae ascendentes, simpliciter, superne in pedunculos densae. Folia
superiora, inferne quaternae, vix unguis longae. Pedunculi pubescentes

Telephium L. foliis planiusculis serratis, corymbo folioso, caule erecto
Linn.

Telephium vulgare Bauh. pin. 287.

album Telephium album Tuck. hist. 800

purpureum β fl. dan. tab. 606

Telephium purpureum minus Bauh. prod. 133 pin. 287

V Telephium purpureum majus Bauh. pin. 287.

A Telephium latifolium peregrinum Bauh. pin. 287

maximum E Telephium hispanicum L. Claf. hist. 2. p. 66

Anacampteros maxima Bauh. hist. 3. p. 602.

Habitat in Europa sicca siccis siccis

Caulis erectus fistulosus vel pedalis uti tota plantula
glabra ex Teris simplex. Folia sessilia alterna oblonga
obtusè serrata, ped. frequentia polliciana et ultra.
Corymbus terminalis decompositus hemisphaericus laticus
dine solo manis. Stamina longitudine corollae

Hellatum L. foliis planiusculis angulatis, floribus lateralibus sessilibus solitariis L. S. P.

Cotyledon hellata Bauh. pin. 205.

Sempervivum Tertium Col. phytob. 32. t. 11.

Sedum echinatum vel *hellatum*, flore albo Bauh. hist. 3. p. 600.

Habitat in Italia, Gallia, Helvetia

Caulis ramosus glaber articulatus digitalis vel ultra. Folia alterna femipollicaria sessilia extrosus dentata. flores axillares sessiles

cuneatis extrosus dentatis, floribus axillaribus sessilibus solitariis

Anacampseros L. foliis euneiformibus integerrimis, caulebus decumben-
tibus, floribus corymbosis Lin. L. V

Telephium VI. Ceras. planii Claf. hist. 2. p. 67.

Telephium repens, folio deciduo Baub. pin. 287.

Anacampseros minor, rotundiore folio, semper vivens. Baub. hist. 3.
p. 682.

Habitat ^{plures} ⁴
Caules ^{feres} purpura scentes demum erectos. Spithamei. Folia
alternis frequentia. Corymbus flori. sespiti secundi in pedun-
culis alternis. Petala lanceolata filamentis longior

rosea Rhodiola Lin. LV

Jl. Dan. Tab. 403.

Rhodiola radice Claf. hv. 2. pag. 65. Bauh. pin. 2 Ob.

Telephium luteum minus, radice rosam redolente Morf. hv. 3.

p. 460. f. 12. 8. 10. fig. P.

Habitat in alpebus Europaei ?

Estes sed. Telephii. Caules simplicissimi ascendentes, sive prostrati
mo, glaberrimi, uti tota planta. Folia opposita, pollicaria
oblonga extrofum dentata, carnosae glaucoviridia frequen-
tia alterna. Cyma terminalis floribus flavis

Sedum rosam

hybridum L. foliis cuneiformibus conicis subdentatis aggregatis, ramis
repentibus, cyma terminali Lin. L. V. Gmel. pl. 4. 7. 67. fig. 2.

Sedum hybridum foliis cuneiformibus subconicis obtuse serratis,
caulibus obliquis, axillis baeos et propaginum radiceantibus,
Cyma terminali Murr. in Com. gött 1776. p. 35. 7. 5.

Anacampteros minor repens, flore purpureo Burb. cent.
1. p. 33. 7. 61. fig. 2.

Habitat in Tatania ad radicem montium uralenium Traperenti,
Solia polliciana uti tota planta glabra est utrumque
dentibus 3 vel 4 in petiolo subpetiolato. Cyma pedunculata
particula ^{br} trifida ~~trifida~~ flor. sessilibus ~~internodi~~ sessilibus in divaricatione
f. late folia ^{am} cuneiforme sub fl. integerrimum sub floribus
catenatis.

Stoloniferum. S. foliis subcuneiformibus ^{integerrimis, dentatisque} ~~subdentatis~~ fasciculatis, caulibus
repentibus articulatis nudis, cyma sessili glomerata Gmel. 4-3. p. 311

Tab 35. fig 2.

habitat in monte Gilario
Capsula facie foveolata

non vidi

divaricatum Sedum foliis cuneiformi-rhombicis emarginatis petiolatis, caulibus
ramosis, panikulis terminalibus divaricatis Hort. Vind. 2. p. 100.
Habitat in Madera h.

non vid.

Aizoon l. foliis lanceolatis serratis planis, caule erecto, cyma sespli
Vernali Lin l. V Gmel. bot. 4. p. 173. t. 67. fig. 1.

Cina campestris flore flavo Amon. ruth. 96. t. 11.

Sedum foliis planis serratis, corymbo folioso Hort. Upsl. 1164

Habitat in Sibiria.

Caulis teres glaber aneresis spithamous. Folia sesplia alterna, gla
bra remote serrata, obtusa basi veluti integerrima sesqui
pollicaria dispersa. Cyma bis vel ter bifida flores sesple.

Libanoticum Radum foliis radicalibus fasciculatis spatulato-lanceolatis, caule sub-
nudo simplicissimo Lin. Spec. pl. p. 617. * P. V. p. 430

Habitat in Palestina 4

Tacis sempervi vi montani. Colia radicalia fasciculata, spatulata lanceolata
acuta, glabra, integerrima. Caulis ad latus radicis, adpendens, semipedu-
lis, simplicissimus, inferne adpressus foliis linearibus, acutis. Racemus
terminalis longitudine caulis. Pedicellis parvis, saepius bifloris. Capsula
non divergens, calyce unito. Lin. l. c.

populifolium L. foliis petiolatis cordatis dentatis floribus paniculatis

Len. Suppl. p. 242. t. V. p. 430.

Sedum populifolium Pall. it. 3. p. 73 t. V. O. fig. 2.

Habitat in Siberia 5

Rami nudi
Fruticulus pedali ramisopimus glaber cortice purpureo
Folia longe petiolata pollicaria, obtusa, obtuseque inoqua
uter undique dentata, crassa. Panicula terminalis. Petala
alba lanceolata longitudine stamenum

tan cordato oblongis
gallioidei S. foliis infimis quaternis superioribus oppositis summis alternis

Radum gallioidei All. fl. pedem. no 1742. Tab. 65. fig. 3.

Habitat Pedemont.

Brenni affinis maxime sed. cetera ~~autem~~ differt caule non
procumbente foliis inferioribus ternis vel quaternis deum
opposita demum alternis. ~~et~~ Petala purpureo anastata.
all.

non vid.

alfine folium foliis oblongis planis alternis, pedunculis ^{sub}racemosis

Sedum alfine folium erectum ramosum foliis planis, floribus albis longe pedunculatis all. spec. Pedem. p. 15 tab. 3. fig. 2 flor. Pedem.
no 1740 tab. 22 fig. 2

Habitat in montosis Pedemontis

Caulis erectus pithamosi superne densus, ceteris pubescens.
Folia linguiculata basi ~~attenuata~~ parum attenuata. Pedicelli pallidius alterni subinferioribus foliolum parvum, uniflori.
Petala pallida flava uti calycis foliola lanceolata

Cypripedium. Folia planis, caule ramoso, floribus paniculatis Hort Cliff
1764

Cam epit. 673.

Cypripedium Cliff. herb. 2. p. 60. Bauh. pin. 288.

Sedum annuum album, oblongo portulacae & minoris folio Monf.
herb. 3. p. 473. f. 12. t. 7. fig. 37.

Habitat montis pelii, Genesos, Gales ad lacum salsum ☉

Caule erecto. Folia ^{glabra} opposita lanceolata obtusa
opposita unguiculata ^{ramo} pedunculi axillares oppositi
racemi ^{racemi} paniculati in apice ramulorum petala lanceolata
pedicelli non illoso

lanceolata ^{opposita} oblonga, floribus racemosis

heptapetalum L. foliis ovato-oblongis planiusculis, pedunculis subdiffe-
tis paniculatis Torr. L. v. pag. 169
Habitat in Barbara

est Sedum floribus coeruleis a me in Barbara lectum herb. ha. Mon. V
~~Barbara~~

virens Pedum foliis subulatis parvis basi foliatis, floribus cymosis, petalis calyce
lanceolato sesquilateralibus Hort. Kew. 2. p. 110.
Habitat in Portugallia 7

michi haud notum

samentaceum S. foliis subulatis, ~~caulis~~ caulium sterili confectis axillis samentis
capitulantibus axillantibus, floribus cymosis
Habitat in Regno maritano Schomburgk
Caulis floriferi adscendenti pedales, foliis sparsis remotis sterili-
bus foliis unguiculatis. Cyma ut in Sedo rupestre folia
calycis lanceolata petala linear lanceolata sulphurea calyce
dimidio longiora &

an virens Hort. Vew

reflexum Sedum foliis subulatis sparsis basi solutis: inferioribus recurvatis Lin. L.V. pag. 430
Flores hinc 1296 ~~et hinc~~ fl. Dan. tab. 115 fig. haud optima
Sedum minus hematoides

Aeroon hematoides lob. 4c.

Sedum minus luteum foliis acuto Bauh. Pin. 289

β. Aeroon scorpioides lob. 4c.

Sedum minus luteum ramulis reflexis Bauh. Pin. 289

Habitat in Europa ad radices montium &

Folia viridia, tenuius subulata, inferiora recurvata uti ramus

Caulis ^{longioribus incurvis tunc erectis} plures, ^{erecti} palmari vel ultra, teretes, glabri, ex glaucis
ac rubellis, virides, inferne a foliorum capite cicatricibus instructos

Folia alterna sparsa, in ramis sterilibus densius congesta, inferiora
recurvantur ex tereti planiuscula, apice mucronata brevi terminata

Cyma dichotoma floriferandi subsessile. Petala lanceolata obtusa
stamina decem observant Pollen

repente s. foliis subulatis quinquefariis congestis basi foliatis, floribus
cymosis Lin. S. S.

Sedum repente repens, foliis compressis Will. Ellh. 343. 4256.
Fig. 333.

Habitat ad radices montium Europa &

differt a sedo saxatile caule ascendente minus ramoso, foliis
subulatis approximatis, in furculis annatis imbricatis. floren-
tia cyma congesta

~~h~~ *sedum* P. folus ovato-teretibus alternis obtusis, caule bifido,
floribus sessilibus all. fl. Pedem. n. 1746

~~Lobel ii. 370~~ ~~h~~ ~~pag. 21~~

Sedum minus *sedum* Lobel. hist. pag. 205. ii. 370

Sedum foliis ovatis minus *teretifolium* *teretium* Bauh. ~~h~~ ~~per~~
203

Habitat in collibus saxosis O. ~~h~~ ~~Desfont~~ ~~228~~

Caulis palmari, flexuosus vel apice parum recurvus, glabris, rami
si: rami alternis e margine decurrente oppositis. Folia cylindrica
glabra. Flores axillares sessiles solitarii

facie ad sedum reflexum accidit

nihil ignotum

procumbens L. caule ramoso procumbente, foliis alternis remotis, floribus sub
sespilibus Schrank fl. Bavar. 1. p. 728

Sedum caule ramoso prostrato, foliis teretibus ramosis remotis
floribus longe sespilibus Hall hist. n. 964

• Habitat in Helvetia et Bavaria

Flores lutei

prostratum

(Sedum) Sedum foliis semiteretibus sparsi basi soluti caule ramoso ad
scandente, floribus cymosis Betz. prodr. fl. Scand. p. 562

Sedum rupestre fl. Dan. tab. 59.

Caules utriusque decumbentes, statim a radice ramosi. Folia alter
natim sparsa ex tereti planiuscula, basi plana nonnihil
soluta carnosae glabra obtusa. Flores lutei subsessiles sparsi
in ramis, ramis sub cymosis Roth.

Sedum saxatile

Sedum saxatile all. fl. Ped. n. 1749. Tab. 65. fig. 6 Roth fl. Germ. 2

Sedum alpestre, foliis teretibus, floribus subumbellatis luteis Villars

nicaense S. foliis subulatis fraxi basi foliis alternis, cyma bifida.
all. fl. pedem. n. 174 tab. 90 fig. 1

Habitat in Scopulis nicae
Caulis. vix spithameus sub erectus puberulus simplex. Folia alter-
na flores subalbidi in summitate magis majores quam in con-
versis. all.

non vidi

quadrifidum ^{terrestris} L. foliis acutis caulibus erectis simplicibus, florum octan-
dro tetragynis Pall. A. 3. p. 736 t. P. fig. 1 A

Habitat in Siberia 24

Radix descendens rariore planta magna ^{apice velut in primum caulum} ^{ramentosa} planta cespitosa basi
erecti tenues bipollicares simplici. Folia coriacea alterna
carriosa varietati. Calycis foliola linearium. Petala lanceolata
flava. Flores terminales 4-5.

Lineare l. foliis tereti linearibus oppositis, cyma trifida Thunb. fl. Cap
pag. 107. S.V. p. 430

Habitat in Caponia

Caulis glaber simplex raro ramosus. Folia opposita amplexicaulia, ter-
ti linearia, acuta, glabra, patentia, pubescentia. Flores lutei.
Flos intermedius in Cyma sessilis Thunb.

hispanicum L. foliis verticillis acutis: radicalibus fasciculatis, cyma
pubescente Am. acid 4. p. 273 & Jacq. fl. austr. s. app. 4. 47.

Nedum Hispanicum, folio glaucis acuto, flore albedo Will.
Echt. 342. t. 256. fig. 332.

Habitat in Hispania &

Caulis plures debiles digitales vel ultra ascendenti. folia
seu vix semperque ulana obtusifolia acutiuscula. petala laniceo
lata alba nervis tribus nifescantibus

album L. foliis oblongis obtusis teretibusque sessilibus patentibus, cyma
ramosa Lin. S. S. Fl. Dan. tab. 66.

Vermicularis fillicetra major Cabel. hist. 205.

Sedum minus teretifolium album Bauh. pin. 203.

Habitat in Europa petris

Caulis repens ramis erectis simplicibus folia approximata
Cyma dichotoma petala lanceolata

1213

Cosium L. foliis verticibus obtusis, alteris ^{patentibus}, cyma ramifera glabra

Habitat in rupibus Tenei versus Solyma

Caulis basi repens ramifera. Rami vertice glabri, ^{arbori} laxis pinnis, erecti.

Folia remota patentia, obtusa glauco viridia, opaca ^{per pinnas} punctata, six unguiculata. Rami cyma ^{parvibus pinnis & cespitibus} bifida, folium parvum ovatum

subramificationibus. Flores parvi ^{albi} 3 plo minores quam in albo
Folia ^{oliva} sub calycis subcarinosa, ovata, obtusa. Flores a

a sedo albo certe differt. Character vero datus naminne
destringitur ab albo, si cymis pinnis diffit. ^{horum}
Nunc: ut in exclamatione precipue huiusmodi differt
ubi pinnis cymis horum adhuc videntur

(Coccylicum)
racemosum 1. foliis oblongis obtuse truncatis sessilibus patentibus, racemus
simpliciflorus Lin. Mant. 241.

Sedum africanum flore caeruleo hexapetalo et heptapetalo Gale
gott. 135 Willd. obs. 50.

confer Plukn. 7. 223. fig. 2

Habitat in Africa

in Systemate Vegetabilium Mur: omittitur

non vidi

nudum Sedum foliis sparsis oblongo-cylindricis obtusis, caulibus fruticosis ramosis
ramis tortuosis, cymis terminalibus Hort. kew. 2. p. 112.
Habitat in Maderat

non vid.

1819 pubescens Sedum pubescens, foliis oblongis obtusis supra plani
infractis, cyma bifida, petalis ^{concoloratis} ~~concoloratis~~
Legi in festinis rupium Tuneti

Caulis palmaris et ultra, carnosus, basi frutescens, ramosus.

Rami frequentes, sparsi, interdum oppositi, teretes, pur-
purascens, pubescentes, uti tota planta

Folia parva supra basin adnata, alterna, ^{lemi,} ~~concolorata~~
lanceolata, conferta, oblonga, obtusa, supra planiuscula
versus basin canaliculata, subtus convexa, saepe
purpurascens; suprema ovata

Cyma terminalis, bifida, multiflora. Pedunculis ^{ramis} ~~ramis~~
ramosus; inter ^{ramis} ~~ramis~~ pedicelli alterni, solitarii,
uni flori. Rarius ramulus unus vel alter floriferus
infra cymam.

Calycis ^{concolorata} ~~concolorata~~ lobula ovata, obtusa, minime carnosus
Petala ^{concolorata} ~~concolorata~~ villosa, flava, intus purpureo-punctata,
magnitudine Pediacinis

13-14. ~~Corypha~~ Euphorbia ~~Indefinens~~ ramosa, foliis oppositis oblongis obtusis & labris integerrimis

Habitat in India orientali ^{specie} Ter vel quater durissima

~~Totum~~ glabra ^{superne} ~~superne~~ ^{autramis} ~~autramis~~ ^{dichotomia} ~~dichotomia~~ ^{atque} ~~atque~~ ^{laxa} ~~laxa~~ ^{latere} ~~latere~~ ^{capiti} ~~capiti~~ ^{breviora} ~~breviora~~ ^{acutiora} ~~acutiora~~

Folia breviter petiolata angustilana, patentissima, mucrone mucronato

^{terminata} ~~terminata~~ ^{glauco} ~~glauco ^{viridi} ~~viridi~~ ^{superne} ~~superne~~ ^{dichotomia} ~~dichotomia~~ ^{ramulorum} ~~ramulorum~~ ^{solitaria} ~~solitaria~~~~

Flores parvi
Capsula glabra lani magnitudine sem. Conaridi

hispidum *S. hispidum* foliis oblongis caule ramoso erecto, petalis anfractis
floribus racemosis ~~foliis~~ ~~ymo~~ ~~foque~~ ~~sub~~ ~~ymo~~ ~~foque~~

Sedum Veretifolium hispidum caule ramoso erecto, petalis anfractis
stamina superantibus, pedunculis unifloris All. fl.
Pedem. ne 1754. Tab. 65. fig. 5.

Habitat Pedem.

Vienni

Caules saepe plures saepe vix digitalis erectus vel subspicendens basi
raterdum ramoso uno alterove plerumque simplicissimo. Folia
inferiora confertiora superiora distantia semper angustiora
obtusiuscula. Flores interdum in racemo paucifloro raterdum
in umbra bifida. foliola calycis oblonga petala lanicollata

Sedum Oederi Tab. 24 Quod vellosum hinc revocatur All.
absque nra

villosum l. caule erecto foliis oblongis supra planiusculis pedunculisq; axill
laribus subnifloris pubescentibus; petalis ovatis obtusisculis.

Sedum minus palustre Claf. hist. 2. p. 59.

Sedum palustre pubescentum purpureum Bauh. pin. 205.

Sedum villosum caule erecto, foliis planiusculis, pedunculis
que subpilosis dicitur l. v. pag. 431 Sed. fl. Dan. 7. 211.

Habitat in pratis paludosis Germanis, Anglia, Gallia, Pomerania
Norvegia

atratum Sedum caule erecto, floribus corymbosis fastigiatis Spec. pl. p. 1673. * Jacq. Austr.
t. 8.

Sedum saxatile, atro rubentibus floribus Bauh. Pin. 284 prodr. 132.

Habitat in Italia Alpibus ©

Diversissima a Sedo rubente. Caulis erectus pollicatis, ramis ad radicem duobus
oppositis, altitudine caulis. Folia oblonga basi soluta. Pedunculi alterni
uniflori, in Corymbum fastigiatum digesti. Calyces atro purpureo scenti. Pe-
tala alba, ovata, longitudine calycis. Stamina 10. Germena atropurpurea
scentia lina l. c.

aere s. foliis subrotatis adnatis sessilibus gibbis erectis apiculis alternis, cyma
trifida Lin. S. V.

Elecebra s. *Sempervivum Vestrum* Dod. per p. 124. per
Sempervivum minus vermiculatum aere Bauh. pin. 203.
Habitat in Europa campis sicca siccis sterilibus &
Caules plerumque ex una radice in caespitem densum dispositi, semi-
digitales vel paulo majores, basi decumbentes, ramosi teretes.
Folia praesepalia, approximata ex subrotundo ovata obtusa
brevia, compressiuscula caragosa basi soluta, glabra. Flores in cyma
terminali *trifida* secundi sessiles alterni flavi
Calyx flavus foliolostrigone obtusi

Leotangulase l. foliis subovatis adnato sessilibus gibbis erectis sculis setiferis
an imbricatis Lin. Spec. pl. pag. 6204 fl. per. 4044

Sempervivum minimum Lam. epist. D. 56.

Sempervivum minus vermiculatum insipidum Bauh. pin.

204?

Habitat in Europa borealis campis apricis siccis &
a l. are differt foliis ante florescentiam evidentissime
setiferam imbricatis et sapore insipido sive nullo modo.
aeri. Caulis maxime caespitosus. folia angustiora teretibus
Calycis foliola oblonga, linearia.

anglicum. P. foliis subovatis adnatis sessilibus gibbis alternis, cyma ramif-
bifida Hudf. flor. Angl. 196. Hort. Kew. 2. pag. 111.

Sedum minimum non acre flore albo Rai syn. 270. Tab. 12.
fig. 2.

Habitat in rupibus juxta Angliam &

Caulis procumbens teres foliatus, glaber, ramifus rubescens. rami
alternis. Folia alternis, subtrifloram imbricata, adnatis sessilibus sub-
ovata acutiuscula superne planiuscula, subtus gibba pulposa ruda,
Cyma ramifera, bifida subrecurva. Flore sessiles secundis Corolla al-
ba seu purpurascens. Capsula perispermica

annuum l. caule erecto solitario annuo, foliis ovatis sessilibus gibbis alter-
nis, cyma recurva. Len fl. Sw. 405 +
~~Sedum minimum non acce, flore albo Raj angl 3. p. 20.~~

~~S. reflex. 2.~~

Habitat in Europa boreali O

et sedo acin differt radice annua, caule erecto solitario nec
ad terram ramos emittente. flores lutei

14-15 Conuleum Sedum foliis oblongis alternis ^{Sedum} obtuso basi solutis, cyma bifida glabra
Sedum vermicularae ramulorum, glabrum, floribus parvis Conuleum Shaw.
A. p. 46. n. 550. fig. 550.

Crescentem inveni in fissuris rupium ad Manub Tuncti
Caulis digitalis, glaber, viti omnia, purpureo-florens, in solo majori simplex,
in pinguiori ramosus. Rami altitudine et structura caulis, alterni
vel sparsi, simplices.

Folia alterna, varietia, oblonga, obtusa, in specimenibus majoribus, purpureo-
res-virescentia, in minoribus tota rubentia

Cyma terminalis, bifida. Pedunculi divaricati, flexuosi, interdum
bifidi, foliorum ⁴ structura foliorum caulis subramificationibus.
Pedicelli alterni, patentissimi. Floris parvi

Calyx petalis brevior.

Corolla. petala lanceolata, purpureo-roseo-violacea

2 # filamenta 10. variorum 12, longitudine petalorum. anthera globosa,
3 purpureo.

1 # nectaria squamata truncata, mucronata, ad basin geminis

4 germina quinque, ovata, acuminate, alba, longitudine fila-
mentorum

1819 pubescens Sedum pubescens; foliis ^{obtusis} oblongis, supra planiusculis, cyma bifida

Legi in fissuris rupium teneti

Caulis palmari et ultra, carnosus, basi frutescens, ramis ~~inermibus~~ ^{purpurascens} ~~inermibus~~ ^{marginibus oppositis}

Rami frequentes, teretes, ~~alterni~~ ^{purpurascens}, ~~pubescentes~~ ^{pubescentes}

Foliis ^{ut in tota planta} alternis, ^{ramum supra basin} ~~obtusis~~ ^{obtusis} ovatis, alternis, semper unguiculatis, confertis, ^{oblongis}

supra planiuscula, versus basin canaliculata, subtus convexa, ~~sempurpurascens~~ ^{sempurpurascens}, et suprema

ovata

Cyma terminalis, ap bifida, multiflora, pedunculo ^{in ramis} ~~aphylla~~ ^{unius vel alterius}

pedicelli alterni solitarii uniflori interdum ^{ramulorum} ~~ramulorum~~ ^{florum}

Kalycis foliola ovata, obtusa minima carnosae ^{rami} ~~rami~~ ^{semita infra apicem}

Petala extus vix flava, ^{interius} ~~extus~~ ^{interius} purpureo punctata magnitudinis sediacini

18-19 ^{Dasy} ~~Glaucophyllum~~ ^{oppositu} Sedum foliis ovatis alternis, subperispermatis, supra planis, ^{supra planis, fuscis} cyma bifida pedunculata
 Cylis glabris
 Habitat cum ^{presidente} in helicta Lusitania hispanica Borbona?
 Caulis ^{perennans} perumbens teretis, carnosus, inferne glabri, ramosi ramis asperis
 dentibus digitalibus, villosis pilis
 foliis ^{lesper} ovato, altera imbricata, subperispermatis, subtus gibba, obtusa
 glaucis viridia, interdum rubentia
 Cyma terminalis bifida pollicaris, pedunculata, pedicellis glabris
 Calycis foliolosa figura et consistencia foliorum, minora
 Corolla alba, petala acuta, dorso linea purpurea
 bilamata longitudine corollae, anthera purpurea
 auron dasyphyllum Dalech. hist. 1133.
 Sedum minus foliis coronato Baud. per. mon. hist. 3
 pag. 473 p. 12. tab. 7. fig. 35
 Sedum dasyphyllum foliis oppositis ovatis obtusis carnosis, caule
 inferno, floribus prope lin. l. v. pag. ^{fac. qu. teret}
 Tab. 153

Sedum dasyphyllum est.

oppositum l. foliis ovatis ramis que oppositis glabris, Cymis divaricatis
cymis dichotomis divaricatis flexuosis caule erecto

Habitat in Hispania in montosis circa Toletum.

Planta digitalis erecta, filiformis ramis diffusis, foliis
foliis parvis carnosis. pedunculi et pedicelli flexuosi calycis
foliola ovata margine venis membranaceo, Petala oblonga
pallida incarnata

microphyllum L. foliis sub glabris foliis subtus vasis inferioribus
latis oppositis, cyma bifida, caulibus procurrentibus

Habitat in Hispania

Planta pollicaris basi caule lignoso ramis plerumque paucis, stendi-
bus brevibus foliis teretibus. florum tenuissimis subcapitulos
foliis remotis apice in duos ramos floriferos apiculatos
divisi. florum pedicellati. folia paucissima glabra
petala ovata stria fusca, acuta. foliola calycis obtusa
anthera fusca

Sedum portlandicum

Sedum minus lato et crasso caule portlandicum belgicum. et monstrositer
caule fasciculato herb. Guss.