

Selago

1. *combofa* L. *combo* multiplici, floribus disjunctis, foliis fasciculatis feliiformibus ^{pubescentibus}
2. *cinerea* L. *combo* composito, foliis fasciculatis glabris, margine reflexo.
3. *polystachya* L. *combo* spicis fasciculatis, foliis feliiformibus fasciculatis glabris
Calycebus hispida
4. *geniculata* L. spicis terminalibus ^{solitariis} floribus distantibus, foliis fasciculatis glabris
margine reflexis, ramis glabriusculis
5. *canescens* L. spicis terminalibus solitariis, foliis calycebus villosis, foliis
fasciculatis feliiformibus glabris, ramis villosis
6. *stneta* L. spicis ^{sub}globosis ^{racemosis} lateralibus, foliis fasciculatis feliiformibus caly
cibus ramulisque villosis
7. *capitata* L. capitulo terminali, foliis fasciculatis linearibus carnosiss glabris
7. *divaricata* L. capitulis terminalibus, foliis fasciculatis feliiformibus linea
ribus glabris
9. *lateraliflora* L. spicis lateralibus calycebus ramoque glabris, foliis fascicula
tis ^{sub}globosis ^{pubescentibus} glabris

10. Triflora L. pedunculis lateralibus trifloris, foliis fasciculatis linearibus margi-
nata
ne revolutis.

11. Casta L. spicis lateralibus terminalibusque laxis, foliis filiformibus inferius
fasciculatis supremis solitariis

12. repunculoidea L. spicis corymbosis, foliis linearibus dentatis

13. spuna L. spicis corymbosis, foliis linearibus dentulatis

14. coicea L. spicis corymbosis, foliis inferioribus linearibus integerrimis, superiori-
bus lanceolato-subulatis subdentatis

15. triquetra L. spicis terminalibus, foliis triquetris umbriatis recurvato reflexis
glabris

16. hispida L. spicis terminalibus, foliis linearibus sparsis reflexis hispida

17. polygaloides L. spicis terminalibus, bracteis calycibusque carinatis, foliis linea-
ribus glabris, margine reflexo

18. fruticosa P. capitulis subrotundis terminalibus, foliis sparsis linearibus
obtusis integerrimis, caule fruticoso

19-
20 + 19 involucreata L. spicis capitatis subcorymbosis involucreatis, foliis lanceo-
latis oppositis hirtis

21 20 verbenacea L. spicis fasciculatis, foliis lanceolatis glabris superne serratis
caule ramisque acute tetragonis

22. ciliata S. floribus spicati, foliis ovatis ciliatis acutis

23. rotundifolia S. corymbo compacto, foliis oblongis glabris subpetiolatis integerrimis

27. ovata S. spici ftrobiliformibus ovatis terminalibus, foliis linearibus

18-19

gracili

24. fasciculata S. corymbo multiplici, foliis obovatis glabris scapulis serratis

25. hirta S. spici longispinis, foliis obovatis

callosa Salazp

Habitat in Cap. b. p. herb. Brygm. 5

Rami parsi, rigidi. Sola denticulo uno alterove calloso, lineari

habes

Inqueto Selago

Habitat in Cap. b. frei Hab. Knym: $\frac{1}{2}$

Rami frequentes, sparsi, superne pubescentes, nudi. Folia verticillata, obtusa, glabra, decurrentia. Spic. & terminales, oblonga, unguiculares. Bractea strictura foliorum

habes an Haben. stricta?

Tortuosa Selago

Habitat in Cap: b. spec. herb. Brugm. 7

Stipulus inferne ramosus: rami raris Tortuosa flent.
glabra Solca sparsa, linearia,

habes

Corymbosa. S. corymbo multiplici, floribus disjunctis, foliis filiformibus fasci-
culatis Lin. s. V Berg cap. pag. 1564.

Camphorata africana umbellata frutescens. Corn. hort. 2.
p. 79. t. 40.

Mullefolia affinis maderaspatana, camphorata foliis radice
sua nascentibus Monf. 3. p. 39.

Habitat ad Cap. b. p. n. 5

Raules plures ^{pedales exeti hibernici}
Rami teretes, superne pubescentes. folia frequentia plura
ex eadem ex tuberculo, semunquiculanā inaequalia, pater-
tesima, pubescentia, sed unculi superne, foliosi, ramulosi,
ramulis alternis floriferis castigati in corymbum d. exsum
flores alterni in bracteis semunquiculanā. bractea lineari
contorta margine et dorso ciliata foliolo calycis oblonga obtus

Eriosea L. composita, foliis linearibus fasciculatis glabris margine reflexo

Lin. Suppl. pag. 285 L. V. pag. 560.

Habitat ad Cap. b. frei

Similema composita forma eius varietas

polystachya L. *corymbifera* Jacquinotus, foliis filiformibus aggregatis
Lin. Mant. 250. p. V. p. 560

Habitat in Caput b. p. i. campis arenosis 5

Paulis exilis lobis ramosis, semipedalis rami ^{sub}superne hispida ^{prosp.}
8 oia ad singulas gemmas plura linearia rigidula cariosa
minora quam in *L. corymbifera*. Corymbus terminalis & fructus
brevibus. Flores conferti tubo long. bractea subulata, calycis hispida.

calycibus hispida

glabris

gemiculata. I. species Vermenalebus, foliis lineari-bus fasciculatis glabris mar-
gine reflexis Lin. Suppl. p. 204. S.V. pag. 560.

Habitat ad Cap. b. mei 5

Stemmiulus ramifus Habit. Sol. canescens. Folia 7. 8. carnosa glabra
frequenter. Specie in apice ramorum solitaria. flor. distantes
parvi. bracteae lanceolatae concavae calycis vix villosi

rami glaberrimi

canescenti s. piceis terminalibus, foliis filiformibus fasciculatis glabris ten
Suppl. p. 284. R.V. pag. 568

Habet ad Cap. 6 piceis

Lenticulus ramis ^{ramulosis} parvis inferne glabris ^{villosi subcinerei} superne ~~pubescentibus~~ ^{pubescentibus}
foliis ^{ramulosis} via se mucronulatis, plerumque ex eodem gemmae glabrae margine
ad lentem denticulata piceis et apice ramulorum solitariis. flores
pauci parvi. bractea ovata acuta ciliata calycis approximati pilis minutis
viscidi

calycibus villosis

ramis villosis

capitata L. capitulo terminali, foliis fasciculatis linearibus carnosis glabris
Linn. mant. 560. & S. V. pag. 560. Berg. Cap. 157 & ramulosi
admodum prodi. ~~capitata~~

Habitat ad Cap. 6. spec. 3

Caulis suffruticosus, erectus pubescens. Folia obtusa, corymbosa
pedunculata, ^{4.5} pinnula geminata subtus sulca longitudinali ~~est~~ ^{est} ~~pollicata~~
pedunculata. Pinnula subovata, densa solitaria, umbriata bractei
floribusque. Bractea rhombica, pinnata, longitudinali florum
floribus solitariis in pinnula bractea. Linn.

divaricata l. capitulis terminalibus, foliis filiformibus linearibus
pinnatis glabris Lin. Suppl. p. 204. P. V. pag 460
Habitat ad Cap. b. p. ei

non vid.

Cateniflora ^{subglobosa} f. foliis subulatis glabris fasciculatis spicis lateralibus calycibus ramisque
habitat in Cap-6-pei? Sed & Burma glabris
Erit ex ramosis decumbens, rami parvi subramulosis, glabri ter-
tes. folia vel. corymbosa spica ad latera ramorum et termina-
les brevis subrotunda bractea ovata calycis glabra acuta

an selago divaricata

recurvata ^{fructus fasciculatis}
S. foliis ovatis reflexis inferioribus dentatis superioribus inter
geminis.

Habitat in Cap. b. p. 5

Habitus spl. fasciculata. Tota glabra. folia sessilia basi parum
angustiora, frequentia, leviter decurrentia, crassiuscula, avenia
obtusis. Spicis terminalibus brevibus pedunculato fasciculata

Triflora S. foliis linearibus fasciculatis margine revolutis, pedunculis lateralibus
Trifloris

Habitat in Cap. b. ^{ramulorum} ~~ramulorum~~ ^{vixat} ramuli pollicares
rami fraxi, teretes, glabri. Sola terna vel quina ^{semicirculata}
glabra obtusifolia integerrima. Pedunculi ex apice ramulorum
lateralium solitarii flores tres vel quatuor sessiles in apice
bracteo ovato, attenuato villosifolia.

Casta S. ^{filiformibus &} foliis ^{compositis} inferioribus fasciculatis superioribus solitariis, spicis lateralibus terminalibusque ^{caulis}

Habitat in Cap. b. p. &

Rami filiformes & recti glabri superne subcanescentes. Folia plura ex eodem tuberculo semunquiuulana glabra superiora sub pedunculatis solitaria. Pedunculi ^{est axilli supremi et terminalis} axillares, superne, bipollicariis filiformes flores distantes bractea ovata conata acuta pilos proposita margine. calycis herti.

rapunculoides. S. specis conytopsi, foliis dentatis Lin. l. V. pag. 568 + Am acad
b. p. n. 20 +

Rapunculus foliis angustis pinnis dentatis, floribus umbellatis
Sic Burm. afr. 113. t. 42. fig. 1.

Habitat ad Cap. b. p. 4

~~Rami sparsi erecti pedales simplicis. glabris, folia pinnata alterna
glabra lineana angustissima ut pollicaria, utroque dentate
utro vel altero remote pinnato. pinnae versus apicem 1-2. pedunculati
lato, pollicariae. flores alterni approximati bracteae lanceolatae
acutae. ^{apice incurvatae} tubus corollae capillaris unice calyce duplo longior~~

Cenacibus

a penna ut diversa corollam esse quadrifidam dicit Lin. in
Syst. in am. vero acad. spedam.
nisi quod specio heroni et folia pinnata latera pinn
dem sequitur Burmanni

miti q. nota

Spina L. specis conymbosi, folus linearibus denticulatis Len. Spec. pl. pag.
0774 L. V.

Melampyrum africanum Sprengelium, foliis angustissimis
Museum. afr. 115. 8. 42. fig. 3.

Habitat ad Cap. b. Speitz

Fruticulus, rami parvis erectis simplicissimis glabris teretibus. Folia
unquiculana, distantia erecto patentia sessilia leviter basi
nonn. decurrentia glabris denticulo uno alterove minuto, remoto.

Spec. ad apices ramorum tres vel quatuor alternis approm-
mato ^{imbricato} bracteis subulata calycis longioris apice
incurvo. Tubus corollae filiformis bracteis ^{triplo} ~~duplo~~ longior

am. acad. d. wesa
vix a *repunceloides* d. wesa

Colicinea s. *Spica corymbosa*, foliis inferioribus linearibus integerrimis, superioribus lanceolato-fimbriatis subdentatis Lin Am. acad. 6. p. 892. 1754
Habitat ad Cap. b. p. p. i
Similime *S. rapunculoidi*, sed folia crassiora, glabra, inferiora minime dentata. Caulis plures pedales simplicissimi. Flores saturatissime purpurei; externa corolla lacina major
Lin.

non vidi

Triquetra L. *specis* terminalibus *foliis* *Triquetris* *imbricatis* *recurvato* *reflexis*
glaucis *lin. suppl. pag 284. L. V*
Habitat ad B. b. specis

non vidi

hispida L. fructu terminalibus; foliis linearibus sparsis reflexis hispida. Linn.
Suppl. p. 284. L.V. pag. 568.

Habitat ad Cap. b. spici

Rami sparsi vel 4 aggregati superne ramulosi uti folia et calycis hispida.
Folia sparsa frequentia ^{sumus} approximata, vix peniungiculanis. Spica
~~reflexa~~ ad apicem ramorum pollicares flores conferti. Bractea filulata
longitudine calycis. Calyx valde hirtus fl. corolla calyce longior

Polygaloides L. spicis terminalibus, bracteis calycibusque. Earinatis, foliis linearibus glabris margine reflexo etc. Suppl. puz 284. N. p. 568.

Habitat ad Cap. b. p. 5.

Præmi texter e cap. foliorum cæcitate subdentati. Solia præsa
frequentia unguiculata basi per ramum parum decurrentia integerrima.
Spicis ad apicem teras vel laterales brevioris, b. b. / tri
pollinones bracteis ovatis acutis floris approximatis patentibus
calycis bracteis longioris. Tubus corollæ calyce longior.
Ino + ex multis foliatis vel rami ad apicem plures spicis qui

fruticosa s. capitata subrotunda terminalibus, foliis sparsis linearibus obtusis
integerrimis, caule fistuloso Lin. Mart. III. & R.V. p. 560.

Habitat ad Cap. b. p. 5

Fruticosa altis ramis inaequalibus. Folia lineana obtusa parva inaequa
lia integerrima sparsa, conferta, nuda. Capitula subrotunda,
terminalia, sessilia. Lin.

involuta L. foliis lanceolatis oppositis dentatis herbis spicis capitatis sub

compositis involutis

Habitat in P. b. p. r.

vel pithamou

Caulis simplex herbaceus palmari erectus. Stems pilis albidis herbis

Folia sessilia pollicaria remote dentata. Pedunculo ad apicem

4 or 5 fastigiati subumbellati folium lineare sub pappulo
pedunculo. Capitula magnitudine pappi. bractea lineari

genus dubium a Thuaberg. sub nomine Selaginosa

verbenaica L. spica fasciculata, foliis oblongis glabris, caule tetragono rectangu-
lo Lin. Suppl. pag. 205. L.V. pag 669.

Habitat ad Cap. b. p. 5

Caulis glaber, acute tetragonus, ramifus: Rami alterni structura caulis.
Folia alternis fasciis glabra superne dentata. Spica ad apices
ramorum tri vel plures alterni, unguiculatae & bracteis patentibus
squamose imbricatis. bracteis angustissimo subulatis deliquescentibus
bracteis breviores laciniis subulatis

foliis lanceolatis glabris superne serratis
caule ramis acute tetragonis

ciliata L. floribus spicatis, foliis ovatis ciliatis acutis Len. Suppl. pag. 285.

N.

Habitat ad Cap-speci

non vidi

rotundifolia L. composito, foliis ovatis glabris obtusis Lin. Suppl. p. 205
L.V. pag. 560.

Habitat ad Cap. b. p. 5

Caulis ramosus e cap. foliorum tuberculatus: rami prostrati, teretes, superne pubescentes. Folia frequentissima oblongo-subrotunda basi petiolum brevissimum acuminata, integerrima vix semi unguii ciliata, subimbricata, raspi sicula avenia enervi. Pediculi ad apicem ramorum foliosi, fastigati. Bractea oblonga condura florei conferti bractea longior.

fasciculata L. corymbo multiplici, foliis obovatis glabris serratis Lin. Mant
pag. 250 * S. V. pag. 568

Habitat in Cap. b. frei montibus * 754

glaber: ^{Caulis simplicissimus bipedalis} rami e linea utroque a basi folii decurrente angulatis
folia frequentia simplicia ~~crassifolia~~ ^{crassifolia} ~~semicircularia~~, angulata
serrata erecto-patentia superiora acutiora. Spica ^{superiora}
copiosi fasciati ⁱⁿ corymbo dens. Bracteae lineari lanceolatae
ae calycis congruae. Calycis lacinae pubulatae

Ternata
Nigra

speci corymbosi
sol corymbis multiplici, foliis lanceolatis serratis glabris sessi-
culis sub recurvatis Berg. f. cap. pag

onopordi lanceiformibus dentatis serratis

Habitat in cap. b. speci Daldorph

maxime affinis S. fasciculato an modo variat ex siccitate
nigra. Caulis glaber angulatus. Sola paululum decurrunt
pollicaria sessat avena ^{frequentia} acuta basi respiciant
angustata. Pedunculi superne frequentes in eorum hum
hemisphaericum latitudine fere manus fastigiat folis
li. Specie sequi pollicariae bractea lanceolata acuta
Covillo tubi bractei longior

hista S. hista, spec. longispinis, foliis obovatis Lin. suppl. pag. 285.

L.V. pag. 560.

Habitat in Cap. b. spec.

non vidi