

# Kelenum

1. sylvestre S. radice gafififormi multiplex, stylis exsertis, corollulis exsertis,  
caule lori
2. palustre S. radice unica fibula testacea
3. monnierii S. umbella congesta, in volvulo univexali reflexo, perianthes cassis  
quingue membranaceis
4. austriacum S. caule striato sulcato, folioli ovatis exeris
5. carpfolia S. caule sulcato angulato, in volvulo univexali exarido, stylis coe-  
si, petalis conniventibus
6. Chabréi S. vaginæ foliorum plani flaccidi pendulis caulinis pennatis penitus  
multifidis lanceolatis
7. pyrenaeum S. caule simplici, involvulo univexali nullo, umbellis per radicem  
inqualibus.
8. fibricum S. foliis triplinatis, involvulis utrisque exaequophyllis membrana-  
tibus

*sylvestre* L. radice fasciforme multiplici, stylis erectis, corollulae expletatis lin  
Suppl. 180. Ed. V. p. 278. \*

De Dan. 257. Gaéque 2. v. 152.

*Typhelium plinii* Lobel. Hist. 409 Monsp. hist. 3. p. 319 f. 9. t. 17. fig. 2.  
*Apium sylvestre*, lacteo fulvo turgescens Baum. pun. 153.

Habitat in Hayynca, Gallia 4

Caules numerosi 4-7. pedales leviores nec rotundati pro basi purpure  
scintentes. folia multiplicitate-pennata foliolis linearibus.  
Involucra 8-12 phylla semina foliis 3 elevatis obtusis  
approximatis

---

caule leviori

nun verdi

palustre s. sublaetescens; radice unica Lin. S. V. Mant. 353.

Sepeli palustre laetescens Baub. prodr. 85. p. n. 162.

Habitat in Europa septentrionalis paludibus.

Quale eredita<sup>re</sup> ~~in~~ <sup>luteo</sup> luteato angulatur glaber. folia quadripunctata  
la pumpe et ciso planis testiculis exvenibus lencani canicola  
latus subratigni terminali trifida cum superiore minor  
composita umbelle terminali involucrum polypyle  
cum folioli lencani canicola alternata

~~differentio de~~ <sup>per h. t.</sup> ~~panam vales ut et differentia~~  
<sup>per</sup>

monnierii s. umbella conferta, involucre universali reflexo, seminibus costis quinque membranaceis Am. Acad. 4. <sup>Pac. que hot.</sup> Tab. 62.  
p 269 4

Habitat in Gallia australi O.

Pauli bipedalis. Folia bipinnata foli pennis <sup>rennatis</sup> ~~pennatis~~ integrifida

Caeruleus linearibus integerrimis. Involucella petacea.

Sæcæs Seleni palustris.

zeltiacum s. caule fruto sulcato, folioli ovatis incisi s. v. 4474

Taegue fl. aust. v. 1. t. 71.

Selaginum argenteum Crantz. Austr. Tab. 4. fig. 2.

Habitat in aperto herbito Austria et Pedemontia 4

Paulio 2-3 pedaliis spicis simplici articulis. sole radicibus dupli-  
nata caerulea bipinnata glabra subtus pubescens. pennis  
radicalibus obovatis incisis profunde serratis caerulea  
suprema bipinnatifida omnia mucrone alto terminata

*carvifolia* L. caule sulcato angulato, involucro universalis evanido, stylis  
erectis, petaliis conniventibus Lin. Suppl. 100. L. V. p. 270 \* Jacq. auct. 16.  
Lamant 353.

*Carvifolia* Baeh. p. 158.

*Selinum foliolis pinnatis laevis* Gmel. fib. 1. p. 204 T. 40.

*Selinum palustre carvifolia* Caule sulcato ex utangulo, involucro  
universalis caduco, petaliis fructibus reflectis his sp. pl.  
pag. 3504

Habitat in Sibiro campis inque Dania et Germanica 4

Caule sepe quadridaldo bi. f. tripodalio erectus <sup>angustis</sup> membrana  
rare profunde sulcatus membranis tenuibus <sup>albidis</sup> angulatus

*padi clavifluti*: Folia bipinnata pinnis trifidi basi attenuatis vel lanceatis  
pennatae undivisi. Semina ovata sulcis elevatis tribus compresi  
ut in *Laportetis* folia pinnata omnes apice <sup>in</sup> zone  
albo

Decipiens Selenum caule lignoſe inferne nudo, foliis inferioribus bipunna-  
tis; pinnulis lanceolatis integris interoque ferratis Schrad.  
Festu Hanovr. fasc. p. 23. t. 13.

Habitat 5

non id

Phabrois. vaginis foliorum caulinorum planis flaccidi penduli L. V. p. 279  
fl. auct. 1. 7. 72.

Habitat

sola glaberrima. Raute subtilissime striata - teres simplex  
2-4 pedalis. folia pedalea pinnata pennis opppositis  
tripartiti multifidis linearibus planis caerulea superiora  
minus diversa sepe trifida superma pennis indutis. Semina  
luborata et compressa triis 3. elevatis margine membrana  
cæa

— caule Vereti lori

*pyrenorum* s. caule simplici, involucro universali nullo umbellis festuca  
inqualiteri Gouan illustr. p. 11. p. 297.

Parvi alpinis foliis Baet. prot. 84. Monf. h. 3. f. 9. t. 9. fig. 2.

*Safeli pyrenorum* foliis duplicito pennatis foliolis incisis acutis  
involucris foliacis umbella corymbis lvs. spe.

*Pyrenum* Gouan.

Habitat in Pyrenia

foliis erectis basi purpurascens sequipedatis latifluis.  
le penoro <sup>ad</sup> pennata plenimur ramos usque. Solea tripenata, foliolis linea  
rennis pinnatis in lanceolatis confluentibus, intaginis trifidis aut trifidissimis  
<sup>D 3</sup> pennata pennis carnis meles) soleolum setaceum pub  
umbella. Involutella 17-18 foliacis. Flosca ovata margi  
ne membranacea, costis in dorsi tubus Gouan

Selectus *S. pyren.-et hinc reproductus*

fibricum. s. foliis triplinatis involvens utique enneaphyllis  
membranaceis Rete obf. 2. p.

Habitat in Siberia

Paulus Tripedalis fistulifer stratus glaucus - penno penno  
ein laevigatae caeruleis linea rubris remotis infemis longis  
rubris pectiniformis radicibus subquadripartita vegeta  
na brevi margine lato membranaceo involvula  
cunea lanceolata. Semina cotta tribus poster mar  
genales

an potius ligustrinum

Lequerici L. involucro univerſali nullo, pedicelli durans' atſimis <sup>in</sup> Sappd. 179. p. L. V.  
May. 279. Tact. 44. Holl. Tab 61.

Ligusticum alpinum perenne, foliis glabris, floribus albis Leggi. Veron. 2. p. 41.

4.13.

Habitat in Gallia

Selenum ex host. Panj  
similes carpalia at ali membranaceo prope in rami - foliolis  
mucronata det. Desfor

Selen dwanicatum Banty.