

Sempervivum

1. abotum s. caule arborescente lavi, ramoso, foliis cuneiformibus glabri  
ciliatis: ciliis patentibus patulis mollebus
2. canariense s. caule frutescente, foliis orbiculato-spathulatis villosis,  
nectariis subquadratis truncatis.
3. glutinosum s. caule frutescente, foliis cuneiformibus viscidis ciliatis:  
ciliis cartilagineis adpressis
4. glandulosum s. caule frutescente, foliis orbiculato-spathulatis margini  
glandulosis: glandulis globosis, nectariis cuneiformibus  
truncatis
5. tettonum s. foliis ciliatis, prope marginibus patulis, floribus dodecandris  
dodecaygynis, nectariis cuneiformibus canaliculatis
6. globiferum s. foliis ciliatis prope marginibus globosis floribus dodecandris  
hexapetalis
7. nictum s. caule nudo, petalis dorso margineque ciliatis, petalorum  
hexapetalis
8. villosum s. foliis spatulato-cuneiformibus obtusis villosis, nectariis  
palmatis: laciniis subulatis
9. tomentosum s. foliis obovatis subtus gibbis villosis, nectariis bilobis

10. arachnoideum L. foliis pelis intertextis, propagibus globosis

11. montanum L. foliis integerrimis, propagibus patulis

12. difforme L. foliis prostratis inferioribus verticibus, superioribus depressis,  
caule basi repente

13. monanthus L. foliis verticibus clavatis confertis, pedunculis nudis,  
tubum floris, nectario orbiculatis.

12 pediforme L. foliis parvis inferioribus - Verticibus superioribus depressis  
Lin. P. V. pag. 456. Jacq. hort. 81. <sup>antes</sup> floribus.

Habitat

herb. musc.  
Tota glaberrima. Caulis teretes basi repentes ascendentes  
ramosi. Folia glauca, interdum rubentia lanceolata  
acuta inferiora magis teretia superiora magis depressa  
in junioribus ramis confusa. Cymae densae terminalis

Folia 6. 7. alba. Jacq.  
Caulis sub terra repentes, ascendentes, basi interdum approxi-  
matis ramosi, semipedales. Folia inferne frequentior, superiora par-  
viora semipollicari

caule basi

repente

63 Monanthes L. foliis teretibus clavatis confertis, pedunculis nudis, subuni-floris, nec  
datis obcordatis Hort. kew. 1. p. 149  
Habitat in Canariis 4

non vidi

Stellatum semper visum caule herbario pubescente foliis spatulatis sparsis .  
Len. Trans: 1. p. 251

Sedum petrosam rotundifolium, flore luteo stellato montis Baldi  
Segu. Veron. vol. II. p. 360. t. 17.

Habitat in monte Baldo ☉  
pubescens. flore lutei flavi

1. arborescens. S. caule arborescente Linn. Cen. S. V.

Sedum majus Cryptum Claph. bot. 2. p. 50

Sedum majus arborescens, floribus candidis Bauh. pin. 202. Brod.  
Juss. 4. p. 1. 31.

Habitat in Lusitania, Caeta, Conyza, Zairaitho.

Paulis teretibus cicutis uti ramis, glabris aphyllis.  
Folia in apice ramorum cuneata ciliato-ferulata  
mucronata panicula terminalis, pedunculis partibus  
lobis bifidis glabris uti flores flavi

Differencia ex Hort. Kew. pag. 147. T. 2. quafita

2 cananense, L. caule foliorum videribus laevibus, foliis setosis L. S. V  
Sedum canariū, foliis omnium maximis Com. hort. 2. p. 109. V. 75  
Sedum majus canariū ac aulon, pubis ad oras foliorum hispida  
Ratn. alm. 340 V. 314. fig. 1.

Habitat in Canariis  
Caulis teres, ciliis rami ciliati glabri. folia in apice  
conferta in rosetam expansa cuneiformia ciliata serrulata.  
Cyma bifida racemosa alterno flore flavi.

Differenter ex hort. New 2. p. 197. Defuncto

non videtur non videtur

ca glutinosum Simp. caule frutescente, foliis lanceiformibus oppositis ciliatis:  
ciliis cartilagineis adpressis Hort. kew. 2. pag. 147.

Habitat in Madeira

Petala lutea 8-9. Stamina 16-18. Pistilla 8-9.



49 glandulosum s. caule frutescente, foliis orbiculato-spathulatis margine glandulosis: glandulis globosis, nectariis cuneiformibus truncatis Hort.  
New. 2. p. 148.  
Habitat in Madera 5

non vidi

4 *Tectonum* l. foliis ciliatis, propaginibus patulis Lin. l. V. - Fl. Dan tab. 601

*Perovium* majus attenua f. *Barbajovis* Dod. perov. 127.

*Sedum* majus vulgare Bauh. pin. 203.

Habitat in Europa Tectis et collibus 4

Folia propaginum in rofam collecta ovato-lanceolata, ciliata  
glabra Paulis pedalis erectis simplicibus pinnatis pilosis foliis  
alternis lanceolatis. racemi superne altero uti calycis  
a latere superiore vel secundi pilosi.

Differentia ex H. Kew. 2. p. 148 Defamtu

*Sedum globiferum* l. foliis ciliatis, propaginibus globosis Lin. L.V. p. 455 x

Paup. fl. austr. s. app. 50. t. 40

*Sedum vulgari* magno simile Bauh. hist. 3. p. 600

*Sedum majus vulgari* simile, globosis deciduis Monf. hist. 3.  
p. 472. f. 12. t. 7. fig. 10.

Habitat in imperio Rutheno, Austria &

Caulis palmari, vel spithamei pilosus. Folia lanceolata frequenter sessilia. Cyma bifida cum flore pedunculato in dichotomia. Rami bifidi flores plurimae ciliati flavae. Calycis Calyx hemisphaericus in lacinas aequales 12. 20 petala 10-30 12. 20. linear lanceolata integra, calyce triplo longiora flava, patentissima subtus villosa, ciliata basi pubescentia. ~~folia lanceolata ciliata~~

*Thesium l.* caule petalorumque apicibus hirsutis in l. l. pag. 486 & Am. acad. 47.  
p. 27. ~~Thesium~~ fl. austr. 1. p. 10. 4-12.

*Cotyledon altera montana* Clus. hist. 2. p. 63.

*Adum majus montanum*, foliis dentatis Raub. pin. 203.

Habitat in Tauro raptadueasi &

Caulis digitatis in culta spitha moris ylabror. foliis lanceola-  
ta sessilibus ciliata unguiculata Calyx foliolis feris  
lanceolatis ciliatis. Petala 6 octolevia calycis duplo  
longiora linear lanceolata margine et dorso ciliatis  
erectiora quam in reliquis

caule hirsuto, petalis dorso margineque ciliatis

o villosum l. foliis spatulato lanceiformibus obtusis villosis, neotariis palmatis  
lacinulis subulatis Hort. kew. 2. p. 140

Habitat in maderia o.

Petala o. flava. Stamina 12-16. Pappi o.

Caules erectus simplex digitalis villosus uti pedunculi et  
calycis. Pedunculi superne alterni biseptidi flores par  
vi

9 *Votheofium* P. foliis obovatis subtus gibbis villosis, nectariis bilobis Hort. Kew. 2  
pag. 148.

Habitat in Canariis

Petalis 5 flava - Stamina 16 - Pistilla 2.

non vidi

10 Arachnoideum l. foliis pelis intertextis, propaginibus globosis Lin. l. V. p.  
4567 Paq. fl. austr. 5. app. p. 51. tab. 42.

Pedium montanum tomentosum Bauh. pin. 204.

Sempervivum rubrum montanum gnaphaloides Col. Equis. 1. p.  
292. f. 291.

Sempervivum foliis radicalibus in globum congestis: vellis reti-  
culatis connatis Hort. Cliff. 1007

Habitat in Alpibus Italiae, Helvetiae, Pyrenaeis &

Caules digitales vel palmares pelosi sicut uti folia propagi-  
num. folia ut in reliquis. Cyma bifida. varietas forte  
montani.

4 montanum l. foliis integerrimis propaginibus patulis Len. bot. p. 456  
Laeq. fl. austr. app. 50. t. 41.

Sedum minus flore rubente Best. syst. ven. 6. t. 0. fig. 2

Sedum alpinum, rubrum magno flore Bauh. pin. 204

Sedum majus montanum, foliis non dentatis, floribus rubentibus.  
Bauh. pin. 204

Habitat in rupibus Helvetiae 2

folia propaginem patentia absque ciliis. Calyx 12 fidiis.  
Petalis pallide roseo lanicolata attenuata et his villos

12. ad. 24.