

Senecio

rupesinis Senecio

Habitat in Hungaria

etate

bitripolliciana

Caulis erectus angulatus glaber ramosus. Folia sessilia pinnate
bifida pinnis interioribus minoribus exterioribus lanceolatis inaequa-
liter dentata obtusa apice tri-dentata supra glabra subtus raris
villosa et villis crispis. Pedunculi superiores tri- & triflori glabri
foliis lanceolatis subsingulis. Squama nonnulla ad basin calycis.
Palyx glaber apice spicatus. Corolla magnitudine Senecionis
parvae. Radius patens

Quinquangulatus Senecio glaber, foliis petiolatis lato lanceolatis aequaliter serratis,
caule subquinquangulato, flosculis radii subquaternis
Habitat in America meridionali ad von Rohr

Caulis herbaceus, erectus, caespitibus perno cyneo, are glaber, quinquan-
gulatus; angulis acutis, perispermis.

Folia petiolata, alterna, frequentia, pithamisa, versus apicem mucro-
sa, lato-lanceolata, attenuata, basi apiceque acuta, aequaliter
serrata: serraturae apice cartilagineae, basi versus integerrimae, gla-
bra, venosa, subtus perispermis pallidiora, supra nitidiuscula; junio-
sa supra sublineata.

Petioluli unguiculares, subtus carinati, supra canaliculati.

Radunculi ex ala suprema caulis et ex apice ramuli adjacentis, foli-
tanti, semipedales, erecti, alternatim ramosi: rami remoti, basi folio
lanceolato, ^{obtusiusculo} ~~in~~ ^{tripollicari} ~~tripollicari~~, ^{super} ~~super~~ ^{versus} ~~versus~~ ^{apicem} ~~apicem~~ ^{minus} ~~minus~~ ^{bre-}
^{viore} ~~viore~~. ^{Floris} ~~Floris~~ ⁱⁿ ~~in~~ ^{corymbo} ~~corymbo~~ ^{composito} ~~composito~~ - Bractea linearis lanceolata,
subramificationibus. Pedicelli ultimi filiformes, inter duos semi-
unguiculares vel breviores, adpressi squamis nonnullis alternis linea-
ribus.

Calyx calyculatus: exterior squamis 4-5-linearibus, brevis pinis: interior
pentaphyllus: lobuli lineari-oblongis, obtusiusculis, vix unguicula-
ribus, apice subdorsalibus.

Flosculi circiter decem in singulo calycis, radii regulati 3-4.

Pappus albus

(Sen: doucicum differt foliis inaequaliter serratis
Sancenicum foliis subsessilibus inaequaliter serratis
nemorensi serraturis alternis minoribus
montanum caule tereti.

55 Diffusus Senecio foliis bipinnatis linearibus, caulis diffusis Lin. Suppl. p. 371. S. V.
pag. 758

Habitat in Cap. bono spei
vulgatissimus loco et facie

non aridi.

16 emicifolius Senecio foliis pennat. fideis dentatis sub hirs caule erecto.

1 Jacintha marina Dodon.

Jacintha incana altera Bauh. Pin. 131.

Senecio jacintha flandrica incana Lob. illustr. 76.

2 Jacintha adempta foliis radice repente Vaill. art. 566.

1 Jacintha incana repens Bam. Fi. tab. 153.

Abata in aggentibus Europa temperata

Caulis ramosus, humilis. folia linearia herb. Fus.

~~aggentibus~~
ad huc illustr. eget.

edit la marth

50 *Jacobaea Senecio foliis pinnato lyratis: laciniis laciniulatis, caulis erecto* Lin. S. V. p. 758.
Fl. St. Jacobi Brunfels. Duchf.
Jacobaea vulgaris Clus. h. Bauh. h. 2. p. 1057.
Jacobaea vulgaris laciniata Bauh. Pin. 176.

55. *Jacobaea vulgaris flore nudo* Monf. h. 3. p. 108. Raii. Angl. 2. p. 82.
Jacobaea vulgaris laciniata, flore difformis Vaill. Act. 1720. p. 383.
Habitat in Europae partibus humidis &

Caulis striatus. Folia amplexicaulia ^{sub} pinnata vel pinnatifida pinnis
laciniatis vel dentato incis. Rami superiores simpliciter ^{ad} ^{apicem} ^{superioris} ^{partis} ^{caulis}
aequales, foliis pinnatifidis. Flores corymbosi pedicelli adpressi squamis
minutis. Squama nonnulla ad basin calycis foliola calycina ^{apice}
sphaerulata.

57 aquaticus Senecio foliis dentatis radicalibus ovatis caulinis pennatifidis; laciniis exte-
ma majora Hudson: flor. Angl. pag. 366.

Jacobaea latifolia L. Clus. Bauh. h. 2. pag. 1056.

Jacobaea alpina laciniata flore Puythelmi Bauh. Pin 131

Habitat in pratis et passivis humidis &

Caulis pedalis et ultra basi purpureo-feni, simplex. Folia radicalia et inferiora petio-
lato, ovata, obtuse dentata. Superiora lyrata ap. amplexicaulia lyrata
pennatifida laciniis extrema ovata dentata, laterales lato lineares
obtusae subdentat, suprema laciniis omnibus lanceolatis, dentatis
subtus subtomentosi. Peduncululi superne ^{in pedicellis glaucis diors} ~~ramosi~~ apice cum basi caly-
cis tomentosi. Pedicelli apice crispiores foliolo unico subulato in
medio. Squama calyculi stracci parvi. Calycis glabra ovato lanceolata
margine submembranacea apice vix sphaerulata. Flores majores
quam in Jacobaea

59 tenuifolius Senecio foliis inferioribus subcuneatis dentato-incisis; caulinis pinnatis
pedis linearibus.

Senecio tenuifolius corollis radiantibus, foliis omnibus pennatis pinnis
linearibus, pedunculis corymbosis. caule erecto Fl. a. S. V. p. 750. Fl. Austr.
3. tab. 270.

Habitat.

Caulis erectus pedalis, simplex perperaspiens. Folia glabra inferiora
in petiolum attenuata, ~~obtusis~~ ~~obtusis~~ dentato-incisa. superiora
amplexicaulia, pinnis linearibus integris vel ~~obtusis~~ laciniis uni-
ca. Flores corymbosi ⁱⁿ simplici. pedicelli squamosi. Calycis sphaerice
cati

241 *Cynodes Senecio* ^{inferius lyratis superiusque} foliis amplexicaulibus ^{dentatis} lyratis ^{truncatis} mucronatis

Senecio lyratis peloponnesi, conillis radiantibus foliis inferius lyratis ~~dentatis~~ ^{truncatis}, supremis
truncatis amplexicaulibus: lobis margine mucronatis An suppl. p. 369. l. V. 757.

Habitat in Cap. b. spei

Inter altissimas. Caulis herbarius sulcatus simplex purpurascens vix peloponnesi
folia digitata non modo ad marginem mucronata sed per totam ^{marginem} paginam
superiorem, subtus lœvia venosa, dentibus mucrone terminatis Corymbus ter-
minatus flores parvi squamula nonnulla ad basin calycis, Calyx glaber
purpurascens. Flores flavi

60 aureus Senecio foliis crenatis: inferioribus cordatis petiolatis; superioribus pennatisfidis lyratis.
Linn. S. V. 750. Gronov. Virg. 176.

Jacobsa virginiana, foliis imis Alliano glabris; caule scabro bastano Morf. h. 3. p. 110.

Raii suppl. 100.

Habitat in Virginia, Canada modis umbratis &

affinis maxime Jacobsa. Caules plures ^{oblonga} erecti simplicissimi pedales; glabri
Folia radicalia ^{oblonga} cordata ^{oblonga} etiolata, crenata, altero latere interdum
brevis pollicaria. Caulena amplexicaulia pennatifida laciniis
oblongis apice dentatis, extrema ovata serrato dentata laciniis vix
confertioribus longioribus ^{regularibus}. Pedunculis axillis superioribus
et terminalibus, simplicibus vel trifloris ^{regularibus} inaequalibus apice sub
squamosi. Calyx simplex ^{superius}

3495. auriculatus Senecio corollis radiantibus, foliis lanceolatis lyrato-pinnatis ^{dentatis nudis}, petio-
lis auratis Tab. XVIII

Senecio lyratus; corollis radiantibus, panicula corymbosa, foliis lanceolatis,
lyratis, amplexicaulibus, dentatis. Boiss. def. pag. 148.

Caulis erectus, inferne ramosus. Rami sulcati, glabri.

Folia ~~altissima~~, petiolata, remota, omnia lyrato-pinnata, glabra, lobis
acuta, inaequaliter dentata, sequi pollicaria: Cocinia ultima maxi-
ma cordato-lanceolata, lateres utrinque uno vel solitarius, oblongo
basi parum angustiores, remote dentata.

Petioles foliis multo breviores, basi utrinque auricula rotundata,
dentata.

Corymbus ~~paniculatus~~ terminalis: squama subulata ad basin cuiusque pedunculi, 2-3.
minores in pedicellis.

Pedunculi glabri, plerumque triflori, ultimi uniflori.

Calyces simplices, intatti.

Corolla radiata; radius patens 8-10 florum. Colch.

a Sen. lyrato differt foliis omnibus ^{nudis} diversi, margine lobibus. ab alpino
differtur foliis lanceolatis, calycibus simplicibus intattis.

62 alpinus Senecio foliis cordatis lyratis grosse serratis, petioli auritis Lin. Suppl pag. 371*. S. V. pag.
750.

Habitat in Alpibus helvetia 4

Caules herbari striata angulatus, erectus; simplex, ^{bi}pedalis et ultra, superne ramosus in
paniculam corymbosam. Folia petiolo remota cordata, suprema ovata lyrata, grosse
serrata, obtusiuscula, subtus incana, venosa. Petioli longitudine foliorum, in
mediis foliaceis binis si quaternis, ut in Enys. Barbara. Corymbi terminales et axil-
lares solitarii, longius pedunculati. Pedunculi proprii adpressi squamis minutis
pubulatis. Calyx calyculatus aequalis, sphacelatus apert. Corolla lutea s. faucea.
Variat in terra fedeli. Rostorum caule multo ramoso, foliis laciniatis, ac si olea esset
planta Lin. Suppl. l. c.

64. trifidus Senecio foliis radicalibus aggregatis cuneiformibus specie trifidis, capite squamato unifloro
Habitat ad fretum Magellanicum
Rarita via digitalis glabro. Capus versus apicem squamis lanceolatis 4-5. Calyx calycula
trifidus. Folia crassa.

65- *linifolius* Senecio foliis linearibus integerrimis, corymbo subpinnatis, caule herbaceo Len Spec.
pl. pag. 1220. * P.V. pag. 758.

Linans aureo affinis Bauh. Prodr. 107. Pin. 213.

~~*Linans linifolia*~~ Hispania et Italia Boer. mus. 2. p. 60. t. 49. Barrel Ic. 302.

Solidago foliis linearibus integerrimis, corymbo simplici Hort. Cliff. 410.

Habitat in Hispania Italia &

Pedunculis squamis minutis acutis adpressi. Calyx senecionis licet non pphacelatus hic
hec.

Caulis erectus, striatus, teres, glaber, ramifus. Folia frequentia, pollicaria, linearia
intantum linear-lanceolata, glabra, crassa. Strake rudimenta ramulorum in axillis
inferioribus. Corymbus terminalis, simplex. Pedunculi foliolis nonnullis petalis
Calycis squama intacta herb. fusc.

Caulis frutescens ramifus. Folia frequentia linearia, sparsa, crassifolia, glabra
integerrima, pollicaria. Corymbi terminalis, simplex. Calyx calyculatus: foliola
linearia intacta herb. Desfont. forte alia planta

~~Alban & Cap. Boer. spec. misit Thunb. Caule digitali, unifloro, ax. diviso~~

non vid.

Capillatae. S. foliis linearibus caulibus simplicissimis unifloris.

Habitat in cap. b. frei.

Delphinium foliosum L.

66 Veret. folius Senecio foliis filiformibus int. egerrimis, caule fruticoso

Habitat in Cap. bono spero

Ramosus, ramis teretes glabri. Folia pinnata integra, filiformia, Veretina
pollicaria. Flores ^{pauci} corymbosi terminales. Pedunculi proprii triflori
pedicelli pollicares, a medio ad apicem squamis setaceis adpressis. Calyx
simplex fuscus

67 Filifolius Senecio foliis filiformibus integerrimis caule herbaceo

Habitat in Cap. b. frei

Caulis herbaceus erectus simplicissimus striatus. Folia sparsa remotiuscula sesquipedalia glabra. Pedunculi aliquot ad apicem 6. 7. fastigiati, simpliciter basi bracteali subulata, superne adpressi foliis striatis. Calycis brevis foliolis paucis inaequalibus glabris.

60 longifolius Senecio foliis linearibus integerrimis parvis ^{glabris nudis} Caule fruticoso Lin. S. V. pag. 759

Jacobsa africana frutescens, lavandulo folio latiore et angustiore
Dommel. Hort. 2. p. 141. t. 71.

Jacobsa africana, folio capillatissimo: Herm: agr. 14.

~~Jacobsa aethiopia bayuldiifolia et prolongifolia.~~

Jacobsa aethiopia, lavandulo folio Breyn. cent. tab. 63.

Jacobsa africana frutescens, oblongis foliis angustis integris incanis Volk
non b. 224.

~~Habitata Cap. bonoifrei~~
Senecio longifolius corollis radiatis, foliis linearibus parvis, caule
fruticoso Lin. S. V. p. 759

~~Habitata Cap. bonoifrei~~

Stipes glaber sulcatus ramosis. Folia sessilia digitalia, rudimenta
ramorum in axillis corymbi compositi terminalis. pedicelli foliolo
uno alterve. Squama nonnulla laxa ad basin calycis. Calyx
glabri cylindrici. flores flavi

64 rosmaninifolius Senecio foliis linearibus integerrimis revolutis cauleque tomentoso et fruticosa
floribus compositis

Senecio rosmaninifolius corollis radiantibus, foliis linearibus margine revolutis, caule
fruticosa hic Suppl. p. 750. Faerq. Coll. 1. p. 135.

Habitat in Cap. bono spei

Caulis ^{et plures} uti tota planta tomentosa, lanata etate glabra. Folia prope, bipollicaria
Corymbi terminalis compositi

70 *Linearis Senecio* foliis linearibus integerrimis carnosis, pedunculis solitariis unifloris,
caule herbae

Habitat in Insula Rodriguez

Planta palmaris, glabra. Caulis simplex folia sessilia linearia utrinque attenuata.
Pedunculis solitariis lateralibus vel terminalibus apice superne fissis
mox. Calyx calyculatus.

11 denticulatus Senecio foliis linearibus sparsis ^{glabris} revolutis denticulatis, caula fruticosa.

Habitat in Cap. b. spec. 7.

Caulis puberulus. Folia sesquipedalana ^{si} similis rosmarini foliis et margini minute
denticulatis. Flores compositi. Pappi alii squamosi. Calyx calyculatus squamis plures
concolorato.

Senecio foliis linearibus^{ibus} planis integerrimis glabris, caule fruticoso

denticulata β.

*Folia inferiora denticulata
ulterius describenda, fo. 1^a specimen in perfectum*

73 angustifolius Senecio foliis linear lanceolatis dentatis integrisque, caule fruticoso

obscura adhuc
Specimen herb. nil valet

~~Enicratus lanecio foliis linearibus subtus tomentosis, inferioribus apice dentato cuneatis, superioribus integris basi subdentulatis~~

Enicratus lanecio ~~Enicratus~~ corollis radiceantibus, foliis linearibus subtus tomentosis, inferioribus cuneatis, superioribus integris Len Suppl. p. 371. t. V. 759.

Habitat in Cap. bono spret.

~~Similis refmanii foliis tomentosa etate glabra, et foliis crassiora margine non reflexa basi dilatata amplius semiamplexicaulis subdentulata, et moliora singulari foliis rigidis, mucronatis, versus apicem utraque semidentatis: dentibus cum foliis apice aequalibus Len.~~

75 Juniperinus Senecio fruticosus, foliis subulatis Len. Suppl. 371. * S. V

Habitat in Q. b. frei f.

Stipitulus sesquipedalis, determinate ramosus, tereti usculus, lavis. Folia parva, latius subulata, juniperi similia, sed paulo latiora, semi amplexicaulia, palli-
cana, catenibus revoluta, lavis, mucronata. Pedunculi terminales elon-
gati, apice floribus quatuor s. quinque. pedicellis divaricatis. Flores lutei
radio expanso Len. C. c. Suppl.

^{tricus}
^{integerrimis}
 incumbens. Senecio foliis lanceolatis revolutis glabris im tricus glabris.

Habitat in Insula Bourbonica ^{tuberculato}

Rami glabri e capite foliorum mucronati. Folia sessilia basi tuberculato sub basi & tuberculato, lanceolata, parva, sex nervi at angustiora acuti apicula, conferta incumbenda, crassa. Cormibus terminalis compacte Pedunculus foliolis lanceolato ad ramificationes. Pedicelli squamis nonnullis carnosus versus apicem. Calyx cylindricus Radix solum flosculis flavis subhis purpureo-fulvis.

77 Corsis

Senecio foliis lanceolato linearibus medio denticulatis glaberrimis lobis

Habitat in Insula Franco Thaur Compositis

Rami lignosi glabri. Folia linearia ^{angusta} lanceolata,

medio denticibus 3-4 parvis notata, pollicina remota. Petiolus basi latior amplexicaulis. Pedunculi 2-3 ad apicem simpliciter squamis aliquot saecis adpressi. Calyx simplex basi subsquamifolius.

Corolla radiata radio patente

ciliatus Senecio foliis lanceolato-linearibus ciliatis, caule piloso
Walt. fl. carol. pag. 208.

Habitat in Carolina pag. 208

flor. radiati

rem. ord.

78 ¹³ Sophoclesi Senecio foliis lanceolatis sessilibus remote denticulatis subtis villosis, calycibus intactis

Habitat in Arabia: Soph.

Affinis nemorensi foliis remote denticulatis, supra etiam anethoideo lanatis etate
glabris, supra lucida etiam non glabris. Rudimentis ramorum et omnibus articulis

caule duri.

Calyx calyculatus intactus. Folia ramulorum revoluta, integerrima.

79 ~~notatus~~ Senecio foliis lanceolatis serratis ^{glabris} cuneatis, auriculis subtripartitis
Habitat in Gopela Bortonio Thoui Commeson. 5

Caulis striatus subalatus e linea utriusque e basi foliorum ^{decurrens}, vixetus. Folia
^{pollicibus} semiamplexicaulia, venosa serrata, tomento ad sinus ^{dentium} et in axillis ^{superioribus}
versus basin tomento albo, basi in lacinas 2.3 utraque ^{etiam} lanceolatas integerrimas divisa.
integerrima Panicula suffraginata. Scoliolum subulatum ad ramificationes axillis tomentosis
Pedicelli apice squamulosi Calyx cylindricus glaber ^{sub} ^{pubes} ^{calyculatus} ~~pubes~~ ~~calyculatus~~ intactus.
Flores flavi radius quinqueflori

80 Semidecurrens Senecio foliis lanceolatis lineariibus dentatis semidecurrentibus

Habitat in Cap. b. spui Thauri

Caulis herbaceus, ^{valde} sulcatus, angulatus et linea elevata et costis foliorum decurrente
simplex. Folia sesqui pollicaria, crassa, scapula parum infra basin decurren-
tia, erecta grosse serrata dentato serrata. Corymbus terminalis compositus
bracteis lanceolatis. Calyx basi squamis inaequalibus calyculatus. Flores
ovati

91 Solianus Senecio foliis linearis lanceolatis glabris serratis basi denticulato ciliatis
Habitat in Insula Bourbonis. 5

Caulis herbaceus glaberrimus ^{angusta serrata} sicut: tota planta striato subangulatus. Folia semiamplexi-
caulia angusta lanceolata ^{angusta serrata} In pollicaria, minute serrata subtus venoso-reticulata
Basi dentibus filiformibus serratis ciliata, approximata. Corymbus terminalis simplex
pedicellis squamis serratis adpressis. Calycis intacti simplicis foliolis linearibus squamis
nonnullis ad basin.

Ornithoglossum *Seneciois* foliis ^{glabr} sessilibus lanceolatis ^{glabris} superne dentato serratis caule fruticoso
Habitat in Cap. b. p. rei 5

Planta tota glaberrima Ramis caespitosis foliorum mucronatis. Folia utroque
acuta coriacea avenia sesqui pollicina a medio ad basin inte
gerime ciliata. Corymbus terminalis Calyx simplex. Habitus
S. nemorosus