

Senecio

Senecio ex america folio lanceolatis dentatis serratis
et Senecio altissimus amplissimo folio Tournef. f. v. h.

1 Rommesf. dedit Desfont

folia interdum utrinque denticulata pubescentia

2 Speciem ex inf. Bourbonis dedit Thunberg

87 paludofus Senecio foliis eniformi lanceolatis acute serratis subtus villosis, caule stricto her.

150. ~~Herbar.~~ 385.

Coryza aquatica Germ. her.

Lingua major Dalechampii Lugd.

Coryza palustris serratifolia Bauh. Pin. 266

Jacobaea foliis longis integris et mucronatis Mon. f. 3. p. 110. f. 7. t. 19. fig. 22.

Senecio foliis integris serratis H. Scam. p. 396*

β. Solidago palustris altissima in ana et tomentosa, foliis longioribus serratis

Amm. ruth. 220. Grmel. sib. 2. p. 162.

Habitat in Europa paludibus maritimis &

Caulis ^{bipedalis} erectus simplicissimus striatus. Folia sessilia et nunc acuta, lineata
serratis ovata, supra nitida. Corymbus terminalis ^{simplicis} pauci flori pedicelli gracilis
aliquos lobos. Pappus coloris stramineo laxis. Radix caudex 13 flori
variat foliis utrinque tomentosis

204 nemorosus Senecio radice odifera foliis lanceolatis bipinnatis subtus villosis caule ramoso Lin.
L.V. pag. 75 & Jacq. pl. austr. Tab. 184

Jacobaea nemorosus, latiore rigidiore et hispido folio Ruy. per. 142.

Senecio foliis ovato-lanceolatis subtus hispidis, floribus umbellatis Hall. & Kn. 23

Solidago foliis ovato-lanceolatis bipinnatis, floralibus ad pedunculum minimis Mue.
Tab. 2. p. 165.

Habitat in Germanis, sibiria nemoribus &

Caule erecto ramoso, glaber foliatus. Folia bipinnata, latiora quam in paludosa
grasse serrata interjectis aliis serraturis minoribus, bipollicaria. Corymbus
terminalis multiflorus. folioli pauci petalis in pedicellis. Calycis nullus.
Inquam a tantum una alterave ad basi

85 montanum Senecio foliis petiolatis lanceolato ellipticis serratis glabris.
Habitat.

Tacuin nemorense. Caule purpureo fere, striato glabro simpliciter. Folia sesqui pollicaria
superiora parum minor, utrinque glabra, serraturis minutis cartilagineis frequentibus
Corymbi ex axillis supremis et terminalibus. Pappi celli squamis nonnullis. Calyx cylindri-
cus glaber, squamis paucis ad basin, apice puncto minuto fuso.

Alium ex horto Pansino foliis subtis tomentosis

86 Jarraceniensis Senecio foliis lanceolato ellipticis ^{sessilibus} utrinque glabris, squamis calycinis apice vellosis

~~Verga aurea Camer. epid.~~

Solidago Jarraceniensis Tuck. p. 720. Bauh. h. 2. p. 1062.

Verga aurea angustifolia, serrata Bauh. Pin. 260

Senecio foliis lanceolatis, serratis, glabris, floribus umbellatis Hall. 65

Senecio Jarraceniensis floribus corymbosis, foliis lanceolatis serratis glabriusculis
Lin. S. V. p. 75 Pl. Rai. qu. fl. Austr. 2. t. 185.

Habitat in Helvetia, montibus montanis, nemorosis &

Significatur a paludose et nemor. foliis majoribus latioribus utraque glabris
squamis calycinis apice albedo tomentosis. a Dono foliis majoribus usque ad apicem
Pauli angulatis. Corymbus terminalis. foliola paucis ad basin calycis

87 sibiricus Senecio corollis quinqueradiis, foliis ellipticis lobatis L. Suppl. pag 370 * L.V.

^{perg.}
Habitat in Sibiria 4

Caulis erectus, bipedalis, teris. Folia sessilibus, elliptica, pinnatis, integerrima:
costa albida. Flores subsymptosi, lutei: disco florealis circiter quinde-
cim. Calyx ore sphecelatus. Calyculus squamulis tribus s. quatuor
L. Suppl. l. c.

80 Doria Senecio glabris corymbosis foliis subdecumbentibus nudis lanceolatis denticulatis superioribus sensim minoribus ^{patyris phaeolatis} in spec. pl. p. 1221. & P.V. pag. 750.
Doria, Jorda Panaces Chironium Ges. her

Singa aurea major vel Doria Bauh. Pin 260

Aluma Montpellierensis f. Doria Bauh. h. r. p. 1064

Solidago caule simplici, corymbo terminali, pedunculis terminalibus nudis foliis subpeto brevisimo Hort Cliff 410.

Habitat in Auphno sylvis, Montpellier ad Cadi ripas &

Planta bis 3 pedalis erecta tota glabra caule simplici fructo. Folia radica ^{per pet. utrum sequentia} lea longe petiolata elliptica subdentulata caulina lanceolata pithamosa inaequaliter grosse serrata, parum ultra basin decumbentia superiora sensim minoribus serrata evadunt, ut corymbus longius petiolatus pedunculatus apparet. Corymbus terminalis compositus bracteis subulatis pedicelli nudis apice folio te uno alterove. Calyx et alveolatus

89 *conioselinus* Senecio foliis subdecurrentibus subtus villosis, pinnulis lanicollatis, calycibus intactis.
Taiocsa orientalis Linnæi folio Tournef. Carol. Bill. h. Elth. 125. t. 105. fig. 125.

Habitat in Oriente

parum recedit a *S. Doni* forte mens varietas folia caulina ³ et radicalia ² similia *Doni*
ad rigidiora, coriacea ¹ dentibus calloso-dentatis. Squama calycino adpressa in
tacta.

90 *Doronicum* *Senecio* foliis radicalibus petiolatis ellipticis: caulino lanceolatis amplexicaulis; caule indiviso subuni-floro.

Doronicum longifolium helveticum humile, crassi foliis *Bauh-prodr.* 97.
p. 105.

Senecio *Doronicum* corollis radiantibus, caule indiviso subuni-floro, foliis indivisis serratis: radicalibus ovatis subtus vellosi *Lin. Spec. pl.* 1222 *
J. V. p. 259. *Taeq. fl. austr.* vol. 5. app. 7. 45. *Ger. prov.* 196. tab. 7.

β. *Doronicum* foliis oblongo lanceolatis serratis *Monnier off.* 152.
Doronicum integrum et crasso folio *heracii* folio *Magn. Monsp.* 295.

γ. *Doronicum* helveticum ineanum *Bauh. Pin.* 105.
Doronicum foliis lanceolatis denticulatis subtus tomentosis, caule uni-floro *Hoyen. Lugd.* 160.

α *Tusfilago* alpina, folio oblongo *Bauh-prodr.* 101. p. 197.

ε *virga aurea* montana serrata, magno flore *Bauh. Pin.* 260.

Habitat in alpebus Pyrenaei, montpelici, Helvetiis, austriacis,
italiis 4.

Caules semipedalis vel parum ultra, simplicissimus crassitie fere penno asperius lanato tomentoso
Folia sub subtomentosa, radicalia etiam supra glabra, subconacea, omnia inquali-
ter ^q dentata. Flo terminalis plerumque solitaria ramis bini magnus squamis
fusci calyculi inaequali subulati

91. *Lanatus Senecio foliis sessilibus utrinque lanatis dentatis, inferius ovatis, superioribus lanceo-
latis L. Suppl. pag. 370
Habitat in Cap. b. ppei*

non vidi

yz villosus Senecio villosus ^{villoso} foliis lanceo-amplexantibus lanceolatis ^{obtusis} extorsum dentatis.

Habitat in monte video Brasiliae Thoin Commerçon.

Planta ^{facie} herbarica ^{ca: palustris} tota villosa ^(u) brevibusque glandulosis adspersa. Caulis erectus simplex crassitie penno-asperis striatus. Folia basi angustiori extorsum ⁱⁿ sinu latiora utrinque 3 vel 4 dentata sesquipedalia. Corymbus compositus diametro palmari. Pedunculi ex alio superioribus omnes altitudinis caulis. foliis lanceolatis integerrimis ad ramificationes. Pedicelli apylli foliolati tantum 5-6. ad basin calycis. Flores flavi magnitudinis fere Cui: palustris

48-49 Hadensis Senecio corollis radiantibus quinque radiis, foliis ellipticis petiolatis integerrimis denticulatis que, caule fruticeo.

Senecia hadensis, foliis lanceolato-ovatis, crassis, glabris, denticulatis, panicula corymbosa. Dorfl. de sp. pag. 149. Tem. tab. 19.

Caulis fruticosus, suppositus, glaberrimus uti tota planta.

Folia petiolata, elliptica, lora, crassiuscula, asenia, integerrima, sepe denticulata: denticulis, minutis, paucis, remotis.

Petiolus foliis brevior.

Corymbi terminales.

Bractes 2-3 lineares ad basin pedunculorum, minores in pedicellis.

Calyx cylindricus fl. f. s. s., maturitate dilatior: calyculus octodentatus, dentibus minutis finis, proterea squamula non nullo ad basin calycis

Radii corollae quinque floris.

94 maritimus Senecio foliis amplexicaulis ovatis denticulatis carnosis, caule herbaceo
procumbente Lin. Suppl. p. 369. L.V

Habitat in Cap. b. frei, ad littora maris.

Tota fere carnosia. Variet. foliis lanceolatis. Lin

non vid.

95
anacrophylis Senecio foliis radi dentatis radicalibus cordatis lanceolatis
lanceolatis elongatis acuminatis : caulinis lanceolatis simplicibus

Habitat in Borana

Herbaceus tomentos lanatus state glabrescens. Caulis filicatus simplex. Folia
radi cilia magna semipedalia cordato lanceolatis grosse ^{obtusis} dentatis
Caulina superiora 4 pollicaria lanceolata infirma acuminata ^{obtusis} dentatis
Ciccare integerimo. Flores corymbis ^{pub} simplex terminalis pedunculi proprii
folioli pubulatis adpressi. Calyx calyculatus Calyculi squama parva
inqualer, Calycis intactato flos luteus.

96 marginatus Senecio foliis amplexicaulis Canicollatis glabris subarticulatis marginatis,
Compositae Compositae Lin-Suppl. 370
Habitat in Q. b. f. p. i.

in herb. Montepi ord.

97 glastifolius Senecio foliis amplexi caulis lanicolatis subdentatis lobis Lin Suppl.

372* S.V.P.

Habitat in Cap. b. p. ei

Caules erecti, bipedales, striati, herbacei. Folia alterna, distantia, lanicolata, subdentata, lobis, basi magis dilatata, amplexi caulis, carinae marginibus obsolete decurrentia. Panicula terminalis. Corollae radiis patens, purpureus L. Suppl. l. c.

non vidi

Caneus f. *corollis radiantibus*, foliis lanceolatis basi cordatis amplexicaulis lobis
argute serratis, caule frutescente Hort. kew. 3. p. 194.

Habitat in Cap. b. Speitz

apertis. ovellis rotundis, foliis lanceolato-linearibus dentatis rigidis, calycibus
pubescentibus Hort. Kew. 3. p. 196.

Habitat in Cap. b. p. 5.

90 *Canuynopsis Senecio* folis amplexicaulis cordato-lanceolatis serratis utroque Canuynopsis
Habitat ad fretum magellanicum

Tota planta tomentoso-canuynosa State calva. Caulis herbaceus erectus
et rufus. Vixit simplicia, sulcatus. Folia fere pithamosa inaequaliter
dentato serrata. Flores paniculato corymbosi, ex axillis supremis, et
apice caulis magni flavi. Pedicelli squamis lanceolatis-subulatis ungui-
cularibus appresi. Calyx simplex squamis nonnullis ad basin in pedicello

99 Squamosus Senecio foliis cordato lanceolatis amplexi caulibus dentatis, pedunculis lateralibus
terminalibus squamato imbricatis. ^{inferne}

Habitat in Cap. b. p. p. i
Caulis herbaceus erectus sesquipedalis striatis, pilosis, simplex. Folia cordata acu-
minata ad a basi ad medium remote dentato-fimbriata, pollicaria utrinque gla-
bra. Pedunculi axillares foliis parum longiores squamosi; pedicelli
subcymbose squamis setaceis imbricatis, tomentosis. caule superare elonga-
to apodyclo foliis puberulis remotis adpressis apice et in unum floriferis
more axillarum calycis fusi subalyculati.

101 *Lanceolatus* Senecio ^{utroque glabro} foliis lanceolato-sagittatis rigidis acutis serratis ex troscum integerrimis
amplexicaulis binosis serratis
Habitat in Cap. b. frei.

Caulis herbaceus, erectus, glaberrimus. ^{erecta arena erect} Tolia lanceolata basi in auricular
bras productas, cava serraturis rigidis mucronatis pungentibus.
Caulis pedunculo elongato foliis normalis adpresso terminatus composito
pedicelli squamosi

affinis Byzantinis

Convallaria Senecio foliis lanceolatis denticulatis petiolatis, ramificationum amplexicaulis
basi auriculatis incis.

Habitat in Brasilia: Thourin.

Planta semperalis tota glabra. Caulis erectus subramosus. Folia ramorum et inferiorum
caulis basi in petiolum attenuata, prope pollicem remota denticula arena
Folia f. ad ramificationes amplexicaulia basi dilatata utraque, incis.
Caeinis tribus lanceolatis. Pedunculi superne plerumque gemini 3/4 qua
driflori. Pedicelli squamis nonnullis setaceis. Calyx brevis. Flores flari

103 byzantinus Senecio foliis oblongis remote dentatis spinoso-denticulatis, supra nudis caule haba
ceo Lin. Sp. pag. 1223. H. V. p. 757

Hieracium montanum Conz. f. dentatis foliis Boic. ~~Boic.~~

Senecio foliis crenato-dentatis: inferioribus pinnato-lyratis: superioribus pinna
tisidis Roy. herb. 530.

Habitat Byzantii ♂.

Statura s. rigidis at omnia minora et angustiora. Caulis quadripedalis teres
striatus, viridis, adpressus pilis albis. Rami in inferiore parte caulis, pa
tentissimi. Folia lanceolata, sessilia, amplexicaulia, revoluta serrata
dentibus acutis, sinibus obtusis, acuminibus denticulis scabris, supra
viridia, nitida, scabriuscula; subtus venoso, subvelloso, viridia. Ramo
rum nido imbricata ex singulis alis foliorum. Scapi terminales, teretes,
caule angustiores, filiformes, longissimi, leviores, striati, inferne adpressi
foliis linearibus, indivisi, non dentatis, sed serrato-spinosis, subnudi. Calycis
apice sphaerulati. Corolla lutea radio octiflora, ovato, vix tridentata. Sacci
serratulo arveo s. Lin. Sp. l. c.

Sprengelii Senecio foliis lanceolatis sagittatis remote ^{revolutis} spinuloso-denticulatis utroque glabris, caule
herbo fructuoso.

Habitat in Cap. b. p. p. t.

Differt ab *ili* a folio caule fructuoso herbo inameno ^{scabro} foliis brevioribus congestioribus supra
nitidis subtus glabris. floribus duplo majoribus

Pedunculis ramosi proprii adpressi squamis inaequalibus lanceolatis. Calyxulcus
foliolis pluribus lanceolatis intactis uti squama calycis. Flores flavi

105 ilicifolius Senecio foliis sagittatis amplexicaulis dentatis caule herbaceo Lin. L. V. pag. 759.
Faioboa africana frutescens, foliis incis et subtus cinereis Com. var. 42. Tab. 42.

Habitat in C. bono spei 2

Lesquepolliana
Caulis subvellofus. Folia lanceolata supra glabra, sub^{spas} villosa subnervianam margine
crassiuscula remote dentata dentibus spinula terminatis. Flores ^{flava} panicu
latis, pedicelli filiformes adpressi solidi setaceis. Calyx glaber basi sub
squamis panicu setaceis. fl

o *halimifolius* Senecio foliis obovatis carnosis dentatis, caule fruticoso Lin. l. V. p. 759.

Donia africana arboreo, foliis crassis et succulentis ad triplicem referentibus Dill.

Elk. 124. t. 104. f. 124.

Solidago foliis obverse ovatis carnosis crenatis, caule fruticoso, corymboramoso Hort.

Cliff. 411.

Habitat in Othopia t.

Rami subangulati, tomentosi etate glabri. Folia sessilia lanceolata, sublanceolata, subtomentosa, ad versus dentata lobis

non vid.

107 rigidus Senecio foliis amplexicaulis spatulatis erosi pabris, caule fruticoso L. Spec. pl. p. 1224 *
L. V. pag. 759 *

Gaioboa africana ramis sumis, foliis senecionis pinguis rigidi et laevibus subtus incanis
Raii suppl. 179.

Gaioboa africana frutescens, foliis rigidi et hispidi Com. hort. 2. p. 149. t. 75. Seb. Musc.
t. 22. fig. 5.

Habitat in Aethiopia

Caulis rigidus scaber, mucosus et foliis deciduis, superne hirtus. ~~Totum~~ ^{rigida} folio extor
sum latiora, rugosa, subtus tomentosa, ^{incana} supra oleo quasi illinita non tamen glabra
margo ⁱⁿdentato serrulosa. Suprema lanceolata. Corymbus compositis pedicelli
filiforme syconia una alterase. Radius quinqueflorus luteus

100 populi folius Senecio corollis radiantibus, foliis ovatis spatulatis integris obtusis, aduetionibus
supra glabris, caule fruticoso Lin Spic. pl. p. 1224 * L. V. (populi folius)
Jacobaea africana, populi alba foliis Raii Suppl. 177.
Habitat ad C. b. Spei z.

Planta undique lana alba induta. Folia subrotundo ovata, integerrima s: vix
denticulata uno alterove manifeste, lanata, supra demum callosa nuda evasura,
petiolata: petioli longi, basi dilatata amplexicaulis Lin Sp. l. c.

non vidi

109 angulatus Senecio foliis petiolatis ovatis dentato-angulatis glabris Lin. Suppl. p. 369.

Habitat in Cap. b. frei

Inter altiores est. Folia subcarnea, glabra glauca. Lin.

non vid.

Seneciones duo misse a Thunb. alter sub nomine *guspi* alt. abique nomine *Lolium* et videtur
dentato sinuatis vel mucronatis, caule foliisque villosis, calyce dissecto, sed nimis im-
perfecte ut quid statueret licet

Senecio sub nomine Longifolii ex hort. Ups. misa foliis inferioribus linearibus inferioribus
dentatis superioribus integerrimis, omnibus subtomentosi a rosmarini folio differit
foliis planis brevioribus a Longifolio foliis inferioribus dentatis a denticulato calycis
et tomentositate an speciei diversa