

Senecio

109. angulatus L. foliis petiolatis ovatis dentato-angulatis glabris
10 (97-98) asper L. foliis lanceolato-linearibus dentatis rigidis, calycibus sub
tenuis
11 (97-98) canescens L. foliis lanceolatis basi cordatis amplexicaulis lobatis
argute serratis, caule frutescente.
2 (41-42) elegans L. foliis pinnatifidis equalibus pat. aequalibus patentissimis
pilosissimis, rachis inferne angustata, calycibus hirsutis
3 (41-42) venustus L. foliis pinnatifidis: laciniis linearibus acutis dentatis caule caly-
ce foliisque glabris
4 (33-34) cinerascens L. foliis pinnatifidis tomentosis margine revolutis, panicula
patula, squamis calycinis extensoribus patentibus

40 Glutinosus Senecio villosus viscosus foliis amplexicaulis inferioribus puberulis
natis fideis superioribus dentato-sinuatis

Habitat in Cap. bono spai

Herbacius. Caecum ^{et alium} oblongo angulato dentato-lanceolato pedunculi superne,
multi flori subsessili folio petalo in medio pedicelli. Calyx
villosus viscosus glauca una alterave ad basin. Flores flavi

35 nebrodensis ^{hirsuto hirsuto viscosus} Senecio foliis lyratis sinuatis obtusis; radicalibus petiolatis. caule hirsuto
Jacobaea nebrodensis alba, oblongo folio latiore minus incano lacinato. Raii
suppl. 179.

~~Jacobaea montana, senecionis pallida parva flore Barrel. Fe 40~~
Senecio nebrodensis corollis revolutis, foliis lyratis sinuatis obtusis petiolatis, caule
hirsuto. Lin. Spec. pag. 1217. * . L. V. p. 757.

Habitat in Sicilia, Hispania, Pyrenaeis. ^{in nemoribus floriferis simplicibus}

Caulis striatus, ^{ramosus} ramis patentissimis, simplicibus. Folia radicalia
et ima petiolata subtriangulifida, levissima extrema oblonga sinuato dentata.
Caulina ^{inferiora lyrata sinuata} superiora ampliatiuscula angustiora superiora angustiora, extor
sem parum latiora sinuato dentata. Pedunculi ^{versus apicem cauli stratis} ternales 3 vel 4. medio
foliis linearibus interdum axillaribus solitariis unifloris foliis dimidiis longioribus
Calycis uti reliqua planta villosi viscosi. Calyculus calycis dimidiis
brevior. Squama intacta. Natura L. vulgari

36 glaucus senecio foliis amplexicaulis lanceolatis obtusis dentatis integerrimis L. L. V. p. 257.

Tarboea aegyptiaca, folio glauco coronopae Boerh. Lugb. 1, p. 99.

Tarboea aegyptiaca annua, coronopae folio glauco Vaill. ad. 1720. p. 297.

Habitat in Aegypto ☉

Planta pubescens cinerea Lin

Caulis teres, glaber, ramifus. Folia remota 4-pollicaria, basi dentata cordata
semicomplexicaulis lanceolata, glabra, inferiora saepe dentata cuneata obtu-
sa, interdum laciniis 3-4 pennata, interdum dentibus 1-2, superiora acui-
ta integerrima. Pedunculi superiores 1-2-3 flori. Pedicelli longi, laxi, uniflori foliola
1-2. Calyx setis nonnullis basi calyculatus, foliola subphaelata herb 4us/

57 *varicosus* Senecio corollis revolutis, foliis ovatis petiolatis dentatis puculato venicifis

Lin. dec. 9. t. 5. *

Habitat in Aegypto C.

Folia subtus fanguinea

~~Chaetanthus~~ Senecio petiolis amplexicaulis, pedunculis folio triplo longioribus, foliis pennatis sinuatis
Linn. S. V. pag.

Tacoboa afro perennis viscosa lutea, Applenii foliis Vaill. ait. ~~1720~~ 1720. p. 290.
Dill. Elth. 103. t. 152. fig. 104.

Habitat in Africa 4.

Caules villosi, teres, striatus. Folia inferiora petiolata, superiora sessile, lysato
subpennatifida: laciniis oblongis, dentatis, villosis, subangulatis. Pedunculi
perne axillares, elongati, triflori, villosi - viscosi, uti Calycos. Calyx intae
tus. herb. 4us.

~~Synonymum~~ Vaill. nomen optime exprimit Charact. Let Royer

pubigeni Senecio

39 ^{pubigenis} ~~hastatus~~ Senecio petiolis radicalibus lanatis, foliis runcinatis, caulis simplicissimis, floribus
lat. caulibus sessilibus L. Am. Ac. 6. pag. 101. n. 65. * Lin. S. V. pag.

Talobea ^{tab.} pinnatifida monomotapensis Moris. h. 3. f. 7. t. 10. f. 32. - Breyn. Cent. 65.

Habitat ad Cap. b. frei 4

Folia radicalia, glabra, ~~pinnatifida~~ ^{runcinata}, obtusa, crenata, petiolis basi cana mollis
fina notatis. Caulis pedales, simplicissimi: Folia 3. f. 4. semiamplexicauli
bus, pinnatifidis parvis. & loto terminalis, luteus; saepe et laterales sessiles.
Radius corollae violaceus quo a hastato, qui radius est luteo, primo visu
seu distinguitur L. Am. l. c.

non vid:

63 erofus Senecio foliis radicalibus petiolatis oblongis sinuatis serratis vellosi, caule unifloro subrufo.

Lin. Suppl. 370 * S. V. 460

Habitat in Q. S. p. c.

Colic radicalis elongata, sinuata, et lobis serratis, versus radicem tomento in voluta.

Caulis fere aphyllus: folius paucis, parvis amplexicaulis L. L. C.

42 elegans Senecio foliis pennatifidis equalibus patentissimis, margine incrassato recurvato, caly-
culi squamis subulatis Linn. l. V. pag. 757.

Aster africanus annuus, senecionis foliis Com. l. 2. p. 59. t. 30.

Jacobaea capensis flore purpureo, senecionis folio dentato Seb. mus. l. p. 33. t. 22. fig. 1.

13. Jacobaea africana frutescens, flore amplo purpureo elegantissimo, senecionis folio
Volke Herb. 225 t. 229. Raii l. 3. p. 170. pl. 53.

Habitat in Aethiopia

Ca. Caulis latus glaber ut tota planta, striatus. Folia amplexicaulia laciniis
in feriotibus parum minoribus, lineantibus, irregularibus dentatis, infima
ad basin reliquis major longior et latior in eis dentata. Pedunculis ter-
minales usque ⁶ f. ³ flori fastigati squamis nonnullis adpressis. Squamae
calyculi ovato lanceolati subulati, calycis lanceolati mucrone albo.

Senecio elegans corollis radiantibus, foliis peltatis vixidis, pennatifidis equalibus
patentissimis, rachis inferne angustata, calycibus hertis Hort. Kew
3. p. 143.

senatus d. corollis radiantibus, caule calyce folisque glabris, foliis membranaceis. Lacinis
linearibus acutis dentatis Hort Kew. 3. p. 142.

Habitat in Cap b. p. 3

Costa foliorum praecipue inferorum, saepe aculeis mollibus obfusa.

Caulis floratus glaber folia sessilia angusta. Corymbus var
multati 3, 4 florus. Pedicellis pedunculatis alternis unifloris

Longis folioli nonnullis simplicibus linearibus dispersis
Flores paucissimi elegantis

49. myrtilifolius Senecio foliis pinnatifidis inferioribus petiolatis superioribus amplexi-
caulis

Specimen nulli valet adeoque differentia manca

44

lucida
manducaria

^{dentari, apice, dentato, incis}
Senecio foliis pinnatifidis ^{dentari} trilobis dentatis calyculis coloratis
Jacobsa mantina ~~ma~~ senecione folio crasso et lucido, masiliensis Tournef.

G. B. G. p. 486.

Jacobsa maxima minima glabra Senecione folio ^{Halica} Barrel. p. 261.

Habitat ad littora maris Sardiniae et Tunetiae glabra

Caulis ascendens, striatus, teres, glaber. Folia inferiora basi in petiolum attenuata, ^{est prosum di lata} dentata incisiva, superiora amplexicaulia ^{dent pinnatifida}
~~lacina~~ ~~longue unice~~, triloba et lacinae adhuc utraque unice unferior, terminalis apice trifida reliqua dentata. Peduncululi laterales saepe apicem et terminales plerumque simplices breves squamulis fetaceis coloratis, villosi. Calyculus purpureus polyphyllus foliolis fetaceis. Squamae calycinae apice purpureo fentes. Baccis trilobis at radius patens

Sub nomina Sen: arenans ex Hungaria misit Linné Wadenoer hunc
quam maxima similis

45 Squalidus Senecio foliis pennatifidis Caernis linearibus - Racis catis distantibus dentatis
Senecio squalidus: corollis radiantibus calyce longioribus integris, foliis pennatifidis.
Caernis linearibus distantibus Len. P. V. p. 757.

Habitat in Europa Orientali

Jacobaea minor abrotanifolia Banel. Fi: 262.

Habitat in Europa australi

Planta glabra caule foliato superne ramoso. Folia complexi ulia linearia
pinna distantibus altera remote dentata pedum cili versus apicem
bi- triflori, proprii squamis bini s. tres, apicem a 2-3 flores. Calycis ⁵ pennis
squamis inaequalibus, glabris. Squama calycis intallo.

Senecio alpestris Schrank?

46 *incanus* *Senecio* foliis utrinque tomentosis subpinnatis obtusis, corymbo subrotundo Lin. Spec. pl. 1219 *
S. Veg. pag. 757. Jacq. collect. 2. p. 27.

absinthium alpinum B. *alpinum umbelliferum* Poir.

Chrysanthemum alpinum L. Claf. h. l. p. 333.

Chrysanthemum alpinum incanum, foliis laciniatis Bauh. Pin. 134.

Absinthium alpinum umbelliferum & *sericeifolium* & minus Bauh. Pin. 140.

Jacobaea incana alpina minor Boerh. Mus. 2. p. 20. t. 8. Barrel. icon. 262. Pluk. Phyt. 39. fig. 6.

~~Habitat~~

Habitat in alpebus Helvetia, austria, Pyrenaeorum, montpelii &

caulis digitalis vel palmatis totus incanus tomentosus, simplicis formis erectis. Folia petiolata. ^{off homo mani} ^{et pino}

et horum dilatata pinnis oblongis obtusis, ^{vel integris} ^{dentato} ^{dentato} ^{erectis}. ^{folia} ^{ample}

caulis corymbus terminalis, hemisphaericus. Calycis cylindrici ^{magnum} ^{glabrati} ^{foliato} ^{sim}
lobis, squamis calycinis catenatis glabratis. Semiflosculi vix conspicui

β. *Senecio parviflorus* All. flor. Pader. n. 727. tab. 38. fig. 3

differt pinnis deo profundioribus dentato incisus, calycibus cylindricis floribus paucioribus, squamis calycinis catenatis glabratis. Semiflosculi vix conspicui

47 succulentus Leneis foliis pennatifidis carnosis ramis divaricatis subbifloris

Habitat in Aegypto ¹⁷⁸⁶ Sorhal

Planta digitalis glabra. Caulis ramis angulato. Rami divaricati angulati.
Folia amplexicaulia linearia ^{versis} et ^{versis} pinnatifida pennis oblongis
dem obtusa dentatis. Pedunculi ^{uniflori} plerumque bini ex apice ramorum ^{et}
interdum solitarii medio folio lanceolato sagittato integerrimo. Flores mag
nitudine fere l. Fae. Calyx calyculatus. Squamis vix sphaerelatis

40 Nigella arvensis foliis linearibus serratis basi dilatatis dentatis, caule herbaceo

vel densius determinanda

49 pinnatus Senecio foliis pinnatis ^{caulis} lanceolatis integerrimis subtus tomentosis

Habitat in Brasilia Thoui monte vides

Caulis herbaceus purpureo saepe striatus glaber. ^{simplex} ^{reticulata} folia bipinnata, utriusque ^{divisi} ^{in 2. penna} pennae utraque geminis lanceis lanceolatis linearibus margine subrevolutis. Petiolus palmarum foliaceus semiamplexicaulis. Corymbi ex apice caulis et ramulorum superiorum compositus ~~et~~ bracteis lanceolatis indivisis. Pedicelli foliolo uno alterove. Calyx calyculatus glaber. Flores facie sicuti brisosi.

50 umbellatus Senecio corollulis radii linearibus, foliis pennato-denticulatis: laciniis diftantibus
Lin. Am. Ad. 6. pag. 101 n: 64*. Mart. 470 * L. V. pag. 750.

Jacobaea africana folio capillaceo vidi Herm. afr. 14

Jacobaea aethiopica angustifolia et prolongi folii variis crenatis ab imo caule ad
summum usque confectis Plat. Mart. 107. t. 4. 21. fig. 5.

Senecio filii foliis corollis radiantibus, foliis glabri linearibus subulatis longissimis
subdecurrentibus; superioribus basi dentatis, floribus paniculatis L. Berg. Cap.
270. *

Habitat in Aethiopia

Caulis simplex bipedalis, superne ramosus. Folia linearia, subpennata: pennis remo-
tis, linearibus, longis, acutis. Flores umbellati: Pedicellis foliolis subulatis ad
trifidus. Calyces laces quasi coarctati ubi apices patent. Corolla rubea pur-
purea L. Am. t. c.

aculeatus ^{semi hastato} Senecio foliis pennatis linearibus pinnis ~~acutis basi auriculo subpinnatis~~, Pedunculis unifloris

Habitat in Cap. ~~brasil~~ monte video Brasilia

Caulis lignosus glaberrimus striatus. Folia sessilia linearia, pennata, carnosa: pinnis
6-7 angustis singulares auriculo ad basin in axilla lanceolata rigido pungente ~~base reflexo~~
interdum recto ~~interdumque~~ ~~dist~~ rarius dicit. Pedunculi 2-3 ad apicem ^{flori} bipolli
caesi uniflori basi bractea subulata, squamis 3 versus apicem. Flores magni crati
Calyculi squamis setaceis longis brevibus. &

57 Abrotanifolius Senecio foliis pennato-multifidis linearibus nudis acutis subfloris Lin. l. V. pag
caule ascendente
757* Jacq. Videt. 200. * Flora Austr. v. 1. 179

Achillea montana Artemisia tenuifolia Jacq. Collet. 9c.

Phrysanthemum alpinum II. Clus. Hist. 1. p. 333 & 334.

+ Habitat in Alpibus Thiacis, Pyrenaeis, Cantabricis, Gotthardi &

+ Jacobaea alpina, foliis multifidis sphaerica, flore luteo plerumque gemello Pluk.
alm. 144

caulis simplicissimus ascendens. Folia cruce pinnata multifida
inferiora pennata multifida
invisi intermedia & sequi latior trifida. Super ea superiora pennata
pinnis integri, superius in alia pennatis in alia indivisi. Flores magni
Planta Scopoli Pedicelli foliola aliquid versus apicem. Calyx simplex

Planta Scopoliana ab alia lecta in monte Baldo differt foliis inferioribus
latioribus petiolatis, non vero ad basin usque pennatifidis, foliis summis
indivisi subulatis, caule unifloro. Flores omnino similes altero

51

Delphinifolius Senecio ^{pinnato multifidis Senecio} foliis linearibus ^{revolutis} subtus villosis pinnato multifidis, caule puberulo Tab.

Facies a Adonis foliis floribus in umbella dispositis Shaw. agr. n. 347

Habitat passim in agris Tunetani.

Caulis ^{herbaceus} erectus, semipedalis et ultra, simplex, crassitie pennis an serino, basi interdum raris uno vel altero, teres, villosissimus, pilis albis longis

Folia sessilia, alterna, approximata, patentia, pinnata: pinnis oppositis, multifidis laciniatis: laciniis linearibus, obtusis, supra glabra, subtus villosa, margine reflexo

Pedunculi versus summum, ^{fastigiat} ~~capitati~~, caule semellemi, ~~et~~ versus apicem foliis binis ^{fructibus} foliorum caulis modo ^{minor} ~~menus~~ ^{que} ~~dupl.~~

Flores corymbosi, pedicelli interdum triflori, lateralibus saepe unis
floris, intermedii plerumque squamis plurimis ^{dupliciter} ~~statis~~ longis
ad pressi

Calycis squamae saepe plurimo, ^{dupliciter} ~~intacta~~, interiores magno Seneci. elytra
4: exteriores inaequalitate
Corollae radii, plures, 24, patentes

290

3031

52 bipinnatus Senecio foliis bipinnatis linearibus Pedunculis multifloris

Habitat in monte Monaco Hispanie. 4

Caulis pedalis simplicissimus glaber. Folia digitalia ex troscum bipinnata infer
pinnes simplicissimis pinna angusto linearis acuta divisa, glabra carnosae
Pulo. Corymbis terminatis pedicelli subquamosi. Squamae calycinis apice
et margine albido villosae. in culta Calyx basi ventricosus. Flores triplo minus
quam in abrotanifolio.

53 Canadensis Seneo corollis radiantibus, foliis omnibus bipinnatis linearibus, pedunculis
Corymbosis. L. Spec. pl. p. 1219* S.V. 750.

Jacobaea Schrophylli foliis manana Plur. mant. 107

Habitat in Canada.

Caulis erectus, teris. Folia glabro: summa simpliciter pennata. Corymbus termi-
nalis compositus. Calycis reflexi enter L. Sp. pl. l. c.