

Senecio

58. *Stachysoa* L. foliis pinnatis lyratis: laciniis lacunculatis, caule erecto.
59. *tenusifolius* L. foliis inferioribus subcuneiformibus dentatis in cili: caulinis pinnatifidis lineariibus
60. *aureus* L. foliis crenatis: inferius cordatis petiolatis, superioribus pinnatifidis
61. *auriculatus* L. foliis lanceolatis lyrato-pinnatis dentatis nudis, petiolis aurtis
62. *alpinus* L. foliis cordatis lyratis grosse serratis, petiolis aurtis
63. *erofus* L. foliis radicalibus petiolatis oblongis sinuatis serratis vellosi, caule uni
flore subnudo
64. *trifidus* L. foliis radicalibus aggregatis cuneiformibus trifidis, ^{apice} pro capis squamosis
flore

x + xx. Collis radiantibus, foliis integris

65. *lenifolius* L. foliis linearibus integerrimis, corymbo subsquamato, caule herbaceo.
66. *teretifolius* L. foliis filiformibus integerrimis, caule fruticoso
67. *filifolius* L. foliis filiformibus integerrimis, caule herbaceo
68. *longifolius* L. foliis linearibus integerrimis sparsis glabris nudis, caule fruticoso
69. *rosmarinisfolius* L. foliis linearibus integerrimis revolutis, floribus corymbosis
caule fruticoso

70. linearis *S.* foliis linearibus integerrimis carnosissimis, pedunculis solitariis unifloris, caule
herbaceo
71. denticulatus *S.* foliis linearibus sparsis revolutis glabris denticulatis, caule fruticoso
- 72.
73. angustifolius *S.* foliis linearibus lanceolatis dentatis integrisque, caule fruticoso
74. ciliatus *S.* foliis linearibus subtus tomentosis, inferionibus emarginatis, superioribus
integris
75. juniperinus *S.* foliis subulatis, caule fruticoso
76. imbricatus *S.* foliis lanceolatis integerrimis revolutis imbricatis glabris
77. lavis *S.* foliis lanceolato-linearibus medio denticulatis glaberrimis lobatis
78. Forsthalii *S.* foliis lanceolatis sessilibus remote denticulatis subtus villosis, calyci
bus intactis
79. notatus *S.* foliis lanceolatis serratis glabris auriculatis, auriculis subtus partitis
80. semidecurrentis *S.* foliis lanceolato-linearibus dentatis semidecurrentibus
81. folicinus *S.* foliis linearibus lanceolatis glabris serratis basi denticulato-ciliatis
82. munitus *S.* foliis lanceolatis sessilibus glabris superne dentato-serratis, caule fr
uticoso
83. poliochrous *S.* foliis ensiformibus lanceolatis acuta serratis subtus villosis, caule
fruticoso
84. nemorensis *S.* foliis lanceolatis biserratis subtus villosis caule ramoso, radiis atroflores

85. montanum L. foliis petiolatis lanceolato-ellipticis serratis glabris
86. saracenicus L. foliis lanceolato-ellipticis sessilibus utrinque glabris, squamis calycinis apice
^{villosis}
87. sebinius L. foliis ellipticis lobatis, corollis quinque radiatis
88. Doni L. foliis subdecurrentibus nudis lanceolatis denticulatis superioribus sessilibus
^{minoribus, floribus corymbosis, calycibus sphaerellatis}
89. coriadaus L. foliis subdecurrentibus subtus villosis ⁱⁿ ^{factis} ^{fulis} lanceolatis, calycibus in
^{factis}
90. Doronicum L. foliis radicalibus petiolatis ellipticis: caulinis lanceolatis am-
^{plexicaulibus, caule indiviso subuni-floro.}
91. lanatum L. foliis sessilibus utrinque lanatis dentatis, infimis ovatis, superioribus lanceolatis
92. villosus L. villosus-rufus; foliis amplexicaulibus lanceolatis obtusis ^{extrospun}
^{dentatis}
93. hadriensis L. foliis petiolatis ellipticis integerrimis denticulatisque, corollis quinque
^{radicatis, caule fruticoso}
94. maritimus L. foliis amplexicaulibus ovatis denticulatis carnosissimis, caule
^{herbaceo prostrato}
95. macrophyllus L. foliis dentatis radicalibus cordato-lanceolatis: caulinis am-
^{plexicaulibus lanceolatis acuminatis}

96. marginatus S. foliis amplexicaulibus lanceolatis glabris subarticulatis marginatis,
 Erymbozomposito.
97. glastifolius S. foliis amplexicaulibus lanceolatis subdentatis levibus
98. Canugi-nosus S. foliis amplexicaulibus cordato-lanceolatis serratis utrinque Canugi-
 nosus
99. Squamifolius S. foliis cordato-lanceolatis amplexicaulibus inferne dentatis, pedun-
 culis lateralibus terminalibusque squamato-imbriatis
100. ~~cordifolius S. foliis cordatis dentatis, calycibus simplicibus~~
101. Canicentus S. foliis lanceolato-sagittatis amplexicaulibus spinoso-serratis utrin-
 que glabris extropium serratis
102. longatus S. foliis lanceolatis denticulatis petiolatis, ramificationum amplexi-
 caulibus basi auriculatis incisifs
103. byzantinus S. foliis oblongis remote dentatis spinoso-denticulatis supra nudis, cau-
 le herbaeo.
104. spinulosus S. foliis lanceolato-sagittatis revolutis remote spinulosis denticu-
 latis utrinque glabris, caule hirsuto fruticoso.
105. ilicifolius S. foliis sagittatis amplexicaulibus dentatis, caule herbaeo
106. halimifolius S. foliis obovatis carnosissimis dentatis, caule fruticoso
107. rigidus S. foliis amplexicaulibus spatulatis erosis scabris, caule fruticoso
108. populi foliis S. foliis ovatis spatulatis integris obtusis acutioribus supra
 glabris, caule fruticoso

Declinatus Seneio glaber, foliis lanceolatis extorsum dentatis subserratis,
pedunculis declinatis.

Habitat in China.

Caulis herbaceus, ramosus, angulatus. Folia petiolata, bipollicaria,
attenuata, supra vix venosa, extorsum dentibus obsolete subserratis
rata. Pedunculi ex axillis supremis et apice, biflori, arcuato
declinati, basi squamis non nullis. Flores radiati.

herb. bot.

100 cordifolius Senecio foliis cordatis dentatis, calycibus simplicifloris Lin. Suppl. 372* S.V

pag. 160

Habitat in Cap. bonospei

Caulis fere prostratus, pedales, crassitie feli grossioris, basi subramosi. Folia alterna
petiolata, cordata, obtusi^{uscula} uscula, dentata, utrinque loricata. Pedunculus ter
minalis, elongatus, ~~uniflorus~~^{pauciflorus} - Calyx simplex non calyculatus. Corolla lutea
Lin. Suppl. t. 1.

19 sagittatus Senecio foliis lanceolatis ^{sagittatis} serratis glabris amplexicaulis basi sagittatis, ramis subrecto
tomo

Senecio auriculatus cordatis nervis, foliis lanceolatis amplexicaulis serratis pedunculis
trifloris Burm. fl. Ind. p. 201.

Habitat in Java.

Glabra Caule striato superne subrecto tomo. Folia pollicaria inaequaliter serrata
Pedunculi terminales gemini vel solitarii subtriflori. Pedicelli capillares Calycis cylindri-
ci simpliciter exalveolati, pauciflori

20 ^{allosi} ^{grosse} ^{dentatus} Senecio foliis oblongis ^{allosi} ^{grosse} ^{dentatus} basi incisis, pedunculis paucifloris

Habitat in Insula Francie Thouin communis

Caulis herbaceus, erectus, simplex, sulcatus, subvillosus. Folia semiamplexicaulia ellipti-
ca basi angustiora laciniis aliquot irregularibus dentatis, interdum integra, dentata
suprema laciniolata, villis tenuissimis adspersa, venosa. Pedunculi axillares
et terminales bi- s; triflori foliolum subulatum ad basin pedicellonum. Calyx cylin-
dricus calyculis foliolis subulatis laciniis. Flores flosculosi.

Senecio singulari, numerosis fimo ductu serpentino ad a costa ad marginem oblique
folium percurrentia.

2) virgatus Senecio foliis lyndis subtus tomentosis, pedunculis unifloris: squamis subulatis

L. Am. Ac: pag. 161. n. 63

Habitat in Cap. b. p. i. 7.

Subnitescens: Ramis tomentosis. Folia petiolata, subtus tomentosa, si lanata, albaque.
Pedunculi terminalis, uniflori, laxes, recti, longi, adpressi foliolis subulatis al-
ternis L. Am. l. c.

22 p. pseudo-china Senecio corollis nudis, scapo pubescente longissimo L. P. V. p. 756.

Senecio maderapatanus repifolius, floribus maximis, cujus radix a nonnullis China
dictus Hill. Elth. 345. t. 250 f. 335.

Habitat in India &

non vid.

23 vulgari Senecio foliis pennato-faucatis amplexicaulis, floribus parvis L. S. V. p. 756

Flor. Dan. t. 513.

Verbena somera Binnf.

Erigeron minus Dodon. pempt 641.

Senecio minor vulgari Bauh Pin. 131.

Habitat in Europa cultis, ruderalis, succulentis ☉

24 arabicus Senecio foliis petiolatis ^{sub} pennatifidis lobibus, ramis divaricatis.

Senecio arabicus foliis ^{corollis nudis} subpennatifidis petiolatis, calycibus intactis L. Mant. 114 * S.V.
p. 756.

Senecio herac. foliis ^{corollis nudis} bosc. Cat. pl. Aegy.

Habitat in Aegypto.

Caulis glaber ramosus. Rami divaricati, sulcati. Folia remote basi in petiolum attenuata, ^{exterioribus} ^{interioribus} pennatifida. Laciniae lanceolatae subdentatae, crispipulae. Achenia squamulosa. Flores paniculati ternales, subsessili.

Calyces cylindrici basi squamis aequo setaceis

Statura s. vulgari s. jacobae. Folia s. sylvatici amphibia. Flores flo. ulosi

~~arabica~~ ~~Senecio~~ ~~caulis nudis, foliis~~ ~~subpinnatifidis~~ ~~petiolatis lobatis~~ L. V. p. 756
~~Senecio hieracifolius Forst. Flora Aegypti pag. 1244~~

~~no 446.~~

~~Senecio hieracifolius Forst. Cat. pl. Aegypt. pag. 1244~~

arabica Senecio corollis nudis, foliis subpinnatifidis petiolatis lobatis,
calycibus intactis Lin. Mant. p. 114 ~~Forst.~~ v. pag. 756.
Senecio hieracifolius Forst. Cat. plant. Aegypt. 12446

verbenaefolia Sen. foliis pennatifidis laciniis lineantibus subdentatis
tri pedunculis trifloris calycibus intactis
Habitat Hortus Hafnensis

Caulis glaber ramosis. Racem. Senec. triflori vel
systris. laciniis foliorum omnino mucro terminato
natis. foliis subpetiolatis

an ab antio devedis?

Taponicus ^{l.} corollis nudis, foliis pennatifidis: laciniis lanceolatis acutis incisivi, stipulis
foliaceis subpalmatis Hort. Kew. 3. p. 140.
Senecio japonicus corollis nudis, foliis petiolatis incisive pennatifidis dentatis glabris
Hort. Kew. fl. 10p. pag. 315. 4
Habitat in Japonia 2

Caulis carnosus, debilis, sulcatus, vellosus, bipedalis. Folia petiolata, sub
lyrata, vel incisive pennatifida, laeva, glabra, fruticosa, supra viridia
subtus pallida; laciniis oblongo, acuto, inaequaliter dentato. Stipula
e regione petioli duo, dentata. Flores terminales paniculati, flo
culosi, grandes. Pedunculi bifidi vel trifidi, capillares, cernui, nudi
Pedicelli subsquamosi unguiculares. Calyx catylulatus, apice vix apicula
tu Thunb. l. c.

95 triflorus Senecio foliis sessilibus sinuatis calycibus conicis: squamis minimis intactis L. p. 756

Tacobaegyptiaca Senecionis folio, semiflorellis vix conspicuis Vaill. Act.
1720 p. 298.

Senecio foliis pinnatifidis: laciniis inaequalibus erectis Hort. Cliff. 406.

Senecio foliis sinuatis pinnatis petiolatis; pedunculis folio longioribus; florum
radiis disci brevibus Royen. Lugdb. 167

Habitat in Aegypto ☉

Tacis vulgaris glaber caule ramoso. folio semipollicari extrosum latro
in longioribus laciniis linearibus. Pedunculi laterales et terminales
plenumque bifidi, biflori vel triflori. Squama paucis ad basin
calycis. Pedicelli pollicari filiformes squama folio unio petalico

26 Aegyptius Senecio foliis amplexicaulis sinuatis, squamis calycinis integris brevibus pph
celata Lin. Hort. Ups. 261. * S. V. p. 756

~~Tacoba aegyptiaca fœnicionis folia flore minore Vaill. Bot. 1720 p. 298. non videt~~

Habitat in Aegypto C.

Facies senec. vulgaris sed folia minus divisa. Pedunculi nudi triflori squama
una alterave notatis. Calycis foliola apice pphacelata et squama basin

circumferentes simplicissimas pphacelatas hinc Hort. Ups.

Caulis etc. tota planta glaber, ramifer. Folia pphica, bipollicaria, inferiora
pinnatifida: lacina lanceolata, subserrata, superiora dentibus alypud gross
is. Pedunculi triflori. an pphici in floru? herb. 4 usq.

27 foliis Seneo foliis cum inferi dentato serratis, inferioribus petiolatis spatulatis supremis
amplexicaulibus lanceolatis calycibus cylindricis.

Jacobaea montana, Senecionis parvo flore Barret. Gi: t. 401.

Habitat in appenninis, Neapoli passim ☉

foliis Caulis ascendens palmatis, simplicissimus subpelosis. Folia inferiora spatulata
superiora basi attenuata amplexicaulia, suprema lanceolata ^{omnia} vix pelosa
dentato longitudinaliter incis, laciniis dentatis. Peduncululi quatuor plerum
aque, terminales brevi bractea ad basin et versus apicem foliolum subulatum
apice sphaeclatum. Calycis cylindrici pallidi. calyculo inaequali folio
sphaeclato uti calyx. Flores radii parvi revoluti. ~~Ad. fol~~

Leucanthe pumolium. Sem. folus spatulatis ino'is exnatis, corymbo pauci
flore Pax. d. 2 pag. 230

Habitat in Barbana
radix revoluta

Semipedalis, basi ramosis: rami adscendentes, besetes glabr
opice ^{et} ~~conspicui~~

Solia frequentia sespilia squarum fer foliorum inferiorum

Chrysanth. leucanthemi glabra dentata. Corymbi Terrena
ter simpliciter quadri vel quinquieson pedicelli squamis pube
latis adpress ^{foliolis} calycula ^{atque} ~~spicatis~~ ^{atque} apices foliorum
calycis

Canis P. falis scapulis dentatis oblongis Gmel. N. 1. pag. 155. Tab. 35. fig. 1

Habitat

michi synodus

trichogonodes Sen. ~~foliis crenatis, infimis cordatis petiolatis; pinnatis
vitis pinnatifidis lyncis Walt. carol. pag 200.~~
Habitat in Carolina

non vid.

29 *Cirsium senecio* foliis amplexicaulis lanceolatis dentatis, squamis calycinis brevissimis
intactis lin. Bot. Upf. p. 261. * S. V. pag. 7577.

Habitat in Hispania ☉

Variat sepe foliis subtus incarnato-glaucis. Folia cordato lanceolata. Calyces spi-
ce colorati, sed squamis basi cingentes setaceo non sphaerulato sunt. Calyx pul-
chre striatus et panem viridus, non vero reliqua planta part. Lin. Bot. Upf.

Folia in specimine Herb. Royeni dentato-serrate erant, in *Herb. Royeni* denserulati
sunt.

30 trilobus Senecio foliis amplexi caulibus, squamis calycinis pphaeclatis lacini Hort. Ups.
261. * S.V. pag. 757.

Jacobaea Hispanica minus laciniata, petalis brevissimis Vaill. parif. 21.

Habitat in Hispania ~~parif.~~ ^Q

~~per medullas angulatas vix vellosis~~

Caulis striatus glaber. Folia inaequaliter dentato serrata, ex trospem dilatata, glabra
apice trifida laciniis lato linearibus. Pedunculi ex axillis superioribus
elongatis 2-5 flori. Pedicelli ~~vellosi~~ ^{subtomentosi} apophylli. Calyculus squamis fuscis per
perispermibus lacini calycis dimidio breviora. Squama calycis a medio
ad apicem fuscis. Corolla flava

venetate ~~forte~~, culta, squamis calyculi integri viridibus cum in in nullis aliis
discrepat

39 vilcosus Senecio foliis pennatisidis vilcidis, squamis calycinis latius longitudine perianthii
Lin Flor. Suec. 749* P. V. pag. 757

Engeron primum Dod.

Jacobsa pannocia / Clus. h.

Senecio ineanus pinguis Bauh. Pin. 131.

Senecio hispidus vilcidus graveolens Bell. elth. 347 t. 258 fig. 336.

Habitat in Europa pagis, urbibus &

Caules striatus pubescenti vilcidus. Laciniae foliorum lineares dentato-irregu-
lantes. Pedunculi laterales biflori s. triflori. Pedunculus foliolo in medio
lineari. Calyx^{is} & Calyculi squamae apice sphaerulati. Folia in locis
montanis subtus leprosa ut in vulgari sylvatico Lin fl. l. c.

32 Sylvaticus Senecio foliis pennatis fidis denticulatis caule corymbose erecto Lin. S. V. pag.
757. Fl. Dan. 869.

Senecio 2. vel montana Tabern.

Senecio minor, latiore folio, f. montanus Bauh. Pin. 131. Dill. EoM. 258. t.

~~258~~ 258. fig. 397.

Jacobae senecionis folio incano, perennis Raii h 205. Hall. Gen. 177.

t. 4. 3.

Habitat in Europa borealis sylvis caducis O.

Defr. descriptur in Herbario deest

33 ^{numulæ} ~~penniculata~~ Senecio foliis pennatis ^{lineantibus} dentatis caule ramoso paniculato

Jacobaea numula gallica Boiss. in pag. 76.
tab. 41. fig. 1.

Habitat

Caulis herbaceus erectus ramosus basi pilosus superne fere glaber pedalis et
ultra. Rami patentes alteri. Folia pennata vel pennatifida: pinnis
lineantibus obtusi dentato subincisus planis, remotiusculis. Pedunculi latius
cesit terminales plerumque triflori: pedicellis ses qui pollicem antea folioli
geminis pedicellis. Calyx simplex fere Senec: vulgari Calyx vero spheacela
tus. Corolla flava revoluta

27 Cinerifera Senecio tomentosus, foliis pennatis lineariis margine revolutis flori-
bus paniculatis

Habitat in Cap. bono spicity

Tota tomentosa, caule stete glabro. cortice pallido. Folia sessilia par-
va, Digitalia, linearia, pennis, obtusifutulis alternis utraque tomentosis
pedunculati ad apicem ramosi floribus 4-5. pedicellis apyellis
seorsim magnitudine corollae calycillatus calyculo proterti. Flores flori-