

Serapias

granulata Scapular

Habitat

herb. Desfont.

Planta digitalis, aphylla, Scapus squamis vaginatus. Flores superne quatuor, parvi pedicellati.

Seropias

Habitat ad fretum Magellanicum Comnesor herb. Aust.

Bulbi fasciculati. Folia inferne, tripollucana, oblonga, glabra. Scapus vagi-
nis latis. Vetus - Spica bypollucana. Flores approximati. Bractes longitu-
dine gemini. Capsula subglobosa, magnitudine fere nucis Cogh.

latifolia serpens bulbis fibrosis, foliis ovatis amplexicaulibus Lin. S. V. 811
Helleborine *latifolia montana* Bauh Pin. 186.

Epipactis foliis amplexicaulibus ovato lanceolatis labello lanceolato

- Hall. bot. Z. n. 1297 Tab. 40
B. Helleborine recentiorum genus III. Clus. Pan. 276
V. Helleborine altera flore atrorubente Bauh. Pin.

Habitat in Europa ^{superiore pubescens} nervosa
Caulis cubitalis. ^{superiora} folia caulina 7. 8. inferiora ovata latiora
superiora sensim angustiora lanceolata. Spica sempiterna
triginta flora. flores ~~cor~~ nutantes. bractea lanceolata flore longio
res. ^{perianthii} Oler minor quam in aliis. Petala tria exteriora ovato-lanceo-
lata. duo interiora parum breviora. basis labii cymbiformis
limbus cordatus apice acuto descendente.

Longifolia Lemp bulbis fibrosis foliis ensiformibus sessilibus floribus pendulis Linn
S.V. pag. 615 Flor. Dan. Tab. 267

Helleborae angustifolia palustris s. pratensis Bauh. pin. 87

Expectis foliis ensiformibus caulinis, floribus pendulis
labello obtuso per oras plicato Hall. herb. 1296 Tab. 39

Habitat in Europa

Caulis cubitalis pubescens. Folia caulina cincta septem, inferius
brevius ceteris obtusius: superiora ensiformia amplexicaulea
bipollicaria acuta sensim minora et angustiora. Spica inter
dum 15 florum floribus duplo majoribus quam in latifolia,
penduliflori trachea lanceolata longitudine germinis
Petala tria exteriora ovata lanceolata viridi purpurea pelosia
licula. Duo interiora breviora obtusa albipallide rubra. Labium
petalis longius basi cymbiformis limbo subrotundo emarginato
denticulato. Germin villosum.

ensifolia Ser. *ensifolia* bulbis fibrosis, foliis ensiformibus distichis bracteis
minutissimis, floribus erectis: nectarii labio obtuso petalis brevioribus
Lan. Suppl. p. 404. P. V. pag. 315

Eupactis 1290 B. Hall. hist. fl.
Habitata in Germania, Helvetia
Differt ab antecedente quod tenerior folia angustiora longiora
attenuata nervis tribus reliquis evidenter. Flores minus
bracteis minutissimis

nubra ser. bulbis fibrosis foliis ensiformibus, floribus erectis: nec tamen labio
acuto Lin. l. v. pag. 816. fl. Dan. tab 345.

Elleborines genus v. Clu. J. Panon. p. 33

Epipactis caule pauciflora, Labello lanceolato lineato
lineis undulatis Hall. hist. n. 1299. Tab. 42

Habitat in Europa

Labellum longius quam in binis ^{precedentibus} sequentibus argute mucronatum
lineasque percurrentes undulata. in sequ. albo Labellum minus
lobatum. Folia sima ovata sursum longiora lanceolata. Bractea longitudine
germinis. flos uniter q. erecti. Petala extus pubescentia. tra. caute
nova lanceolata. in denora latera breviora saturate purpurea
labrum ovato lanceolatum lineis pallidis septem undulatis punctum

Halleri Synon: potius ad lancifoliam spectat

lanceifolia f. bulbis fibrosis, foliis ovato lanceolatis bracteis longitudine capsulae, floribus erectis. Neitanii Labio obtuso petalis brevioribus Lin. Suppl. pag. 408.
P. Spreng. 815

Helleborine flore albo vel Damascenum montanum latifolium
P. B. Rn.
Epipactis caulis pauciflora, lineis in obtuso labello levibus Hall. herb.
1298. Tab. 4. a.

Habitat in Germania, Helvetia

Caulis pedalis glaber foliis ^{inferiorum} brevibus latius superioribus
ovato lanceolata amplexu ^{multinervis} calicis. flores magni bracteis florem
longitudine.

Hallenii Synonym. notus ad verbum spectat

Polytaehya serapeas; caule subdiviso geniculato, foliis oblongo-lanceola-
tis, racemo composito terminali; necitani labio ovato recurvato
Sw. prodr. pag. 119.
Habitat in Jamaica, Hispaniola &

Flava ser. caule subdiviso genuiculato, foliis oblongis lanceolatis, racis
nis compositis axillaribus; labio nidoani erecto acuminato Sw.

prodr p. 119.

Jamaica, Hispaniola &

Bulbo fibroso

regularis Serapiae bulbis fibrosis, foliis ensiformibus, scapo vaginato, corollis
hexapetalis

Thelymitra longifolia Forst. gen. 44

Serapiae regularis bulbis ovatis fibrosis, foliis vaginantibus ensi-
formibus canalicatis, scapo erecto spicato, corollis hexapeta-
lis Forst. prodr. pag. 54

Habitat in Nova Zeelandia.

Folia radicalia non vidi. Scapus foliis quatuor vaginanti-
bus superne petulis ^{capitata} lanceolata pollicari glabris uti
tota planta. Flores sessiles spica parum flexuosa 6-8
floris bractea lanceolata acuminata.

an *Syfa*

Lepha Adnif foliis cordatis petiolatis, floribus solitariis: limbo trifido aequali,
bractea ovata, caule volubili frutescente Hort. Kew. p. 311 T. 3.

carinata . S. foliis lanceolatis pilosis nervosi, flombus spicatis axill.
fl. guian. pag 116. tab. 320
Habitat in Guiana

non vidi

erecta l. foliis ovatis amplexu caulibus floribus erectis Thunb. fl. jap. pag. 27 +

l. V. pag. 816

Habitat in Japonia

Caulis ^{steris} flexuosus, irregularis, glaber, striatissimus. Folia circiter quinque alternata amplexu caulium: duo inferiora vagini forma; duo intermedia ovata, acuta integra nervosa, glabra, erecto-patula, pollicaria supremum lanceolatum, nervosum. Flores albi minuti Thunb.

speciosa L. foliis lanceolatis undulatis, floribus subsessilibus erectis. nec
tani labio lanceolato acuminato indiviso Jacq. coll.
Habitat

non vidi

falcata ser. folus ensiformibus convolutis falcatis, floribus erectis Thunb.

fl. Cap. pag. 284 h. v. p. 216

Habitat in Caponia

Caulis foliis vaginantibus teretibus, striatis. Folia vaginantia, acuta
nervosa, integra, glabra, falcata, digitalia circiter quinque. Flores spicati
Th.

tabulare Satyrium bulbi rotundis, caule folioso, labello trifido: *Caecilia medica*
emarginata Lin. Suppl. 402. L.V. p. 811.

tabulari Ser. foliis radicali linearibus, floribus purpureis
cas. nuss. Thunb. prodr. pag. 3
non vide

aculeatum l. bulbis rotundis, caule folioso, labello integro inermi aculeato
Lin. Suppl. p. 402. l. V. p. 111

aculeata L. foliis radicalibus subtenuis ensi, lorumibus stri-
tis, spica ovata Thurb. prodr. pag. 3.

non vid.

Lingua serap bulbis subrotundis nectarii labio tripido acuminato glabro petalis
Linguae her. P. V. 816

Orchis macrophylla Column. Ephraf. p. 321. 322.

Orchis montana Italia, flore serpyneae, lingua oblonga Bauh. Pin

Sequ. Supplem. p. 240. V. O. fig. 4.

*Orchis radiceibus subrotundis, galea conglutinata, longissime rostrata,
labellis trilobato, ovato lanceolato* Hall. hist. 1267.

Habitat in Europa australi

Caulis perithamnos pedalis vel ultra. Folii angusta lanceolata

bis 3 pollicaria inferora complicata. Specia pauciflora

^{interdum flor unicus}
Bractea ovata acuminata spathacea. Galea tripetala foliis
petalis ovato lanceolatis. Duo internodia extensibus adglutinata

acuminata. Habum lanceolatum basi lobis laterales rotunda
bi intermedia e lateribus petalorum inclusis. Lacina intermedia

longitudine aequali basi flavescens, pubescens, protuberantia
Linguae formi notata purpurascens

Cordigera L. bulbis subrotundis, necitani labio trifido acuminato maximo barbato,

Lin. S. V. pag 816 Spec. pl. pag. 1345

Habitat in Hispania Italia, Oriente
vix specie a lingua diversa

Lingua S.

esta 1. foliis ovatis amplexicaulis Thunb. fl. Jap. 27. Len. L. V. p 216

Habitat in Japonia

Caulis erectus subflexuosus, angulatus glaber furfuraceus. Folia
cuncta quinque alterna, amplexicaulia; duo inferiora vix
uniformia: duo intermedia ovata, acuta, integra nervosa
glabra erecta petala; supremum lanceolatum nervosum. Flo
res terminales spicati, erecti, albi, minuti Thunb.

falcata L. foliis ensiformibus involutis falcatis, floribus erectis Thunb.
fl. jap: pag. 20. S. V. pag. 816.

Habitat in Japonia.

Caulis foliis vaginantibus testus, puberulus. Folia vaginantia
ensiformia, nervosa integra glabra, digitalia. Flores terminales
pedicellati erecti Thunb. l. c.

non vidi.

valvata O. floribus fasciculatis, lobis lanceolatis Lin. Suppl. 403. L.V. p. 014
+ L.V. pag.

Habitat in Cap. b. spec.

Caulis perithamosus vel pedalis. Folia alterna plura. (6.) per totum
caulem, lanceolata subsulcata, basi latiore vaginantis. Spica
conymtosa absque distincto pedunculo. Petala tria superiora
subaequalia crata, supremum fornicatum. Lateralia pariter
tria. duo lateralibus inferioribus majoribus genitalibus, infesta crassa
scilicet oblonga obtusa petalibus minoribus. Labium crassius
scilicet, simile petalibus latentibus inferioribus

melaleuca
~~lanceolata~~

ser. foliis caulibus lanceolatis, spica fastigata
Thunb. prod. p. 3.

pedicellatum D. Scapo subnuda, racemo pedicellis filiformibus. Cassi Lin. Suppl.
pag. 402. P. V. pag. 812.

pedicellata Scop. Folia radicali ensiformi striata, floribus
subracemosis Thunb. prodr. pag. 3.

non vid.

patens O foliis subulatis, nectarii labio brevissimo capillari Lin. Suppl.
pag. 404* S. V. p. 014

Habitat in C. bono spei 4

Cauli palmari vel spithamow longitudinaliter vagini ^{apicis} vagi
nis apice foliaceis subulatis. foliis radicalia plura ~~subulata~~ polli-
canei. Flores duo ad quatuor masculi. Petalum primum cor-
datum, acutum, secundum et tertium mucronata oblonga sub primo
quantum et quantum semicordata, sub lanceolata, longitudine
primi labium brevissimum. Bractea vix longitudine germis

Sesuvium patens Thunb prodr. pag. 3

Epid. ~~ochroleucum~~

Andrachne