

Serana Schneck. in Act. Soc. hort. Nat. Gafna  
Tora. 3. p. 2. pag 125 et seqq.

Cor 4 petala. Q: 5 hyllus. Samara 3. longitudinaliter connate globosa, later  
ne in alam membranacea <sup>leam</sup> delatata.

Seriana

Habitat in S. Domingo herb. Thouini

Pauli angulatus; pubescens. folia vernata: foliolis subsplicis, qui possunt  
rie, ovato-oblonga, dentata-pinnata, basi acuminata, mucronata, glabra, supra  
nitida, densiter mucronata. Racemi corylopi. Pedicelli 4-5: flori floreli umbella  
ti, pedicellati. Samara 3, superne seminifera, rotunda.

Rabos

*Serana Paulenia* foliis ternatis, pedatis nudi, foliolis ovato-oblongis L. S V. p. 379

Jaeg. off. 3 t. 67 fig. 2.

*Serana scandens Trifoliate et racemosa* Plum. gen. 34. t. 113 fig. 2.

Habitat in America calidore, herb. ter.

Taleola lanceolata sublobata, crenata dentata, mucronata, glabra, caulis pilosus, hispitosus. Capsula alata

Prinuata *Serana* ali capularum petrae delatatis foliis ternatis: foliolis  
ovato lanceolatis, dentato-prinuatis Schumacher L. C. tab 12. fig. 1.

*Paulus pilatus hispitosus*. Taleola conica, glabra, mucronata, basi angusta  
ta per petroleum decurrentia

Rami purpurei angulati. ramuli ope lente villoso. Taleola ovata, caulis  
serrate, serratus obtusis mucronatis, ita que glabra, attenuata, 2-3 pol  
lucaria, lateralia parum minora, per petroleum decurrentia: petiolas  
tiales alatae. Cervus lateralis. Racemi axillares 3-4 pollicares. Pedunc  
ulus ful floribus circi ferus. Capsula oblonga, involuta membranace  
pedicellata, pollicares, exargente. Semen unicum ad medium regim  
ti. Taxus C. haluacabi

non vidi

Divaricata Paulinia foliis bitemnatis, foliolis ovatis acutis subcuneatis, petiolis nudis  
paniculis divaricatis, aliis capitulo sum ovatis Schr. prodr. p. 64.

Habitat in Jamaica

Tota glabra foliis nudis

Divaricata S. foliis bitemnatis foliolis ovatis integerrimis subcuneatis lucidas  
petiolatis, petiolis nudis. Schr. C. ed. Tab 12. fig. 2  
Panicula brevirostris, aliis capitulo sum postea dilatatis rotundatis.

non vidi

10 rameosa Paulinia foliis bitemnatis petiolis nudis soleolis ovato ferratis glabris

Habitat ad Rio Janeru⁹

Rami subspicentes. Siliqua <sup>breve</sup> petiolata bipinnata, lateralia mino  
ra glabra, membra recta recta acuminata, extrosum ferente  
Pedunculi foliis longioris at illas solitarii, flexuosi glabri  
cariniferi, cernue geminis spirallis. Pedicelli frusti subrapido  
truncus ovatus glaber, quadriangularis apice <sup>undato</sup> cuspido puberula  
style persistens trifidus.

rameosa B. ali capillarum postice dilatae antice <sup>sub</sup> fimbriatae soleolis  
ovatis profunde ferratis. loc. cit. tab. 12. fig. 3

presentabilis & *S. capularum* alijs postea dilatatis foliis biseriatis foliolis  
obovatis terminalibus redupis, petiolis aliatis Schum. C. c. Tab. 17. fig. 4

Habitat.

*Smilis mexicana* Differt racemiis sub paniculis.

Racemi branched

non videt

Cephalena & aliis capillarum <sup>semi</sup>ovalibus, foliis bivernati exenatis pubber-  
femineis: soleolis terminalibus subtriangularibus lateralebus - antis petiolis  
subalatis Rhen. Tab. loc. cit. Tab. 12. fig. 5

Habent

Racemi subfornicatis longitudine foliorum breviori

*Tuenda* 6 L. alii capillanum <sup>leimi</sup> ovalibus foliis heteromatis foliolis ovatis acu-  
tis ferrati petiolis subnudis. Schurm.

Glabrat in Apula N. Cruci

*Folia apice lucida* Flores racemos paniculati, panicula biuncinata  
Rami glabri foliis folia petiolata. Foliola ovata atque  
attenuata verpi apicem atque 2 ferrata venosa super  
interna pellus pallidiora. Scopulae Racemi axillares composta  
balyces rubricando unesi ut petiolat redicilli e villosi tenuestrigis  
ovulis armato redit