

Seriola

Calyx equalis. Semina fusiformia striata scabra. Pappus sty-
latus plumosus: radii lobi coloribus

Eichoniifolia *Senecio* hispida, foliis inferioribus mucronatis, superioribus lanceolatis basi
laciniato-auriculatis

Hypochaeris orientalis, annua, foliis cithorii sylvestris Boeck. Lugd. 2. p.
264.

Achyrocephalus hispitus, cithorii folio Vaill. in Act. par. 1727. n. 7.

Habitat in Oriente. Ex herbario Vaillantii.

Hypochaeris pollicariath, inferiora runcinato-subpinnatifida: laciniis lanceo-
hispida lato, integerrimis vel intus versus unidentatis, terminalis ova-
to, acuta, dente uno alterove notata. Pedunculis glabri, uniflori
striatis, superne versus sensim crassiores, & quae una alte-
rare subulata dispersi. Calyx calyculatus; foliolis linear-lan-
ceolatis, hispidis. Pappus palea subulata. Semina striata^{ata} crenula-
ta.

~~Crepis~~

~~Crepis chondrolloides perennis lutea Boeck. ind. alter. 1. pag 84.~~

~~Habitat herb. Musj~~

~~Caulis herbaceus, erectus, ramosus, sulcatus, superne canescens. Folia radicalia petiolo
fu, pedali, ruginosa, pinnatifida: lacinis ovato-lanceolata, margine ope lentisvil
loso, dente uno altero notato: caulina sessilia, pinnatifida; pinna lanceolata
inferne inaequaliter dentata, etate glabra: suprema lineana. Flores copiosi, panicu
lati, Crepid. sectorem. Calyx immo tumentosus. Pappus sessilis, pilosus.~~

Cretensi F. hirta, foliis uncinatis Lin. S. V. pag. 721

Achyrocline hirtus, dentis leonifolio Caviter dentato Vail. in act. par. 740

Habitat in Creta

Caulis erectus subhirsutus, striatus. Folia radicalia petiolata, pithamea, basi attenuata, dentato serrata, costa pilosa, superiora sessilis, remote dentato-serrata, pilis raris in venis. Rami elongati. Folia caulina laniculata integerrima, basi laciniato auriculata. Pedunculi uniflori, uti calycis apertus hirsutus et pappi albis

Pappus implex sessilis

Corymbosa Seriola foliis cuneiformibus dentatis Len S. V. pag. 721.

Habitat in fuscis rupum Tuncti, Creta 4

Herbicum Radix perennis, lignosa, palmari et ultra, fusiformis, superne divi
runcum fusicaules plures

floribus am Polia radice lio, in rosetam aggregata, cuneiformia, in petiolum
pilis calycibus canaliculatum desinentia, plesu sequipolliciana, plerumque
vulva hirsuta glaberrima, longe, rarius pilis nonnullis superne versus apicem
foliis et longis dentibus varioribus, glauco-vindia, acutiusculis dentibus utrinque 3-4.

maiores remotis
qualibus capis erectis, stratis, paucifloris, glabris.
si mag. sepp. Pedunculi superne, 3-4, uni flori, basi foliolo parvo subulato,
p. 144 sub flore squamis 3-4 subulatis

Calyx subimbricatus: foliolis extimis brevibus, inopialibus: interis
ov canis versus apicem canis pilis lineapilonum hijida
seminis subulato, ad centem transverse strata. Pappus radicatus
sub plumofus

Pales membranaceo, lineares, acuminato, longitudine calyx ov.

uens & uens, foliis dentatis caule ramofo Lin. l. V. pag 721.

Heracium alpinum, dentis leonis folio acuto pelofo profuso, capatibus pun-
genti lanugine obfctis herb. Cath. y. Raj suppl. 146

Habitat in hieba

Calycis squamo affere spiculis pungentibus

non S.

Athronsi *S. hispida* foliis obovatis subdentatis Lin. l. V. p. 721

Hieracium multicaule, Bellidis foliis molli Boerh. app. O.

Hypochaeris calycibus aequalibus hispida Hort. Cliff. 305 + Hort. Upf. 240

~~Habitat.~~

~~Salis maris~~

Caeca radicalia, cuneiformia, bi- & tripollitana basi valde attenuata pubesca ~~et~~ dentata, obtusa. Scapus erectus paniculatus ~~hispidus~~ ^{interdum} ~~interdum~~ ^{glabrus}, ~~foetatus~~ ^{subnudus} ~~subnudus~~ ^{interdum} ~~interdum~~ ^{hispidus}.
Folium sub ramificationibus inferioribus oblongum dentatum
Pedunculis elongatis unifloris hispido sermi. Calycis valde
hispidi.