

Sensa

Cal. superioris 5-fida. Corolla infundibuliformis faucibus villosa. Stylus bifidus
foetida / Sensa

huc pertinet *Dysoda Loureiri* Turf

1 foetidam l. foliis oppositis ovato-lanceolatis, stipulis interfoliaceis staccis fungiferis
tibus, floribus axillaribus sessilibus den. Suppl. p. 150. + T.V. p. 220

Lycium japonicum: inermis foliis ovatis nervosis planis, floribus sessilibus
Habitat in China
Thunb. fl. jap. pag. 93 tab. 17.

~~Mantefi~~ home Gomi, & Mantefi Rempf. Am. Acad. 5. p. 700

Sensa Tuss: gen. pag. 209.

Habitat in Japonia, China Asia

Indes oxygalis erutus. Rami et ramuli pauci, oblique tetragoni
fili tenues glabri cortice cinereo, apice cernui. Folia bre-
ve petiolata, utraque acuta, glabra nervosa basi attenua-
ta, mucronata, integerrima opposita, unguiculata. Nodi
menta foliorum in axillis. Stipulae tres staccis interfoliaceis
parvi. Flores in ramulis & fasciculo foliorum sessiles erecti
solitarii vel aggregati. Perianthium monophyllum persistens
superum, ^{9.} quinque-dentatum. Corolla tubi superne ampliatum
limbus 4. vel 5. partitur. Calicis ovata, obtusa. Sicut villis calicis
su. Filamenta 4. s. tubo corollae adnata villosa. Stylus unicus
Stigmata duo villosa raro tria

Buchotia
L. Heister

~~Spermatocis speciei~~ minime Lycium diversis generis rubrae affinis