

# Seseli

1. *pumpeollodes* L. caule declinato, umbellis nobilebus nudantibus.
2. *montanum* L. foliis radicalibus bipinnatis pinnis lineariis, vaginis super-  
nis aphyllis, feminebus pubescentibus.
3. *articulatum* L. foliis bipinnatis lineariis trifidis, involuicellis subconnatis  
feminebus pubescentibus.
4. *glaucescens* L. foliis inferioribus bipinnatis, foliolis papularibus binatisque, pinnis  
trifidis, foliis superioribus indivisis.
5. *annuum* L. foliis radicalibus tripinnatis pinnis trifidis lineariis  
petioli ramosi ventri osi.
6. *hippomarathnum* L. involuicellis connato monophyllo, caule subaphyllo.
7. *elatum* L. foliis biterminalibus pinnatis ve inferis pinnis verticibus, feminebus peloso  
scabris.
8. *torresianum* L. caule alto rigido, foliolis lineariis fasciculatis.
9. *subvith* L. involuicere univesoli monophyllo, foliolis pinnatisque divariatis  
feminebus striatis villosis stylatis.
10. *anfractum* L. petioli ramosi caeteri integerrimis, foliis superadecompositis  
foliolis lanceolatis anfractis, fructibus ovatis.

11. pyrenaicum L. folius duplicato-pinnatis. foliolis incisi acutis, involuicellis seto-  
sis umbellula longioribus
12. fatifragum L. caule filiformi divaricato, foliis duplicato-ternatis linearibus,  
umbellis subpaucis
13. ammoides L. petioli membrana deffutis, involuicellis foliolis subulatis  
fruticulatisque simplicibus trifidisque

*Peseli unci folium folus unci formibus furcatis, superioribus oblongis integris,*  
*seminibus villosis Martia Schrad. Journ. f. d. b. t. b. pag. 450*  
*an Orthoceras sive Boeniculum magis odore spici Mons. Hist. 3. L. 9. p. 240. 47.*  
*cc. 2.*

*Habitat in abruptis montium altorum circa Bula R. 4.*

montanum Seseli petiolis ramiferis membranaceis oblongis integris, foliis caulinis angustissimis L.  
Spec. pl. p. 372 ~~Pl.~~ V. 289. Gouan ill. pag. 17

Meum secundum Matth. Es. 2.

Meum purum alterum Italicum Lobel

Meum latifolium diuiterinum Bauh. Pin. 140

Saxifraga montana minor Italica, foliis in breviores partes divisi Monf. h. 3. p. 272

+ Habitat in Gallia, Italia collibus. 7

Seseli multicaule Jacq. Hort. Vol. 2. t. 129. Confr. Vol. 3. p. 2.

Carvifolia Vaill. Parf. t. 5. fig. 2. x plurimo

+ Caulis pedalis teres, levis. Folia radicealia breviora, <sup>naucis</sup> dancina, bipennata, ad ter-  
tam sepe enervata, folioli subtripartiti. Caulis vagina petiolarum integra,  
pinnata: folioli ternatis, pennis tripartitis, linearibus, acutiusculis, remotius-  
culis, longioribus, canaliculatis. Umbella pedicellis brevibus. Semina pubes-  
centia ~~hinc vel sequenti proximo~~ vagina superiores aphylla

Petioli pariter utrinque solum pennatum: pennis 4-5. linearibus angustissimis uti  
reliquis - semina illora incana striata. Similis hypericoides herb. Royenii

foliis caulis radicalibus bipennatis pennis linearibus  
vagina superioribus aphyllis seminibus pubescentibus

<sup>pyre</sup>  
rensum *Seseli* foliis duplicato-pinnatis: foliolis incisè acutis, involuelli staccis umbellula  
longioribus Lin. spec. pag. 374 & V. pag. 289

Carvi alpinum. Bauh. prod. 24. p. 150

Habitat in Pyrenæis

Caulis pedalis, teres, striatus. Folia radicalia duplicato-pinnata, laxa, parum di-  
versata: foliola pinnata, longitudinaliter incisè, acuminatis, cuneiformibus;  
Folium in caule sepe unicum, ex cuius ala exit ramus; petioli radicales  
simplices, caulini lato membranacei. Umbella uni-versalis nuda, oblonga  
pedunculis cinctis octo; partialis conferta, brevissima unigloria. Involucris  
polyphyllo staccis, longiore umbellulis Lin. sp. l. c.

*Selinum pyrenæum*

*Selini specus ubi*

nubi ignota

nimpine. Des. Seseli caule dextrato, umbelli nubiliter nudantibus Lin. Spec. p. 372 & S. V. p. 209

Habitat in Europa australiore &

Folia pennata; pinnis multifidis, segmentis alternis; his etiam alternatim dissectis, segmentis linearibus, planis extrofum versis: Caulis pedalis, teres, ante  
floreſcentiam decumbens, sub floreſcentia ferme erectus foliolo uno altero  
se: petiolo membranaceo, spatuliformi, oblongo; e quo peduncululus simplex.  
Umbelle ante floreſcentiam nutantes ut in Pimpinella pini fraga: involucri  
universali nullo; partiali lineari angusto, longitudine pene umbellula.  
Semina ovalia, striis 3, elevatis Lin. Spec. l. c.

mibi haud satis cognita

Curvifolium L. foliis bipinnatis: calicibus densis linearibus, ramis erectis semi-  
nibus lobatis Will. fl. Delph. 2. pag. 506

non vidi

Chorophyllodes Seseli petioli ramosi membranacei ventricosi integri  
caule dichotomo paniculato, foliis supra et compressis glabris Thunb.  
prod r-fl. cap. pag. 51.  
Habitat in Cap. b. prae.



striatum Sepali petiolis ramosis membranaceis emarginatis caule striato  
nervulis pubulatis sulcatis Thunb. prodr. fl. cap. pag. 51.  
Habitat in C. b. p. c.

filiifolium Sefeli foliis filiiformibus, caule flexuoso erecto. Thunb prod  
fl. Cap. pag 51.  
Habitat in Cap b. pa:

articulatum L. foliis bipinnatis folioli linearibus trifidis, involuelli  
subconnatis, seminibus pulverulentis.  
Lepeli articulatum <sup>9</sup> in involucrio pelvisiformi *Plant. aust.*  
T. 1. p. 205. t. 5. fig. 12.

Habitat in Collibus austriacis.

Radix multicaulis caulis coronata. Caulis plures, juncti & glabri  
erecti striati ramosi. <sup>glauco viridi</sup> foliola bipinnata <sup>folia</sup> opposita  
remota quoad lineares sesquipollicares glabro, inferius  
absque membrana superiore petiolo membranaceo pinna  
du <sup>suprema simplicia</sup> Petioli striati angulati ad  
axilla gemula parum crassiora. Involucrum nullum  
involucella foliolis plurimis basi in pelvi connatis decidua  
semina oblonga.

Fragile S. foliis articulatis fragilibus: foliis linearibus - integris basiisque, vagi  
ni biblis Gouan illustr.

non vidi

glaucescens. petioli ramiferae membranaceae oblongae integri, folioli singularibus  
binatusque canaliculatis levibus petiolo longioribus Lin. Spei. pl. pag. 373x  
Jacqu. fl. austr. 2. t. 144.

Daucus glaucifolius, similis foeniculo tortuoso Bauh. hist. 3. p. 16.

Habitat in Gallia &

Caulis 2-4 pedalis uti tota planta glauca, nitida, foliariis tenuis  
sime striatus. Folia inferiora et radicealia bipinnata pinnis  
trifidis lineantibus, superiora pinnata pinnis indivisi longis  
pinnis subulatis omniumque albis terminata. Umbel  
la una convexa. Corolla ante expansionem purpurascens,  
umbellula fructifera caespitosa.

---

foliis inferioribus bipinnatis folioli  
pinnis trifidis <sup>superioribus</sup> indivisi

similis hippomarathro ad involuella polyphylla aei connata

annuum l. petiolis raris membranaceis ventricosis emarginatis hinc spec. pl. puz  
373. Jacq. fl. austr. 1. v. 55.

Libanotis tenuifolia germanica Bauh. pin. 148.

Habitat in Germania, Pannonia, Gallia O

Planta dulta Caulis striatus pedalis, simplex. Folia inferiora  
tripinnata superiora minus diversa pinnata vel bipinnata  
foliola inferiorum profunde trifida superiora inferiora superiorum  
breviter linearibus indivisa summorum trifida umbella  
convexa densa. Involucelli foliola lanceolata attenuata umbel  
lata longiora margine membranacea Involucrum 1 phyllum

fol. pinnis trifidis linearibus

foliis saduatis tripinnatis

Hippomarathrum s. involuelli connato monophyllis Lin Spei. pl. pag 9744  
Gaertn. fl. austr. 2. t. 143.

Daucus montanus multifido brevique folio Bauh. pin 150

Habitat in Austria

Caulis <sup>bipedalis</sup> tenuis, <sup>erectus</sup> <sup>et</sup> <sup>tota</sup> <sup>planta</sup> <sup>glauca</sup>  
ramosus, striatus, glaber. Folia inferne, superne  
vix ulla, bipinnata pinnis infimis linearibus superiora  
sub ramis petiolo cernante foliolo pennato, <sup>max</sup> <sup>super</sup>  
tentur mucronato. Umbellulae inaequales. Corollulae  
purpureascentes

montanum L.



elatum L. caule elongato geniculis callofis foliis bipinnatis: pinnis lineari-  
bus distantibus spec. pl. p. 375 & mant. 354.

Taeniolum sylvestre elatum, semulo folio longiori Vaell. Panf. 54.  
apuum montanum folio venuore Bauh. pin. 153.

Habitat in Aestria, gallia

Radix apice feli coronata. Caulis pedalis vel altior striatus  
excatus lavis teres, subtilissime striatus ramosus. Foliorum  
plurima radicalia pauca in caule, radicalia et cauli-  
lina inferiora bitermata nec interdum pennata pinnis  
triplicibus, media ternata, superiora simplicia foliola  
omnia teretia rigida mucronata subaristata super-  
ne feli coronata. Vagino apice biloba. Umbello  
radii plerumque 3, saepe 4-5 in culta plura, flosculi  
6-8 brevissime pedunculati. Involucella minutissima  
semine pubescentia

Planta in specibus plant. de ser. forte ab Rai d. weasa  
confertente ipso Linneo (vid. Gouanell. pag. 16.) quo forte  
mihi videtur potius ad T. Turbith. pertinere

Gouanell.  
p. 174.

elatum L. feli coronatum caule filiformi rigido, foliis bitermatis  
foliolis teretibus, seminibus mucronatis fucibus striatis &  
elatum L. foliis bitermatis pennatis <sup>confertentibus</sup> foliolis teretibus, seminibus  
mucronatis ped. filiformi - scabra

caulis altior, crassior, foliis caulibus pinnatis, umbellis multi  
radiatis, etate femine hirsutem deponunt

Compositae

*Loxosiphum* L. caule albo rigido, foliis linearibus fasciculatis Lin Sp. pl. pag

373\*

*Seseli maspileense*, fœniculi folio Bauh. pin. 101.

*Toenicalum Loxosiphum* Bauh. hist. 3. p. 16.

Habitat in Cuppa australi ?

Caule rigidus foliis multoties latior quasi *Cynopus*. Folia  
ca. pinnatis, non duo tantum opposita sed saepe quatuor  
inter omnes minoribus unde fasciculata  
cum figura Bauh. haud bene convenit deserv. Lin

~~Planta a T. Hoffm.~~

mibi ignota

Herb. Th. f. involucrio universalis monophyllo, seminibus striatis villosis stylatis  
Len. Am. acad. 4. p. 310 & S.V

*Thapsa foeniculi* folio Bauh. pin. 140.

Habitat in Europa australi &

Tota planta albida, glabra excepto semina. Caulis semper  
rigidus.  
Dalis et ultra <sup>senesime</sup> ~~senesime~~ striatus, ramosus. Folia radicalia mag  
na quadripartita, pinnis pinnis bi- & trifidis simplicibus  
que linearibus crassisculis. Caulis aequaliter  
minus densa, folioli pinnis que divariatis. Umbellula  
& radiata involucrio nullo vel breviphyllo. Umbellula  
parva globosa involucrio subulata umbellula longior

<sup>supra</sup>  
Radix apice fetosa vaginis striatis caule in fronta  
na minuta humilior foliis minus compositis pinnis  
brevioribus crassis

folioli pinnis que linearibus diva  
riatis

an <sup>Lejeli</sup> statum leguminum petiolis rameis submembranaceis laxis integerrimis, foliis  
supra decompositis: foliolis lanceolatis aristatis; fructibus ovatis Hort.  
New. 1. p. 359.  
Habitat in Pyrenaeis ♂

mihi ignota

*Styragum* *sefeli* caule filiformi divaricato, foliis duplicato ternatis linearibus; umbellis  
subsexfidis Lin. Spec. pag. 374\* S.V. p. 209

*Pini pinella fatiifraga tenuifolia* Bauh. prod. 84. Pin. 160.

Habitat ad lacum Jenerensem, inque germania

Planta pedalis. Caulis filiformis, ramosus et subramosus, divaricatus, teres, tenuis  
Folia parva duplicato ternata, linearia, raro lobata. Umbelle nuda, pedunculata  
sexfidia; umbellula involuata. Pappi 6-8. Involucella ~~se~~ <sup>acca</sup> ~~lin~~  
L.C.

michi nota

ammoides L. foliis radicalibus pennatis: pinnis multifidis, caulibus pinnatis  
si pinnis petiolicis indivisis, umbellis lateralibus.

Ammoides B. pin. 159.

Septi ammoides petioli membrana destituti Lin. Sp. pl.  
pag. 373. & Jacq. bot. Tab. 52.

Habitat in Europa australi et Barbaria O.

Caulis subdichotome ramosissimus semipetalis erectus teres  
vel striatus. Folia radicalia ambigua linearia lanceola  
ta pinnis oppositis pennatifidis, inaequalibus brevibus caulibus  
latioribus membrana petioli brevis. Folia caulium an  
guistissima. Umbella copiosa laterales et terminales  
limina glabra involucellis subulatis, spatulatis  
vel trifidis.

Septi ammoides petioli membrana destituti, in  
lucellis folioli subulatis, spatulatisque simplicibus  
trifidisque Jovan. Ill. pag. 16.

Ammi mattheoli Dalech. bot. Gys.

Ammi matth. com. p. 261.