

Sesleria

Coerulea P bracteæ integre, spica puberula
Cynopurus coeruleus bracteæ integre Lin. S. V. *Paucis m. p.*

2. p. 66

gramen glumis variis Brach. prodr. 21. pen. 10. Scheuchz. gram.
Pag. 83.

Sesleria coerulea *Cestros p. m. p. l. p. h. d. 6. fig. 3, 4, 5*
spica subcylindrica Ard.

Habitat in Europa paucis uliginosis & byzantinis
gramen caespitosum foliis falliformia conduplicata convoluta
truncata Culmi nodis cretus pithamou simplicis p. m. p.
aptyllus inferve vagina affixa in folio brevissimo desinente
tectus spica terminali ovata ^{trifloris} ut magnicelani bracteæ
ovata integre acuminata calycis ^{trifloris} valvula concavata acumi
nata corollæ oculo armata villosula ater tridentata alter
bidentata

Coerulea Sesleria spica ovata - spiculis subtrifloris bracteis aristatis

Hallerus quoque distinguit ea igitur cum Sphoro
cephalo. proprii generis

lobata *S. pica subrotunda involucreta* - spiculis subsuefloni an
habita Masli. T. Enci: 1. p. 190. t. 47. fig. 2.
Habita in Barbano

michi laudati not.

Edenston M.

Spherocephala. S. speciosa subrotunda involucriata: speculis subbiflori mutua

inermis *Volthameria inermis* foliis ellipticis, calycibus dentatis.
Volthameria inermis a mis inermibus. L. S. V.

Differt ab *angustifolia* foliis laevioribus brevioribus utraque acutis
non vero attenuatis, calycibus dentatis corollis triplo longioribus