

Sicyos

- 1 angulata S. foliis angulatis
- 2 laciniata S. foliis laciniatis
- 3 garcini S. foliis quinque partitis crosso dentatis fructibus ciliatis

angulata L. *Folius angulatis* Lin. L. V

Cucumis bryonoides bisnagaria, fructu parvo Pluk. Phyt. 26. fig. 4.

Bryonoides flore et fructu minore Dill. Elth. 50. Tab. 51. fig. 59

β. *Cucumis canadensis* monospermus, fructu echinato Herm. parad. 100. Tab.

133.

Habitat in Canada Mexico

Subtrifida

Caulis raris pilosus. Folia quinqueangulata angulos acutis
remote denticulatis. Petioli et pedunculi pilosi. Pedunculi et axilla
res masculi longiores foeminei breviores ex eadem axilla.
Flores in apice subumbellati. Fructus setis rigidis adpressis

laciniata L. foliis laciniatis Lin. LV

Siccoides fructu echinato, foliis laciniatis Plum. spec. ic. 243.

Habitat in America calidior

garcini L. foliis quinquepartitis eroso dentatis, fructibus ciliatis Mant. 297

L. V. pag. 870

Sicyos garcini foliis quinquepartitis: laciniis dunci formibus quinque
fidis cum acumine Burm. ind. 311. t. 57. fig. 3.

Habitat in India orientali et Arabia Felicitiana
Caulis filiformis glaber. ^{folia quinquepartita} folia ^{inter media acumi nata} in partibus laciniis ^{axillares} lobatis
dentatis lateralibus bifidis. ^{axillares} stipula subrotundo ciliis
longis in margine. Rami simplicis. Pedunculi simpl. solitarii
axillares uniflori. Baccæ magnitudine pisi disperma
feminibus oblongis

Edulis hie yos foliis angulatis basi cordatis, fructu oblongo echinato.

Sw. prodr. pag. 116.

Sechium Brown sem. 355.

Sechios edulis

Garq. Amer. 250. tab. 163.

Habitatio India Occidentali C