

120

120 heptagyna herb Jus hab Domingo

Sida mollis foliorum cordato-orbiculatis acutis duplicato-crenatis, pedunculis 1-2 floris
longis, petalis crenatis Ort. Dec. pag. 65

Habitat in Per. 5.

Caulis fruticosus, quadripedalis, albo pilosissima, erectus, raris ramosis. Folia cordato
orbiculata, acuta, duplicato-crenata, utrinque pubescentia, mollia, petala 7-9 nerva
subtus venosissima. Petioli longitudine sepe solummodo 7-8, superne et inferne compressi.
Stipulae subulatae, deciduae. Pedunculi axillares, solitarii, petalo longioris, uniflori
sepe biflori. Calyx pentagonus. Laciniae ovatis acutis. Corolla lutea calyce duplo
longior. Petala unequaliter crenata. Stylus 10 fidus. Eruet ut uncinatus, 6-10 cap
sulani. Cappulae 4-5 per me Ort. ex

prostrata / Do

Habitat herb. Tusc.

Rami superne inani. Folia pollicaria, profunde obtusis & sine serratis,
utrinque mollissima, supra avenia, enervia, subtus nervosa, venosa,
cordata, obtusa. Pedunculi axillares, 2-3. Calycis inani. Stipula
lineares.

Salicifolia L. Da

Donner

Habitat herb. Mus.

affinis *angustifolia*. Rami Tenues, teretes, laxes, superne canescentes. Folia petiolata, ut *polliniana*, remota, lanceolato-oblonga, serrata, arenis, supra glabra, subturmicana, stipula setacea. Pedunculi ex apice ramorum et axillis solitarii, uniflori. Calycis micani: laciniis ovatis. Capsula sphaerica, breviter, longitudine calycis.

urtica folia lida

Malva Indica frutescens hirsuta urticae folio longiori, floribus luteis minimis a fo
lionum alii Razi herbar. 2.

Habitat in India herbar. Mus.

Caulis, uti petioli, pedunculi et calyces pilosissimi, teres. Folia sesqui pollicaria
pubescentia, ovata, attenuata, obscure serrata, utrinque pilis raris in costa et nervis,
serrata, fere utriusque dicitur. Petioli folio 3 plo vel quadruplo breviores. Sti
pula fetalco, patentes. Pedunculi axillares, brevissimi, gemini, alter uniflo
rus, alter 3-4 florus: pedicelli breves. Calyx pentagonus, membranaceus: lac
nio attenuato, vix demarginato. Semina 5que, ni fallor mutica.

verticillata L. da

Habitat in herb. Tusf.

Rami vellosi, superne flarescentes. Folia vix pollicaria, cordata, ovata
quinque nervia, crenata, acuta, utrinque pilis stellatis, subtus pallidiora,
tenella utrinque tomentosa, incana. Pedunculi axillares, plures. Calycis
lobis ovatis, attenuatis, membranaceis, marginatis, pilosis.

pyramidata Lida

Habitat herb. Gusf.

Rami teretes, apice canescentes. Folia bi- & tripullicana, cordata, parum
attenuata acuminata, obtuse serrata, venosa, glabra, subtus pallidiora, scabri
infusa, punctis stellatis pilosa. Petioli fere longitudine folii. Stipulae
setae. Peduncululi versus apicem, at illos, subraemosi.

calycina Lida

Habitat herb. Gusf

Rami intricati, villosi. Folia bipolliciana, petiolata, cordata, ^{gibberata,} ^{articulata,} [?]
grossè crenata, supra glabra, subtus canescentia. Pedunculi axillares, uni
flori. Calycis laciniis ovatis.

plumosa Lda

Habitat herb. Gruf.

Caules prostrati, pili adpressi. Folia petiolata, oblonga, unguiculata,
obtusè serrata, basi vix integerrima, supra glabra, avenia, enervi,
subtus nervosa: nervi pilosi. Flores terminaliter aggregati, hirsuti

flavescentida

Habitat herb. Guss.

Rami perenne, uti folia et calyces tomentoso flavescentes. Folia ovata,
ut polliciana, cordata; ovata, subrugosa, subtus venoso-nervosa, reticu-
lata. Stipula setacea. Pedunculi axillares, quaterni.

repens L. da Caron.

Habitat in Lema Donbey

Caulis annuus, ~~scissus~~ ^{striatus}, elongatus, teretes, superne raris pilosus, simpliciter.
Folia petiolata, six pollicaria, cordata, acuta, crenata, crenis interdum bifidis,
subtus raris pilosa, supra glabra. Stipulae setae. Pedunculi ex apice
ramulorum axillares vel axillis, gemini, filiformes, folio breviores,
medio geniculati, versus florem incrassati. Calyx laciniis ovatis, margine
villosis, in nervis. Saecula convenit cum L. da missa a West et quam maxime
similis

rotundifolia Ledeb. & Mark

Habitat hec tuis

Caulis ad presens pilis exstantibus, superne canescentibus. Folia ovata, basi subior
data, obtusa, utrinque tomentosa, mollia, nervosa, supra pubescentia, subtus rufescentia,
obtusè serrata. Stipulae setaceae. Pedunculi axillares, solitarii, longitudine folii
uniflori, ad apicem ramorum conferti.

Stipulans Sida

Habitat herb. Guss.

Folia sesqui pollicaria, rhombica oblonga, ex trofem obtuse serrata; serraturis mucro
natis, acutis, basi obtusa, remote nervosa, arenia, utrinque glabra. Stipula petioli
longiores, fere semi pollicares, lineari-lanceolatae, attenuatae. Pedunculi axillares,
solitarii, uni flori, stipula dimidio breviores. Calycis laciniis ovatis, attenua
tae.

multiflora Da

Habitat herb. Gusf.

Saxos malva spicata, tomentosa, incana. Folia cordata, mollia, obtuse
serrata, sesquipedaliana, supra glaberrima, v. indurata, avenia, nervosa. Pedun-
culi axillares, aggregati

Longlo merata Lda

Habitat herb. Guss.

Rami flexuosi, flavescens stellato pilosi. Folio breviter petiolata, pellucida
vires, subhomboidae-oblonga, inaequaliter crenulata, villosa, supra minus, sub
tus mollia nervosa, supra remota lineata. Nervis lanceolata, attenuata,
unguiculata. Flores plures, axillares, sespites, flavescens villosi.

Dacrydium rhombifolium

Chinensis Sida

Habitat in China Inicarville herb. Fus.

Rizoma. Caulis teres, scaber, ramosus. Folia bipollicaria, cordata, attenuata, crenata,
non incana. Rami foliosi et floriferi. Stipulae parvae, subulatae. Pedunculi
axillares, uniflori, cum muculo 3-5 floro. Pedicelli pollicares, filiformes
medio geniculati. Calycis lacini, acuti, marginati. Pappuli 5que, trique
tro, bicornes.

lenifolia Lda

Malva hispida gramineo folio Barren equinoct. 72.

Habitat in Juana herb Guaf.

Caules plures, erecti teretes, hirti, basi ramosi. Folio petiolato, 1-2 pollicana,
lanceo-lanceolata, attenuata, utrinque pilis adpressis, supra rarioribus, acutius-
culis egerrima. Stipula subulata, unguis Pedunculis terminalibus; Flores ap-
proximati, racemosi. Calycis lacinae crata. Capsula s. que, 1 per no (mucro
ne brevis)
variet foliis angustioribus et latioribus

Lanceolata L. Da

Habitat.

Similis pars superior L. Da rhombifolia. Folia lanceolata, glabra, uti cauli, remotius
secula serrata, basi integerrima. Stipula subulata, unguicularis. Pedunculi folii
tarsi, uniflori, stipula, breviores

bivalvis lida

H. abitat herb. fus.

Caulis pilosus, teres, striatus, superne pelosissimus. Folia bif. tripartita, cordata, albenuata, simpliciter venosa, quinque nervia, utrinque villosa, late gemina vel obscure remote dentata. Petioli pilosi, foliis fere aequantes. Stipulae subulatae, unguiculatae. Pedunculi axillares, solitarii, uniflori, stipula brevior

Induciofida

Habitat herb. Guaf.

Caules in ano tomentofus, fuperne uti petiolus pilis longis exftantibus. Folia petio-
lata, tripollicaria, attenuata, extrofum utrinque lobo brevi, feptem nervis,
utrinque in ana, mollifima, fupra avenia, fubtus venofa, crassa, e venis
excurrentibus remote denticulata. Nervi unguiculari, fetaceo, pilofa. Petio-
li longi. Pedunculi axillares, folitarii, uniflori, fere tripollicares fuper
ne geniculati. Calycis laciniis ovato, acuto, unguiculari. Capsula
magnitudine fere S. inducio, rotunda.

trifloru Sida

Habitat herb. Ausp.

Rami teretes, pilosi, superne incani. Folia petiolata, cordato, attenuata, estrosum obscure triloba, crenata, acumine integerrimo, sinu ciliato, septem nervis, utrinque mollia, subtus incana venosa, quadripollicaria. Petioli teretes, incani, foliis breviores. Siquis lanceolato, attenuato. Pedunculi axillares, geminati, pilosi, petiolo longiores. Calyces intus et extus incani, semipollicares: laciniis lanceolato, acutis.

viscosa Sida an Cavan. an L'Herit. 2

Habitat Herb. Guaf.

Rami incani, superne subtriquadri. Tolia bi- / tri-pollicaria, petiolata, cordata, acuta,
inqualiter dentata, 7-9 nervia, utrinque mollia, villosa, asenia, subtus incana,
transversim simpliciter venosa. Stipula linear-lanceolata. Petioli bipollicares.
Pedunculi axillares, petiolo parum longiores. Calyces pentagoni, angulis exsternis
tubis: laciniis ovatis, acutis. Capsula magnitudine S. indicis. 7, triperma

populi folia Swa

Habitat herb. Gusf.

Rami inani, superne triquetri. Folia 2-3 pollicaria, cordata, attenuata, acuta et inaequaliter serrata crenata, utrinque mollia, simpliciter venosa. Stipulo subulato, reflexo. Pedunculi axillares, petiolo longiores, superne articulati. Petioli longitudine foliorum, apice pilosi. Calyx inanis; intus pilis albi marginatus. Capsula pilosa, magnitudine Cerofi.

acutissima Lda.

Habitat herb. Guss.

Rami teretes, indivisi. Folia bipollicaria, cordata, acuminata, acuta, utrinque mol-
lescentia, 7-nervi, aserica, obscure crenata. Pedunculi axillares, biflori.
Petiolo brevior. Capsula rostrata, minore quam in Lda indica.

expipulata Lda

Habitat herb. Guaf.

Rami inani, uti folia puber et calyces. Folia cordata, valde attenuata, 3-4 polli-
cario, pendente, obsolete crenata, utrinque mollia, supra viridiora, infra et
puber nervosa, obscure venosa. Petali longi, apice hispiti. Pedunculi at illorum
hispiti solitarii, uniflori, pollicares. Calycis laciniis ovato, attenuata.

reflexa Du

Habitat herb. Guj.

Rami teretes, subrescenscentes. Folia per se spatulata, cordata, crenata, acuminata,
9 nervia, subtus venosa, canescentia. Petioli tri-pollicares, inani. Squilla lan-
ceolata, reflexa. Pediculi axillares, quinque pollicares. Flores nutantes.
Calyces inani, semi-pollicares; lacinis lanceolato.

vesicularia

Habitat herb. Yusf.

Rami intricati. Folia tri-pollicaria, cordata, attenuata, 7-9 nervia, mollia, juncea
pubescentia, subsessilia, obtusa, profunde crenata. Ripula setacea, patens. Petioli
longitudine foliorum. Peduncululi axillares, longitudine foliorum, uniflori. Calycis lati
tus, ovato, incurvus.

cruspa Lda

Habitat in Penn Dombey

Folia sesqui pollicaria, cordata, acuminata, utrinque mollia, supra
lesolia. Pedunculi axillares, sesqui pollicares, solitarii uniflori,
capillares, superne articulati, supra articulum ramum crispum
efferre videtur foliis rotundioribus, caule et ramis pilosis, venis
profundioribus et majoribus

microperma Lda

Habitat herb. Gu!

Rami teretes, villosi, canescentes, flexuosi: Solu petiolata sex semipollicari
cordata, obtusa, obtuse crenata, quin quiescunt, axilla villosa
pubescente. Rhizoma maculato, setaceo. Pedunculis axillaribus, solitariis
ni, petalo crassiore, usi flori, semicirculari. Calycis laciniis ovatis,
acutis, fimbriatis. Capsula triloculari

venosa L. da

Habitat herb. Aus.

Rami teretes villosi. ramuli pilosi. Folioa profunde obtuse serrata. Peduncul.
axillares, solitarii vel gemini in ramulis, pilosi, semipelticatos. Paly. et
capsula villosa.

Sida

Habitat

Herb. Desfont. 5

Index. Rami teretes, subanascenscentes. Folia petiolata, cordata, ovata, acuta, supra glabra, subtus vix villosa, sesquipollicaria, squa nervis, serrulata. Stipula subulata, rigida, subpurescentes, alba, adpressa, decidua, basi perisistenta. Petioli longitudine folii. Rami terminales et axillares, foliis breviores: pedicelli uniflori, brevissimi. Calyx subanascenscens: laciniis ovatis. Corolla parva, flava. Capsula 6, glabra, mutica, monosperma.

alcedes Sida.

Habitat in Carolina herb. Richard.

Caulis herbaceus, teres, superne scaber. Folia inferiora longissime petiolata, cordato, sesquipollicaria, obtusa, utrinque pilis raris adspersa, obtusa et inaequaliter serrata, interdum inferne pubescentia; superiora quinque partita, subpernatifida laciniis linearis. Stipulae lineares. Pedunculi axillares, uniflori, terminales 2-4 flori. Calyx uti capsula hispida. Stylus 10 partitus. Capsula 10. multica.

Sonneratia Sida.

Habitat in Ind. Orient. Rehb. Thunberg.

Rami superne tomentosi. Pedunculi axillares, solitarii, folio duplo longioris. Calycis
laciniis oblongis

habeo

bivalvis Sida

Habitat h

her-Thouini

Rami villosi, teretes. Folia petio lato, remota, sesquipollicaria, cordato ovata, attenuata
villosa, venosa. Pedunculi axillares, solitarii, uniflori, petiolo breviora. Stipulae
obovatae reflexae. Calyces tomentosi, aurati.

micans Lda

Habitat herb. Guaf.

Tota planta villosa. Vena topa, mollis. Folia petiolata, bipollicaria, cordato-oblonga, inaequaliter obtuse serrata, acuta, supra lincata, subtus nervosa. Stipulae fetacae. Pediculi axillares, quatuor, unguiculato vel minore, basi folio breviora. Terminales ungesti. Capsula globosa, margine crenulata, brossa, villosa.

multifida L. Da

Habitat herb. Lus.

^{in anu} Caulis prostratus; subdichotome divisis; pilosus, sp. tam dens. ^{bract. cord. orb., rot.} Folium 3-5 lobis: lobi
lineares, scabriserviuli, obtusissimi, subpinnatifidi, subtus piloserviuli; Peduncululi
in Dichotomia uniflori. Calycis villosi, in canis

canescens Lda

Habitat in Senegal herb. Guss.

Caules plures, fruticosi. Folia unguiculata, oblonga, supra lineata, glabra, subtus
incana, nervosa, serrata. Stipula fetacea.

pallida Sida

Habitat in China Incisarville herb. Fusf.

Ramiter dens, pubescentes, uti folia et reliqua partes, pallide videri. Folia breviter petiolata, bipollicaria vel parum ultra, lanceolata, acuta, basi obtusa, nervosa, venosis, argute serrata, basin versus integerrima, subbilata, supra glabra, subtus pilis raris. Stipulae subulatae, petiolo longiores. Pedunculi axillares et in ramulis, foliis axiis, uniflori, brevissimi. Capulae squae, nigrae, spermae, biconnes.

rotundifolia L. de la Mark.

~~Caulis adpressus pubescenti~~

Peche