

Sida

americana li caule fruticoso, foliis cordatis indivisis crenatis
acuminatis tomentosis, pedunculis foliariis unifloris Lin Ana
amon. acad. 4. p 400

Habitat in Jamaica.

eodem planta ac *Pida abutiloides* fide herb. Linn.

ex stipulari. R. tomentosissima foliis cordatis attenuatis obsolete
crenatis, stipulis nullis.

R. ex stipulari foliis cordatis acutis subtomentosis exstipulatis
pedunculis axillaribus solitariis unifloris petiolo brevioribus
Coran. Desf. p. 56. Tab. 14 fig. 2.

Habitat in insula Bourbon.

R. tomento tenui mollissimo canescens mox plerumque
rami superne angulati. Tota petalis duplo breviora, 5
vel septem nerva, vena vix ulla nisi rami nonnulli
nervi nervorum subtus albedo, crenato ^{obscure} ~~sub~~ ^{obscure} ~~sub~~
panda, valde attenuata, petali angulati. l. 1/2 pollicia
na. Petali angulati. Pedunculi axillares squipolliciares
uniflori solitarii superne geniculati. Calicis
ovato acuto. Corolla squipolliciana. Præter caly-
ce major tomentosus. Capsula subtuzinta monoper-
ma.

Sylvatica Sida foliis cordatis attenuatis subdentatis tomentosis, pedunculis axillari-
lanceatis geminis caule arborescente.

Sida sylvatica caule arborescente, foliis tomentosis cordatis longis-
sime acuminatis, pedunculis biatis axillaribus unifloris capsulis
monospermis Parvan. Desf. pag 56 2p. 276 tab. 133. fig. 2

Habitat in Peru

Caule arborescens valde ramosa, ramis pubescentibus. Folia
valde attenuata obsolete dentata tomentosa: inferna latiora
angulo lanceolata. Pedunculi petiolo longioris uniflori
calyx sive angulatus. Corolla calyce saturate sulphurea
fructus globosus. Cap. 36-36. Cav.

occidentalis l. foliis cordatis sublobatis, stipulis dentatis patentibus, pedunculis
caulis petiolo brevioribus, capsulis multilocularibus. Lin Am
ac ad 4. p. 325. Cavan. Desf. pag. 24. t. 4. fig. 3.
Abutilon vesicarium, flore, fructuque majore non in ipso Hill. Cat.
7. p. 6. t. 6.

Habitat in America O

Caules teres tomentosi ramosi. Folia longe petiolata
subtus appressa. Stipulae setaceae recurvae. Flores
axillares solitarii pedunculati. Calicis lacinae calycis
lanicolatae. Corolla fimbriata lutea. Fructus
calyce majori globosus pendulus. Capsula com-
pressispermis. Semina subplumula annata
Cavan.

mibi ignota

multifida Sida foliis tri- & quiescidi que, caule prostrato.

Sida multifida foliis multifidis, caule prostrato floribus
secundi versus terram seminibus alatis Cavan. Des.
pag. 25. tab. 4. fig. 2.

Habitatio arenosa Leon. O

Caulis teres, dichotomus ramis primis folia petiolata
profunde fissa laciniis lineariibus obtusis, subsinuatis.
Stipula lanceolata. Flores axillares solitarii
Calyx globosus. Corolla alba. Fructus orbiculatus capsula
20. Cavan

non vid.

triquetra foliis cordatis serratis subtomentosis: ramis triquetris Sprei
pl. p. 168. herb. 2. t. 110. Poiran. Desf. pag 26. t. 5. fig. 1
Sida trifoliata, caule trifoliato Jacq. Am. 26.

Habitat in America calidioribus

Subtomentosa mollissima. Rami superne triquetri. Folia pollicia
na, supra avenia minus tomentosa, subhis uniana nervosa
venosa, petioli breviora. Stipula setacea
pedunculata axillares, foliis triquetris petiolo breviora; capilla
res, uniflori. Fructus ^{presumptive pentagonis} calyce multo hie major. Capsula
sque glabra triperma mutua. Corolla flava
unguis purpureis

periploisifolia L. foliis cordato-lanceolatis ⁴ integerrimis caule paniculato Lin. S. V. 1 fl. Zeyl. 251

Alicia orientalis, scammonis folio, major, floribus albis

Pluk. alm. 17. t. 74. fig. 7.

Abutilon periplois acutius folio, fructu stellato Dill. Elth. 4. t. 3.

supra glabris

fig. 3.

B. ~~Abutilon~~ amplissimo folio, caute ~~velloso~~ Plum. Spec. 2. v. 3.

~~Sida~~ foliis subrotundo-cordatis acuminatis integerrimis

Boyer Syst. 350

Habitat in Armenia Calidum et Zeylona Ot

Caulis villosus, teres, ramosus. folia petiolata basi cordata sinu aperto attenuata supra glabra subtus ^{avena} in cana venosa 3-4 pollicaria venella subtus ^{venum} nescienti femineae ^{pa} stipula parva subulata adnata petioli villosi 1. vel 2 pollicares pedunculi filiformes inferiores axillares solitarii petiolo longiores uniflori. superiores terminales racemosi remotissimi laxe bit. 3 floris capella

pedicelli capillares superne geminati floris parvi
Capsulaeque nigricantes nitida tapperino. Semina pubescentia.

atenuata L. Tomentos mollissima foliis cordatis attenuatis integris
nervi sine clauso, floribus terminalibus racemosis

Habitat in Insula Franco-Thoria

Tota planta tomentosa tenui mollissima affinis
perploisifolia in nonnullis, tamen specie differe
videtur. Rami non villosi, pubes compressa sed tomento pubis non visi-
bilibus; folia basi rotundata - orbiculata non sine
clauso ut fere peltata apparent, magis acuminata
quam attenuata utriusque illius mollissima tomentosa
terella fittus non tomento ferrugines sed in ano-
racemio fructu ^{quom} in illa pediculis trifloris
capsula glabra ^{semina rubescunt} pedunculis inferiori axillaris
uniflori

Palmyra Isd.

stellata Lida. foliis subrotundo-cordatis acutis integerrimis lina
Spec: pl: no 13. B. Caran. duj pag 27. Tab. 5. fig. 4.

Abutilon amplifolium foliis, caule villosis Num. 9. c. 3.

Habitat in America in Anp. St. Domingo 5

Caule fruticoso teres, valde tomentosus ramis paniculatis.
Folia longe petiolata mollia subtus albicantra. Stipulae
lineares villosae. Flores paniculati. Calyx triplo major quam in
Lida periplocifolia. Corolla magna. Stigmata 5que. Styli 5que
Inclusi calycis major Caran.

excelsa L.

Sida excelsa foliis cordato-acuminatis superne pubescentibus
glabris subtus villosi pubescentibus; floribus paniculatis
Cav. du. p. 27. tab. 5. fig. 3.

Habitat in Peruvia
arbor excelsa. Folia brevis petiolata. Stipula parva.
Calyx parvus lacina ovata acuta. Fructus calyce
multo major. Caps. sive bidentata Cav. du. p.

non ordi

ramosa L.

Sida ramosa foliis cordatis acutis inaequaliter et profunde
dentatis floribus ramosis, capsulis bivostratis
Cav. Desf. p. 20. t. 6 fig. 1.

Habitat in Senegali

Tota planta pilis mollibus vestita. Caulis ramosus teres.
Folia glaberrima. Stipulae lineares racemi axilla-
res. Fructus calyce majori Cavan.

non vidi

Cynosa P.

Sida cynosa, foliis cordatis crenatis tomentosi orbiculato-
acuminatis acumine producto capulis 7. P. Kunzmann
Rev. Desf. pag. 20. Tab. 6. fig. 2.

Habitat in Ins. St. Tom.

Caulis densissimus ramosus. Folia longe petiolata. Hi
petiole lati & breves. Flores axillares solitarii pedun-
culati pedunculi petiolo longior. Calyx maximus
angulis plicatis lacinis acuminatis spissis. Petala
lutea. Omentum calycis parum magis conico truncatus
Cavan.

non vidi

umbellata. S. foliis cordatis subangulatis subtomentosi, floribus am-
bellatis capsulis bivostratis am. acad. s. p. 4014 Jacq. hort. 1. 4. 56.
Cavan-dus. pag 20 t. 6. Sida major aspergens suffruticosa et subvellosa, foliis cordatis
45-7 et
tab 129 f. 2 subangulatis, capsulis depressis Brown. jam. 201. ?

Habitat in Jamaica

Rami teretes canescentes. folia petiolata remota iniqua
litis crenato serrata attenuata extorsum utrinque
sub ^{lopa} lobo obsolete nervoso venosa. Stipulae bi-spolle
canae. Stipulae tenues. Petioli foliosum breves. Pedun-
culi axillares fructiferi folio longiores. 3-4-5 flori-
m. ^{preure} Pedicelli unguiculares versus calycem geniculati.
Calyces villosi uti capsulae. Semina 3 2
Folia nonnulla obscure triloba herb. 4us

microperma L. foliis cordato-subrotundis acutis obsolete crenatis
caule flexuoso.

Sida microperma caule flexuoso ramoso, foliis cordatis
orbiculato-acutis quinque-nerviis, fructu vix
calyce major. seminibus minimis Cav. Desf
Mus 29. T. 17 fig. 4.

Habitat

caulis ramosus, teres. Folia longe petiolata obsolete
stipula capillares. Pedunculi axillares solitarii
petiolo parum breviores. Corolla lutea, fructus caly-
ce vix major globosus. Caps. 13. dehiscendo breviter
rostri ulnati. Cavan.

Sonneratia L.

Sida Sonneratia foliis cordatis crenatis acutis tomentosis
pedunculis crassis geniculatis erectis folio duplo
longioribus; fructu pelio stellato ornato Cav. Desf.
p. 29. t. 6. fig. 4.

Habitat in C. b. p. p.

Caulis ruber villosus ramosus. Folia longa petiolat
acuminata parva. Stipula subulata. Pedunculis axil
laris solitarii longi villosi. Petala lutea. Fructus caly
ce major truncatus capsulis 9. Cavan

non vidi

terminalis *S. tomentos* mollesima foliis cordatis sublobatis crenatis, ^{obtusis} pedunculo
elongatis floribus racemosis

Spica terminalis foliis cordato-sublobatis crenatis tomentos,
siapo longisimo spica terminali Caran. de J. pag 29. Tab
6. fig. 6. et Tab 199

Habitat in rupibus montibus Thauri

Caulis pedalis valde ramosis rami teretes inferne aphylli
folia petiolis breviora semipollicaria supra arena ob
scure sive nervia subhis magis incana. Stipulae
pubulata. Pedunculi terminalis 4-5 pollicares erant
apice flae pedicelli 4-5. Calycis ~~st~~ bractea sub
calyce pubulata. Calyx pilis densis tomentos lacini
ovatis. Corolla lutea extus purpurea calyce multo
longior. Capsula novem trispermis mucico lanugine
alba densa tecta

Rami et folia tomentoso-incana. Folia cordata, dependantia, utrius
que mollesima supra arena, sive enervia, subtus nervosa, obscura
venosa, crenata obtusa, semipollicaria. Pedunculus terminalis
elongatus. Bractea versus apicem racemosa. Calycis et capsulae bractea
hinc hinc tunc

~~calyptra~~ L. D. v.

Incupedata ^{1.} ^{tomentosa} ^{incana}, foliis cordatis ^{subrotundo} ^{tricuspidata} ^{subloba}
^{dentatis}.

Stem tricuspidata foliis cordatis subrotundo - tricuspidatis den-
tatis ~~tomentos~~ canescentibus, calycium laciniis intro-
sum cernatis Car. Desf. pag 30. t. 6. fig. 5.

Habitat.

Q
Folia planta tomentosa, canescens. Caulis lignosus ramosus
& basi deflexa. stipula setacea. Pedunculi axillares
solitarii uniflori longitudine petioli. Calyx pyramidalis
Corolla sulphurea. Involucris pyriformis truncatis. Caps.
9.

Erissa L. foliis cordatis sublobatis crenatis tomentosis, capsulis cernit inflatis multilocularibus crenatis repandis Lin Spci: pt. pag. 964 Mart. 445 Caron. Desf. pag. 30. Tab. 7. fig. 1

Abutilon americanum, fructu subrotundo pendulo & capsulis vesicularis crispis conflato Mart. cent. 29. t. 29.

Abutilon aliud vesicularium Plum. ii. 13. t. 25.

Abutilon vesicularium crispum, floribus melinis parvis Bell. Cat. 6. t. 5. fig. 5.

Habitat in Carolina, Providentia, Bahama
uti: tota planta e ^{tomento tenui mollissimo} ~~prae~~ ~~terribes canescit~~. Folia omnia petiolata cordata
subtus venosa s. que vel septem nervia, obtuse crenata
bi s. tripollicaria. Stipula setacea petioli folio parum
brevis. Pedunculi axillares filiformes supeme genicula-
ti. Lacinia calycis ovata acuminata. Capsula pelosa
parum major quam in amplexu auli
omnibus petiolatis
mollissimis obtuse crenatis, capsulis etis

Amplexicaulis Sida foliis cordatis acuminatis anguste acute crenatis mollescentibus
superioribus sessilibus, capsulis inflatis cernuis ramis pubescentibus
Sida amplexicaulis La Mark.

Habitat.

Rami vertes. vellosi minime rari, venis. Folia sup ramo
si folia sessilia per folliculata subtus albidiora. Stipulae
setae. Pedunculi capillares folio longiores, superne
geniculati. Calycis unicus proles tomento pilosissimi laciniis
ovatis fructiferis reflexis. Fructus subglobosus magnitudi-
nem pini spinosi pilosus. Semina 2 in singulo loculo
Cum l. crassa conjungitur a Cavan. Diversa tamen mihi
videtur
Sida crassa Cavan. Desf. pag. 225. Tab. 135. fig. 2.

supra arena et
sub arena

~~Pylwatu~~ L. D. in

indica L. foliis cordatis sublobatis, stipulis reflexis, pedunculis
petiolo longioribus, capsulis multilocularibus scissis
calycis longioribus Lin. Aman. ac. 4. p. 324. Caran. d. s. pag
33. tab. 4. fig. 10.

~~Althoea~~ ~~Cam. hort. 2. t. 1.~~

Althoea theophrasti similis Bauh. pin. 316.

Albidum indicum ^{Cam. hort. 3. t. 1.} Bauh. hist. 2. p. 959. Commel. hort. 2. t. 1.
Monf. hist. 2. p. 531. f. s. t. 19. fig. 4. &

Habitat in India

Raculis ^{extrosum} erectis villosis canescentibus. Folia petiolis breviora
cordata ^{sublong} sublobata ^{sublong} inaequaliter serrata crenato serrata
nervum acuminata, mollia. Pedunculi axillares
solitarii petiolo longiores uniflori. Laciniae calycis
lanceolato-ovatae. ^{in p. ang.} Corolla ^{in p. ang.} serratata flava. Calyx fructu
tus calycis major villosus incarnis Capsulis multilocularibus
crenis obtusis in specimenibus.

endica Sida foliis cordatis sublobatis, stipulis reflexis, pedunculis petiolo longioribus, capsulis capsulis multilocularibus scabris calyce longioribus
Lin. S.V. pag. 623.

Sida cordifolia Forst. deser. pag. 124

pubescens. Sida foliis cordatis sublobatis tomentosis, pedunculis erectis
hispidissimis unifloris, fructu tomentoso conico truncato Cavan
Dof pag. 33 t. 7. fig. 6.

Habitat in insula St. Dominici

totā planta pilis coarctissimis albis vestita. Caulis dumo-
ramosus. Colea longe petiolata subtus nervosa. Stipula
arcuata. pedunculi axillares petiolo longiores. Calyx
pentagonus. Petala alba. Fructus calycis major. Capsula
5. brevis et breviflora Cavan.

non vid.

asiatica l. foliis cordatis indivisi, fructibus reflexis pedunculis lon-
gioribus, capsulis multilocularibus hispida calyce brevioribus
Linn. l. v. p. 622. * Am. acad. 4. p. 244

Abutilon hispidum Rumph. amb. 4. p. 29. t. 10.

Melocoe Pheed. Mal. 6. p. 2. t. 4.

Alcea affinis indica Abutilon Duta, flore parvo, foliis molli-
bus profunde venosis, filiculis lanuginosis Plukn. tab. 126

Fig. 5.

Habitat in India O

asiatica foliis cordatis dentatis pedunculis ^{uni} multifloris petio-
lo longioribus; fructu lanuginoso mucoso Cavan. Desf.
paj. 31. tab. 7. fig. 2.

Caulis erectus, teris tomentosis; folia longiora quam late
subtus venosa. Stipula lanceolata reflexa
Pedunculi solitarii. Petala flava. Fructus
calyce major hispido immixto capsulis septatis
Cavan

nunc ignota

verte

incano tomentosa. Rami teretes. Folia 2-4 pollicaria, cordata, attenuata,
supra scaberrima, obscure venosa 7. nervia, subtus mollissima,
venosa, crenata, crenis mucronatis. Stipulae unguiculatae, lineares. Pe-
diculi tripollicares, uniflori, superne articulati. Capsula hirsutissima
lob. 4 usq.

Leptogyna S.

Habitat in N. Domingo herb. Guss.

punctata ~~Cochia~~ Longest A.
~~Habitat in China~~

Retz. obj. 6. p. 29.

populi folia L.

Ida stereosmichos folus cordato obtusis acuminateis dentatis subultra
tri, capsularum villosarum rostris brevibus Cavan. Diss. p. 53

Ida populi folia Cav. Diss. pag. 275. Tab. 120. fig. 2.

Habitat in Peru

Paulu Veser tomentosis valde ramosis viri sesqui pedali

Folia longe petiolata carnosae albido tomentosa, odo
re saponaceo grassiiisculo. Stipulae lineares breves

Peduncululi solitarii petiolo longiores salycis ante
florescentiam penduli. Corolla saturate flava. Capsula

rostrata tripermo Cavan

an Ida populi folia Cavan. pag. 32. Tab. 7. fig. 9 eadem

non vidi

Dentata Sida foliis cordatis inaequaliter dentatis acuminatis; pedun-
culis petiolo longioribus, Capsulis cornutis
Ex Anpula St. Crucis in West.

Habitus Sida indica, Caulis teres: ut superne
angulatus uti folia subtus mollispmis. Folia
3-4 pollicina petiolo parva, supra gla bre
vinda tactu tamen mollia subtus incana nervosa
venosa acuta. Petioli apice pilosi. Stipulae an-
gustissimae ^{reflexae} ~~presentis~~. Pedunculi petiolo longiore
superne geniculati. Calyx incanus laciniis
ovatis acuminatis. Capsula villosa 3b calyce
longiori infra apicem rostrata.

70

an Populifolia Cavan ut folia non carnosia

herba lida caulis tomentosa foliis cordatis subrotundis acuminatis dentatis
cutis ramis petioliis pedunculis que ~~pubes~~ pubescentis

Lida herba, caule herba foliis cordatis subrotundis dentatis
stipulis horizontalibus cornuum instar contra petiolum
directis, floribus solitariis maculatis
Abutilon hispidum Rumpf. ant. 2. lib. 6. c. 13. 7. 10. ?

Habitat ad margines agrorum et hortorum König

Rami teretes proter tomentum pilis longis frequentibus uti
petioli et pedunculis pubescentis. folia bipollicaria
superiora minora, extus obscure lobata a vellis densis
minutis utraque tomentosa pubes mollis supra obsolete
nervosa. Stipulae unguiculares subulatae patentes
pedunculi superne axillares solitarii petalo longiores
uniflori. Calyx incanus laciniis ovatis acuminatis
Fructus villosus incanus. Petala saturate lutea basi
purpurea

glauca Lida caule striato canoso - foliis cordatis orbiculatis dentatis
tomentosis glaucis Cavan. ii. 1. pag. 10. tab. 11. r

Habitat in Senegal. 4

Caules bipedales teres tomentosi canis uti et saepe tota
planta. Folia longe petiolata saepe scaberrima

et glauca inferne argentea tomentosa. Stipulae
lineares. Pedunculi axillares solitarii uniflori

petiolo breviori. Squamae duo ad geniculum

Calyx globosus. Corolla sulphurea. ^{fructus} Calyx tomentosus

20-30 Capsae mutuae 1-3 permo Cavan

abutilon l. foliis subrotundo - cordatis indivisi, pedunculis folio brevioribus, capsulis multilocularibus: corniculis bifidis L. S. V

Caran. des. pag.
34.

Althoea altera f. abutilon Cam. epit 660.

Althoea Theophrasti, flore luteo Bauh. pin. 316.

Habitat in India C

Caules ^{sepe} 4 pedales ramosi, tomentosi. Folia petiolis brevioribus mollissima parum circumscissa s: vel subsessile nervia. Stipulae parvae lineares. Pedunculi axillares solitarii uniflori superne geniculati. Petala calycis parva congrua. Fructus niger villosus pilosus magnus, supra planus. Capsula triloculari ^{triloculari}

cordatis ^{crenatis} - pedunculis solitariis ^{unifloris} folio brevioribus

obtusa. f. folus subrotundo cordati sublobati, ^{floribus} pedunculi umbellati
consulis multilocularibus. Carand. d. f. pag. 34. Tab. 9. fig. 2.
Vogel in Cent rar. plant. Trew. fig. 89

Habitat.

Caulis angulatus erectus ramosus folia serrata venosa villosa
petiolata. Petioli angulati folio dimidio brevioris dependentes.
Scipula magna lineari lanceolata acuminata. Pedunculi
axillares solitarii petiolo longiore pedicelli 5q3. Petala fulpurea
& rictus calycis major luteus. Capsula retroflexa acuminata
trijperma.

planiflora P. foliis cordatis attenuatis hollowis serratis pedunculis
petiolo longioribus pilosis capsulis rostratis

Sida planiflora foliis cordatis subrotundis acuminatis dentatis
serratis, capsularum rostris erectis solitariis, postea basi
longis villosis Caran. Desf. pag. 32. Tab. 7. fig. 4 et Tab
135. Tab. fig. 1.

Habitat in insula Francis

Caulis villosus tripedalis. Siliqua petioli longior. Squula
lanceolata. Calyx pedunculi petiolo longior
Calyx villosus. Petala calyce multo majora. Capsula
uniser 29. Caran.

Sida mauniana foliis cordatis acutis hirsutis induratis
pedunculis petiolo longioribus Capsulis multilocis
lanceatis hirsutis caule fruticoso Gaerq. Meso 2
p. 352. in var. Tab 24

~~mauniana Gaerq~~
ex mea eadem vel tamen varietas aluteli

exstipulata Sida

crassifolia foliis cordatis utrinque tomentosis, pedunculis petiolo aequalibus, capsulis
calyce quinqueangulo vix majoribus Hent. Prop. nov. 5. p. 125. 7. 60.

Habitat

non vidi an eadem ac *tricuspidata*

veficana Lda

Lda veficana folus cordatis dentatis subtulobis cunctis inflato
Capsulis decem pentaspermis Cavan. Des. p. 545. Tab. 14. fig. 3.

Habitat in Mexico 2

Caulis erectus fere glaber, tripedali. Solea magna petiolis brevibus
Lenato-dentata ^{tenue} ~~acuminata~~ molleca pectus albi antea
Sipula lineari. Flores solitarii in tro cornu dein erecti
pedunculati petiolo longiore. Calyx pentagonus. Fructus polyspermus
Cerasia magna magnitudine. Cavan.

non vidi

reflexa. S. foliis cordatis attenuatis mollibus crenatis denticulatis, corollis
reflexis

Sida reflexa foliis subrotundo-cordatis acutis tomentosis obsolete
crenatis, corollis magnis reflexis coriaceis. Cavan. Desf. p. 36.
Tab. 7. fig. 17. et Tab. 195. fig. 1 et pag. 94.

Habitat in Peru 5

Truncus 4-5 pedali ramulis petiolisque villosis. Folia mollissima
magna subtriangularia ^{crenata} albicanthia. Stipulae reflexae. Flores axillares
solitarii, pedunculati. lacinae calycis lanceolatae. Cavan.
Cops. 12.

non vidi

sinensis S. foliis ovalibus subtus tomentosis stipulis filiformibus Retz off 29

p. 29: no 94

Habitat in China

mihi ignota

Truncata 1. foliis subovatis dentatis rugis tomentosis apice rotundatis
(*Truncatis* Cavali.) Casan. Desf pag 35. tab. 6 fig. 7.

Habitat in 4 rupa N. Domini O

Caulis bipedalis ramosus tomentosus. folia parva basi corda-
ta. stipula subulata. Pedunculi solitarii longitudine
petiolorum uniflori. Calyx subrotundo pentagonus. Petala
sulphurea Casan

non vidi

lanceolatus L. foliis lanceolatis serratis & nervis linearibus acutis nervis
Vernoy Bot. obs. 4. p. 20.
Habitat in India orientali

persica Sida Burm. foliis inferioribus cordatis acuminatis: superioribus
sessilibus lanceo latis dentatis, pedunculo foliarii unifloro
Burm. fl. ind. Car. desj: pag. 35 tab. 4 fig. Sida Burma

nae
Habitat in Persia

Rami striati, vesetes glabri. Tota inferna per magna attenuata
glabra lucida profunde dentata; superiora tomentosa
ad basin denticulata superne uterque ma - Stipula setacea
flos axillari solitarii. Vermisales bini. Corolla lutea
Burm.

nae vidi.

arborescens. foliis cordatis ovatis acuminatis crenatis ^{Repten} quinque nervis
mollissime tomentosis, pedunculis axillaribus unifloris in ^{suppl}
pag. 307. & S. V. p. 622.

Habitat in Africa, Peru

Sida peruviana foliis subrotundo-cordatis acutis crenatis tomen-
tosis, pedunculis axillaribus unifloris longis, floribus maximis
stipulis lanceolatis ciliatis patulis Cavan. ^{disf} pag 36. tab
7. fig 8 et pag 276. f. 130

Tota ^{ramo} ^{exter.} tomento mollissimo tenui obducta. Caulis oxygali et
ultra. Stipulae petiolatae saepe palmatae acuta subtus venosae
et pallidiorae saepe se plerumque septem nervia stipulae
lanceolatae. Petioli saepe longitudine foliorum. Pedun-
culi axillares interdum gemini, uniflori petiolo longior.
Calyx pollicari laciniis ovato lanceolatis tria nervis
Corolla magna alba nervosa venosa. Fructus calycis
minor cylindraceo oblongus truncatus. Semina 3-5-
bica frugulo loculo.

biflora f. foliis cordatis crenatis tomentosis attenuatis ^{oblongis} inferioribus ^{subtr}
lobis, pedunculis axillaribus geminis

Sida biflora foliis cordatis magnis crenatis tomentosis, acuminata
productis: inferioribus oblongis ~~f~~ truncatis, floribus
geminis axillaribus.

Habitat

Paulus fruticifera ^f tenuis tomentosa, ramifera. Folia longe petio
lata. Stipulae lanceolatae. Pedunculi petiolorum longitudine
calycis magni. Petala magna lutea. Pavan.

non vid.

Dumosa L. foliis cordatis acuminatis serratis utroque glabris, floribus
paniculatis Sw. prodr. pag. 101.

Habitat in Tamaucan

Sida pyramidata foliis cordatis subrotundis magnis
dentatis panicula terminali flosculis numerosis
Clavan. des. p. 11. tab. 1. fig. 10 et tab. 194. fig. 1.

Caulis cortice ^{acer} griseo glabro punctato. Rami aperti
tenues subcaespitantes. Folia subtus pallidiora
oculo armato punctis pulverulentis supra sive
nervis subtus simpliciter venosa. Stipulae setae
Peduncululi superne in axillis calycis parvi confer-
tes parvi. capsula bidentata

Swartzii L. foliis cordatis serratis, apice attenuatis, caule virgato pedunculis
axillaribus filiformibus unifloris Sw. prodr. p. 101. sub nemore virgato

non vidi

virgata Lida foliis cordatis, ovato-acuminatis serratis, a petioli apice pendulis
petalis orbiculatis calycis brevioribus Cavan: u: et Desfr. l. p. 53. tab. 73x

Habitat in Peruvia

Caules erecti, virgati, uti tota planta scabriusculi, ramosi
Folia petioli longiora. Stipulae pubescentes. Calyx subpen-
tagonus. Petala lutea. Emittit calycis viri major. Capsula
bicornis 3-sperma. Cavan

non vidi

~~opala f. foliis ovatis acutis serratis glabris plantis, floribus ad basin ramu
lorum annotinum Graye Hort. New. 47. 169.
Habitat in Carolina ♀~~

althaeifolia L. foliis cordatis subangulatis obtusis serrato-crenatis utrin-
que tomentosis, rostris seminum calyce brevioribus. Sur. prodr. pag. 107.
Althoa flore luteo Sloan. hist. p. 210. t. 136. fig. 2.
Habitata in Jamaica;

an eadem ac multiflora et mollis Rohri?

procumbens L. foliis cordatis ovato-subrotundis serratis villosis, cau-
libus procumbentibus hirsutis Sw. prodr. pag. 101.

Habitat in Hispaniola

villosi

Rami tenues superne incani folia unguiculata subplicata
f. subtus incana. stipula minuto subulata. Capsula
aperte bistrata.

americana l. foliis cordatis oblongis indivisi, capsulis multiloculari
bus longitudine calycis: loculis lanceolatis. Lin. Spei. pl. pag
9634

~~Abutilon vesicarium; flore luteo, majus Plum. ii. 1. 1. 2.~~

Habitat in Jamaica

Folia duplo longiora quam lata valde tomentosa serrata
petiolo duplo longiora. Inflorescentia folio brevior.
Calyx tomentosus. Caps. magnitudine abutili 12
loculari tomentosa. Loculi dependentibus in acumen
lanceolatum longitudine ipsius capsulae, minime
ad suturam inferiorem exsertis. Lin.

brasiliensis ^{domentoso} foliis subcordatis ovatis attenuatis ^{acutis} crenatis, flori ^{bus} subsessilibus.

Sida brasiliensis caule tomentoso, foliis subcordatis ovato-acu-
tis crenatis: crenuli acuminatis florum numerosi par-
vis breviter pedunculatis Cav. Desf. p. 37.

Habitat in Brasilia

Caules teres ramosi folia longe petiolata sic stipula subsula-
ta flore longioribus. Flores in ramulis numerosi breviter
pedunculati. Calyx pentagonus. Cava.

arabica 1. foliis ovato-oblongis serratis pedunculis axillaribus solitariis
unifloris petiolo brevioribus Forst. arab. p. 124
Habitat in arabia ~~michi ignota~~

michi ignota

bicuspidata L. foliis serratis: inferionibus cordato-lanceolatis; superioribus
linearibus, capsulis bicuspidatis Aetz. off. 3. p. 37

michi ignoto

phyllanthos Lida

Lida polyanthos foliis crispis tomentosis imbricatis duplici-
ato trifido, petiolo floriferi Caran. Def. p. 276. Tab
RT. fig. 4

Habitat in Peru

Caules breves ramosi prostrati, foliorum vestigiis exasperati
Folia imbricata numerosa in summitatibus ramorum. petiolati
duplicato trifida ^{propinqua} laciniis lacios lateri ramosi tomentoso
supra alba subtus nivescentia. Stipula petiolo adnata
flores sessile solitarii in apice petioli inter stipulas.
Corolla folii major cocinnea Caran.

non vidi

-ternata L. foliis ternatis, foliolis serratis Lin. Suppl. pag. 307
L.V.

Habitat in Cap. b. p. ei

Stem triloba, foliis inferioribus cordatis crenatis superioribus
trilobis dentatis, medio lanceolatis Cavan. Desf. pag. 11. tab
1. fig. 11. et tab. 131. fig. 1.

Habitat in cap. b. p. ei

• Caulis teres ramosis glaber bipedalis folia petiolata
alterna glabra remota. Stipulae parvae lineares.
Pedunculi axillares filiformes bipollicares solitarii
erecti superne geniculati uniflori. Calyx angulatus
Caulis luteus

Caulis et folia villosa habet Cavan. Caps. 7. mutico

racemi flora s. ^{mollispm}
foliis ovato oblongis basi cordatis pubescentissimis; racemis
compositis.

Habitatio Infuli America meridionali

Rami veteres canescentes mollispmi. Folia petiolata
4-5 pollicaria, utraque mollia subtus incana, nervosa
venosa, basi sinu parvo excisa ovato oblongo subtembri
deca. acutiuscula integerrima vel extropem den
triculata. Stylus setaceo uti petioli incani longitudo
ne fere folii. Racemi ex ultimis axillis erecti, peduncu
cis parthalibus alternis, pedicelli breves approximati.
Calyx campanulatus incanus uti pedunculi lacii parvus
petiolo calycis parum longiora. Stylus 4fidus stigma
globosus

mollis. Sida herbaea patula flexuosa foliis brevi petiolatis
ovatis cuneatis utrinque mollissimis tomentosi floribus
axillaribus sessilibus albis Act. Soc. h. nat. Par. 1. pag. 111.
Habitat in Am. merid.

michi ignota

gracile lida subiculosa vixata gracilis, puberula, foliis oblongo-co-
datis fusiform angustatis reflexis ramuli fasciculiflori ad pi-
Par. 1. pag. 111.
Habitat in Amer-mex.

michi ignota

graminifolia L. Da herbae ca erecta vixata, foliis brevi petiolatis
longo-linearibus pilosis, corymbis terminalibus natis Act Soc. h.
n. Par. 1. pag. 111.
Habitat in am-mend.

non vidi

Unloba D. foliis inferioribus cordatis crenatis superioribus angulatis
supremis serratis.

Aroda Unloba: foliis inferioribus cordatis subangulatis
crenatis, superioribus unlobatis lobo medio lanceolato
longioribus reliquis inaequalibus, pedibus solitariis axillaribus
longissime pedunculatis Cavan. Dec. J. p. 39. Tab.
10 fig. 3.

Habitat in Mexico. D.

Caulis teres erectus subsaber ~~superfici~~ pilosus.
Folia inferiora crenata superiora quinqueloba
lobo intermedio ^{subpeltato} subseriato. petioli et pedunculi pilosi
stipulae lanceolae Calyx villosissimus
lacinis calycis ovato mucronato

Dillemana loba foliis inferioribus cordatis lobatis super
crenatis superioribus ovato-oblongis.

Abutilon lavadero flore fructu involuto Dill-Eliz
tab. 2. fig. 2.

anoda Dillemana foliis triangularibus: inferiori
bus crenatis superioribus obsolete crenatis longe petiola
ti pedunculis axillaribus longissimis Cavan
Dus J. p. 408 11. fig. 1.

Habitat in Mexico ☉

Tota planta pilosa. Caulis teres ramosis pedatis
et ultra. Folia petiolata inferiora 3 vel obscure
5que lobata. Pedunculi folio longiores. Follicula
calypis lanceolata

hastata. foliis cordatis angulatis serratis, superioribus hastatis, pedunculis
elongatis.

~~Anoda~~ *Anoda* *lida* cristata foliis angulatis inferioribus cordatis: superioribus
buis panduriformibus; capsulis multilocularibus her. P.

Anoda *hastata* foliis cordatis angulatis: superioribus elongatis,
hastatis pedunculis longissimis inefloris *Car. du* p. 307 ~~fig.~~

Habitat in terra Mexico Lima O

Caulis teres pilosus, superne angulatus ramis bipedalis

Folia petiolata superiora angustiora basi lobis 2 utraque
ovatis. Calyxes hispiti. Stipula subulata

lacinis calycis lanceolato