

Sida

Vellea. Sida foliis cordatis subrotundis tomentosis supra scabra ^{spicata} ~~in~~ ⁱⁿ ~~normaliter~~
dentatis, pedunculis axillaribus brevibus.
Habitat in Arabia Costal^{is}
Rami teretes mollissime tomentosi. Folia longa petiolenta
bi-vel tripollicaria subrotunda basi cordata venosu
crassa utraque ^{debe} villosa supra scabra ^{spicula} ~~subtus~~ ⁱⁿ ~~ca~~
na stipula subulata patente semunquiclaris.
Pedunculi solitarii stipulae parum longioris ante floren
tiam nutantes. Calyx ovatus unicus

prope indic:

~~Graphium~~ hda

Pida racemiflora

umbellata Sida foliis cordatis angulato subtrilobis tomentosis, flori umbellati axillari
bus pedunculatis, capsulis bistrostratis

Sida umbellata: foliis cordatis subangulatis subtomentosis, floribus umbellatis, capsulis
bistrostratis Her. s. V. pag 622.

Habitat in America meridionali in von Rohr 5

Rami, et tota planta, tomentosi, incani, vestes.

Stem petiolata, bis: tripolliciana, latitudine et longitudine aequalis, basi cor
data, extropium utraque lobis angulata, inter medio ^{peronym} longiore acuminato,
obtusis serrata, mollissima, supra nervosa, subtus venosa.

Petiolus pollicaris

Pedunculi axillares solitarii, folio longioris: Pedicelli s. 6, pollicares uniflori
interdum unius iterum, umbellato ramifus, pedicelli quatuor

Calycis laciniis ovatis, acutis.

Capsula villosa tomentosa

Stipulosa L.

Habitat

herb Ruth.

similis rhombifolia Desper stipulis magnis

viscosa Ida Richardi
primo anno florens subherbacum, deinde fructuosis, 2-3 pedalis, erectis, binis
aut partibus, et cum floribus glutinoso, ad orem graveolent et rugosum
Spurano Richard

Tuberoseum Lemodorus

Ita in sub simplicibus, floribus simplicibus L. Herod. p. 20. 2.

reptans S.

Plum Ge: 169. fig. 3 herb Ruth
It abounds in copula St. Cruz's West. to
an file for me Gaiy

amara A. folio cordatis

~~Albatta amara folio lori cordiformi, ligno flavo penta Aubl
se. g. tab. pag. 620. tab. 251~~

~~Habitat in Guiana. folio 5~~

~~Caules fermentat, ramis solubiles. Folia alterna, petiolata, ampla,
quinque nervia, venosa, subtus flavo penta glabra~~

pannosa Lida foliis subrotundo cordatis, subangulatis, crenato-serratis
tomentosis; capsulis multilocularibus tomentosis globosis depressis
Forst. in Com. Gott. 1789. p. 52. *
Habitat in St. Jacobi Insela

Cavendish S.

Ida alba Cavendish

subtus sublongerigi
tridentata Leda foliis ovatis apice tridentatis floribus ut illaribus solita
nis; caulis filiformi Cavan. 40. vol. 4. pag. 6. tab. 302. fig. 2.
Habitat in Domingo
filiformis Leda

Numeni Caps: non indicat Cavan

bicolor Ped. foliis lanceolatis attenuatis serratis floribus axillaribus solita
nis; caule fruticoso erecto, ramis patulis. Cavan. Ic. vol. 4. pag. 6

Tab. 211.

Habitat in nem. huponia &

Capsulaeque specime

^{Caricoides}
Lincari Lido foliis lanceolatis serratis, petiolis basi pinnatis flentibus foliata
nis Cavan. For. vol. 4. pag. 6. tab. 312. fig. 1.
Habitat in Nova Hispania &
Capsula 10. monosperma

pusilla Sida foliis subrotundis serratis glabris, pedunculis axillaribus solitariis

Sida *pusilla* caule fruticoso retenuato minimo: foliis ellipticis
dentatis glabris. Cavan. Desf. C. pag. 61. t. fig. 4 tab. 127. fig. 1

Habitat in insula mahé

Caulis lignosus vix tripollicaris vix centis pulis minutis adpres-
sus teres. Folia petiolo vix unguiculata obtusopinnata
interdum acuta. Stipula petiolo parum brevior
Calyx basi acuta. Capsula mucosa

Lyons

plumosa lida foliis ^{ovalibus} (ovatis) ^{serratis} retusis dentatis floribus terminalibus glo-
meratis foliolis longis linearibus ciliatis cancellatis Cavan Desf.
pag 7. tab. 12. fig. 4.

Habitat in Brasilia

Caulis plures ramosi pilis adpressis vestiti; semipedales. folia
petiolata supeme dentata retusa subvillosa. Stipula
capillares. Flores 10-12. in summitate caulis breviter pedun-
culati. Calicis ciliati. Capsula mutuo sulco
tunda Cavanelas
affinis l. ciliari

~~Sylvatica~~ Lda

seronice folia lida foliis cordatis ^{inqualiter} serratis, pedunculis folio longioribus, caule hirsuto
capitulis rostratis
altho minima fureta, veronica villosa foliis a madraspatana
Pluch. tab. 132. fig. 3.

Sida seronicefolia caule hirsuto foliis cordatis acutis inqualiter denta-
tis pedunculis longioribus puberatis pilosis. Caran. Desf. pag
7. tab. 1. fig. 3.

Habitat in India orientali.

Caulis erectus pilis hispida. Sepala subulata. Caran.

humilis Da

~~Indentata~~
~~uncata~~ Sida foliis lanceiformibus ^{retusis} emarginatis mucronatis integerrimis
subtus canescentibus

Habitat in India Orientali. 5

Fruticulus humilis ^{rigidus} ramis alternis teretibus superne
canescentibus. folia petiolata, semurquularia, basi acuta,
arce ^{erecta} supra glabra subtus ^{villis minutis} & ^{spiculis} stellatis canescentia
plura saepe ex eadem gemma, mucrone in emargine emarginatum
sempulo petalis pedunculatis axillaribus, ceteri petali brevissimi. Calycis
lacinis ovatis Capsula saepe mutica
affinis retuso.

~~Etrofma hor lida~~

humilis Lda foliis cordatis crenatis villosis, caule scabro. ramis diffusis
Capsulis multiv.
Sida humilis caule prostrato scabro, foliis cordatis crenatis
obovatis villosis Cavan. Desf. p. 277 Tab. 134. fig. 2

Habitat.

Caules vix semipedales erecti scabri fusci basi valde in-
mopi. ramis diffusis horizontalibus. Folia parva
stipula subulata & patula. Flores solitarii axil-
lares; pedunculis erectis foliis longioribus. Calyx
pentagonus corolla lutea. Caps 3que Cavan

non vidi.

repens L. caule filiformi elongato prostrato, foliis cordatis crenatis utra
que hispida, pedunculis unifloris Caran. disp. p. 7 tab. 1. fig. 2
Habitat in pennis

Caulis hirsutus ramosus teres. Folia longe petiolata parum
appressa. Stipulae pubulatae patulae. Pedunculi axillares
foliis oppositi. Calyx pentagonus laciniis ciliatis. Corolla unguis
lineis purpureis Caran.

non vid.

~~polyanthos~~ - Da -

hederaefolia Leda foliis cordatis obtuse crenatis subhispidis, caule repente.

Leda hederaefolia caule nodoso radicante: foliis cordatis obtuse crenatis subhispidis, capsularum corniculi erecti longi hamati. Cav. dup. p. 8. tab. 9. fig. 3.

Habitat in Ins. St. Domini

Leda foliis cordatis obtusis, caule repente, pedunculis unifloris capsulis anatis. *Burm. Plum.* ii. 4. 169. fig. 3.

Caulis tenuis ramis nodosis admodum radicantibus.
Folia longe petiolata subrotunda cordata. Peduncululi axillares solitarii. Petala, capsulae calycis breviores.
Cav.

non vidi.

foetida Lida foliis cordatis ovatis serratis, ^{mollibus} caule pubescente

Lida foetida caule erecto atropurpureo, foliis ovatis cordatis
— serratis foetidis Caran. Desj. p. 149. Tab. 196. fig. 1

Habitat in Pem

Planta valde foetida. Caulis erectus teretes subquadratus
biscentes sesqui pedales. Folio petioli ^{sub} aequalia
longissima dependente crassifolia mollia. pinnis
clausis. stipula subulata. Calyx globosus. Corolla
lutea. Capsula 7-8. Pedunculi solitarii uti
petioli subpilosi. Caran.

non Ind.

ovata lida foliis ovatis cordatis glabris, caule prostrato tomentoso

lida ovata, caule prostrato ramoso, foliis ovatis cordatis
crenatis, floribus axillaribus solitariis pedunculatis
Cavan. Diss. p. 350 tab. 146 fig. 2.

Habitat in Insula N. Domini.

Caules filiformes subsistentes ramosi subtomentosi
pedales. Vaginae petiolii breviores, utrinque fere
glabrae. Stylula subulata. Pedunculi axillares
solitarii longitudine fere petiolorum. Corolla
lutea. Calyx pentago ~~trilobatus~~ ^{trilobatus}. Capsulaeque
Vaginae obtusae in figura Cavan.

non vidi

diffusa. Du

nde inter americana affinis ovata Cavan

radicans Sida foliis cordatis acutis pelopis dentatis; dentibus seti-
geris, caule repente

Nela sarga Rheed. Mal. 10. p. 137. Tab. 79.

Sida radicans caule repente, ^{adventibus} fusculis repentibus, foliis
cordato-acutis pelopis dentatis, dentibus in ^{scam} ~~scam~~
terminatis Cav. Des. p. 8.

Habitat in India orientali.

Caulis pilis albicantibus. Folia mollia. Peduncululi petiolo
longiores. Capsula mutica Cavan

non vidi

monifolia P. foliis cordatis subrotundis supra pilosis inaequaliter serratis
pedunculis petiolo squaratis capsulis multiv
althoa monifolia India orientalis ad foliorum squis capitulis singula
ribus parvis Plukh. Alm. 25. Tab. 132. fig. 5

Sida pilosa foliis subrotundis cordatis serratis supra pilosis
feminiibus & cornibus Retz. Bot. 4. p. 23.

Sida monifolia foliis subrotundo acuti cordatis lato-crenatis
crenulis acuminatis, pedunculis annulatis petiolis paulo majori-
bus, calycibus pilosis Caran. Desf. p. 9. Tab. 1. fig. 1

Habitat in India orientali O

Caulis erectus pedalis basi novem ramosus fere pilis raris
adpressis. Folia petiolata cordata subrotunda parum
acuminata sesquipedalana superius saepe minor
stidii raris adpressis stipula fetacea patentissima petioli
pollicaris apice prope pilos Pedunculis axillares
capillates pilos petiolo parum longiores solitani
uniflori. Calyx angulatus pilos - Corum ovatis
Corolla lutea Caps: 5que multiv

Borbonica. f. foliis cordatis dentatis, pedunculis petiolo longioribus
caule ramoso hirsuto.

Sida borbonica caule erecto ramoso hirsuto, foliis cordatis
subrotundis acutis dentatis floribus solitariis axillari-
bus, pedunculis petioli paulo longioribus. Pavan
Diss. pag. 9. Tab. 10 fig. 2.

Habitat in insula Borbonica.

Caule ramoso super bipedaliter. Siliqua attenuata.

Pedunculi solitarii axillares. Corolla lutea
Laciniae ~~inter~~ calycis minor. Caps. 5. rostrata Pavan

calycina *P. foliis cordatis ovatis attenuatis ^{grossa} crenatis, dentatis, caule petiolis
que pubescentibus*

Sida calycina caule piloso ramoso, foliis crenatis inferioribus
cordatis subrotundis parvis reliquis cordato-ovatis, pedun-
culis longis geniculatis pilosis Cavan. Desf. puz. 9. tab. D

fig. 2
Habitat in Anfula Bobonio Thonini

Rami grisei. folia petiolata bipollicaria squamaria vix
venosa, venae profunda ^{gravi} crenata dentata supra
nuda infra subtus pallidiora. Supula strigosa. petioli
foliis breviori. Pedunculi axillares solitarii filiformes
foliis parvis breviori uniflori veris apicem geniculati
Calycis ad basin fere partibus laciniis lanceolatis. Corolla
magna extra villosa lutea. Capsula pyriformis
mutica

populi folio Seda

pelosa ^{hirsuta crenatis}
foliis inferioribus cordatis subrotundis superioribus corda-
to ovatis, caule petiolis pedunculisque longis pilosis
Cavan. ~~Dis. pag. 9 tab. 1. fig. 8.~~

Sida pelosa caule piloso ramosis: foliis crenatis
inferioribus cordatis subrotundis, reliquis cordato
ovatis: pedunculis longis geniculatis pilosis
Cavan. Dis. pag. 9 tab. 1. fig. 8

Habitat in Insula Dominica.

planta tota pilu hirsuta. Caulis tenuis. Stipulae
subulatae. Flores axillares solitarii. Calyx
pentagonus fructus biconis Cavan

Rami teretes, superiores pilosi. Folia petiolata, angustilana vel parum
ultra, cordata, ovata, obtuse crenata, supra glabra vix armata puncta
tata, ovata, emissa, subtus incana, nervosa. Stipulae subulatae
pedunculi axillares gemini vel solitarii, capillares folios
groves. Calyx pubescens. Laciniae acutae. Capsula sive bicon
nes, monosperma herb. fig. 8
~~non vera~~

Forsk^o Cal. S. pilosa, foliis cordatis ovatis serratis, floribus axillaribus
subgeminis capsulis muticis

Habitat in Arabia Forsk^o

Caulis durus pilosus puberulus. Folia longitudine petioli
unius primi pollicaris anguste serrata subtus puber-
ulenta. Stipulae parvae lineares. Pedunculi petioli brevior
1-2. Calyx pyramidato pentag. Capsulae squa-

urticaefolia L. foliis cordatis ovatis crenatis crenulis subtruncatis; pe-
dunculis axillaribus geminis altero multifloro caule piloso
Habitat in India occidentali:
Caulis erectus. teris pilosus. Folia petiolis longiora atten-
uatoraque vel nerva fibrosa, cetera mucrone minuto ter
minata utrinque villosa subtus mollia lina f. 3 pollicaria
Petioli villosi. Strucula parva lineari. Pedunculi axillares
geminis saepe cum ramulo brevi florifero: alter longior uni
florus alter triflorus cum folioli duobus minutis ad basin
Calyx pentagonus, rubescens. Capsulaeque brevitate

paniculata L. foliis cordato-oblongis acuminatis serratis, subtus tomentosis,
pedunculis capellanibus longissimis Lin Am. acad 5 p. 481 y
Cavan. disp. Sida humilior ramosa Vries, foliis cordatis serrato-crenatis,
pag. 16. tab. 12. fig. 5. pedunculo simpliciter unifloro: altero bifloro foliato. Brown
fam. 200.

Habitat in Jamaica. †

Sida atrofusca foliis cordato ovatis acutis serratis utrinque
villosis pedunculi uniflori solitarii capellanibus caulis
fruticosa Jacq. coll. 1. p. 49

* Rami villi adpressi uti folia. ^{Pedunculi biplexen} ^{et p. 3 prolevaris} ^{racemosi}
venula subtus in ana. ^{racemosi} ^{racemosi} ^{racemosi}
alter simplex alter axillares pedicellis remoti superne geminati bractea

duo setacea ad basin sequi floris parvi. Fructus
globosus Capsula mucosa

Sida capellanii foliis cordato-oblongis tomentosis, pedunculis longissimis
capellanibus, corollis mucosis maculatis subreflexis Cavan. disp. pag. 16
tab. 1. fig. 7 pedunculis geminis alter unifloro alter racemoso
floribus racemosis

attenuata

multicaulis l. foliis cordato subrotundis dentatis pulverulentis
villofis, caulibus canescentibus Cavan. Desf. pag. 10
tab. 1. fig. 6.

Habitat in Malabara

Caules plures ramosi tomentosi densae .. Stipulae

capillares breves. Pedunculi axillares solitarii

Corolla lutea. Fructus calycis minor. Capsula

mutica

caules plures tomentosi, in eam uti folia subtus herb. Guss.

Javanese R. foliis cordatis acutis sublobatis crenatis, caule recto
nato subglabro Cavan. Desf pag 10. t. 1. fig. 9
Habitat in Java

Caules plures ramosi. Folia distantria acuminata
subglabra. Stipulae capillares arcuatae. Pedunculae
axillares solitaneae petiolo majores. Fructus subglo-
bosus intra calycem. Capsula bivalvis Cavan

non vidi

Spunofa l. foliis cordato-oblongis serratis, tripulis setosis, axillis sub
spunofis Lin. l. v. Caran. Desf. p. 11. tab. 1. fig. 9

Acumina ^{ant.} 6. t. 10

Aethaea carpinifolia, flosculis luteis Boiss. fig. 11. t. 2.
Alicea, carpinifolia, americana frutescens, flosculis
luteis, femine duplici: rostro Commet. hort. l. p. 3. t. 2.
Althaea virginiana videns, pimpinella majoris acutior
foliis, flosculis minimis luteis Planch. alm. 25. t. 9. fig. 6

Habitat in India utraque

Caulis teres ramifera pedalis rami pubescentes angulati
Folia subcordata ovata acuta vel obtusiuscula
supra glabra subtus ^{sub} pubescentia pallidiora, mistio
ad basin petioli. Tripulis setosis. Pedunculi petioli
breviores seni flori Calyx angulatus pubescens.
Corolla lutea. Caps. breviter

Folia basi cordata, oblonga subtriplicata utraque
glabra herb. Gua

Andesiensis. S. foliis ovato-oblongis serratis subtus albidis, pedunculis erectis unifloris. Foliis duplo minoribus. Caran. Desf.
pag. 12. tab. 10 fig. 1.

Habitat \dagger

Caulis fruticosus teres erectus ramosis 4 pedalis. Folia
subcordata frequentia glabra serraturis minimis
Aripuae capillares. pedunculi solitarii axillares.
Caran.

non vidi

alni folia S. of folus orbiculatis plicatis serratis Linn. S. Vey.
malvacea stellata alnifolia Dill. Elth. 2158. 172.
fig. 211.

~~Habitat~~ alni folia folio serratis subvellosi inferionibus
rotundatis cordatis, medio ellipticis, superionibus
lanceolatis Cavan. Desf. pag. 12. Tab. 1. fig. 13.

Habitat in India orientali ☉

Folia inferiora subrotundo oblonga, subtus villosa, mollia hirs.

hirs.

vetusa l. foliis cordiformibus velasi seratis, subtus tomento fo. Linn.

~~Spici. pl. par. 9. 617.~~

~~althea indica, latiori folio cordiformi ad summum sinuato~~

~~Plubm. alm. 26. 7. 9. 17. 2.~~

~~Alagurium Pempt. amb. 6. 44. 7. 19.~~

~~Habitat in India C.~~

Pempt. amb. 6. 44. 7. 19.

verticillata L. caule piloso, foliis cordatis acuminatis crenatis, floribus
subverticillatis sessilibus Cavan. disp. pag. 13. tab. 1. fig. 12.

Habitat in Brasilia

Caulis erectus. Folia distantia petioli longiora. Stipulae
capillares brevissimae. Flores axillares calycibus pilosis.
Capsulae submuticae Cavan

non vidi

bivalvis *P. folia* et incano tomentosa, foliis cordatis attenuatis denticulatis, fructibus
brevissime pedunculatis depressis pentagonis muticis
Sida bivalvis foliis cordatis orbiculato - acuminatis tomentosis: floribus
subsessilibus, fructu pentagono depresso glabro patenti. Cavan.
Cav. = p. 13. Tab. 11. fig. 3.

totam plantam incano tomentosa mollissima ramosa
cum ramulis et plurimis axillis. Folia petiolo sequenti
cana pollicaria acuta vel ultra acuta denticulata supra
avenia enerviibus nervosa. Sepala lineari angustiori
pedunculi floris axillari subsessilibus calyx ante flores pen
tran^s angulata. maturitate capsula sepalo a se invicem
separantur sed valvula dimidia cum dimidia proxima
mediante dissepimento adheret sic Capsula⁵ 5-valvis

prostrata Sida foliis cordatis crenatis tomentosis, caule prostrato,
Capsulis muticis

Ba prostrata: caule prostrato: foliis cordatis latis crenatis
tomentosis glabrescentibus; floribus floris geminis
capsulis muticis. Caran. Desf. pag. 13. t. 13. fig. 3.

Habitat in rupibus monte videtur

Caulis teres pedalis fruticosus. Folium Septemloba subula

to. Flores interdum terni in eadem axilla.

Calyx globosus pentagonus subinflatus. Capsulis subrotundis

ob apicem acuto Caran. ~~non videtur~~

non videtur

flarescens Lida tomentoso flarescens, foliis cordato oblongis crenatis, ^{senatis} pedunculis
axillaribus subtinis unifloris brevibus

Lida flarescens, caule erecto, foliis cordatis oblongis crenatis flarescen-
tibus, floribus rubescentibus geminis Pavan. Diss. pag. 14.
Tab. 13. fig. 2

Habitat in rupibus monte Sadeo

Caules suffruticosi ^{compositis} ^{ramis teretes superne angulati}
ubi ^{hinc planta} ^{vel brevissimis tomentoso} ^{flarescens obtusa scabra si}
folia vix pollicaria supra scabra scabra subtus venosa subre-
ta. Petiolis semurquiculatis stipulis subulato. Pedunculi axilla-
res 2-3-4. Petiolo panem breviori. Calycis ante expansionem
subglobosi squarigulati; lacinus ovatis acutis

~~septimana~~ Lida

glutinosa ^{oblongo} ^{eratu}
Peda foliis cordatis attenuatis mollissimis ^{racemis elongatis} floribus
~~paniculatis~~, caule glutinoso pubescenti

Peda glutinosa Caule tomentoso glutinoso, foliis magnis
cordatis oblongo acuminatis subtus tomentosi superius
parvis, pedunculis capillanibus longis. Baran.
Desf. pag. 16. tab. 2. fig. 8.

Habitat in fof. St. Dom. et fonicis

Caulis teres ramosa ramus elongatus. Folia remota
longe petiolata argute serrata supra avenae
subtus incana nervosa venosa. Stipula setacea
Pedunculi super inferiores gemini alter longior
ambos pedicelli ^{foliis longioribus} racemosi, ~~racemum~~ ^{racemum} ~~terminalis~~
compositus pedicelli solitarii vel gemini
semi pollicari Calyx angulatus. Capsula breviter
Caulis et rami pilosi. Folia bipollicaria ^{ramis} ~~stulta~~, cordata
attenuata, venata, omni mucronatis, quinque nervis, venosa
supra setosiscula, subtus mollis, incana. Petioli folii breviores
Stipula setacea. Rami floriferi foliosi. Pedunculi 1-4 flori, medio
geminati. Calyx lacinis acutis. Facies Peda paniculata vel 4
pedunculi gemini racemosi

Pedunculus uniflorus cum ramulis
Guaf

~~atrosanguinea f. foliis cordato-oratis acutis serratis utraque villosis
pedunculis unifloris solitariis capellantis, caule fruticoso
Jacqu. in b. v. p. 622. coll. 1. p. 49.~~

Habitat

urens L. foliis cordatis serratis hispido, pedunculis multifloris ter-
minalibus glomeratis Lin. Am. acad. 5. p. 4024

Sida urens, foliis cordatis serratis, floribus capitatis, pedun-
culis communibus alantibus Brown Jam. 200.

Habitat in Jamaica.

Pauli teni hippidus uti petioli et calycis. folia serrata
cordatis ovatis attenuatis ^{axillari} petiolo pubescentibus pallidiorum
bipolliciana flores supremi ^{axillari} inflorescenti an' ped' api-
ca pedunculi capitato glomerati fuscis. Lacinie Calycis
pentagoni Calycis lacinis ovato attenuato. Capsula
breviter ^{trifloris} petala basi macula purpurea
Sida urens foliis cordatis acuminatis serratis hispido: pedunculis
multifloris axillaribus et terminalibus Cavan. Diss. pag
15. tab. 2. fig. 7.


Murr. Diversa a Lin

angata L. foliis cordatis serratis apice attenuatis: caule. virgato, pe-
dunculis axillaribus filiformibus unifloris Sw prod. p. 101.
Habitat in Jamaica &

Ad ulmifolia foliis crenatis cordatis oblongis acumine produci-
to, capsularum rostro longis hamatis Caran. des. pag
15. tab. 2. fig. 4

Rami teretes venae suprae subpubescentis foliis petiolo-
sa valde attenuata supra si abrupta, vix
suptus patrum pallidiora utraque vili vili
stellatis oculo armato videntis adpressa remota
siqui pollicoria. Stylo brevis sebaceo. Pedun-
culi capillares plerumque solitarii axillares
uniflori paleo brevioris. Calycis pyramidatis
pentagoni subpubescentis laciniis acutis
nerviis flores parvi. Capsulo sive bistro-

Jamaicensis. foliis ovatis serratis tomentosis, floribus axillaribus
subpedunculatis, seminibus quinis bicornibus Lin. Am. acad.
s. p. 4017 Cavan. desc. pag. 17. tab. 2. fig. 5. figura mala
Pida humilior foliis ovatis serratis distichis, petiolis et pedun-
culis brevibus, ramulis floriferis foliolatis alaribus Brown.
sem. 200.

Habitat in Jamaica. 

~~Rami teretes purpurascetes ramuli flavescenti tomen-
tosi uti calyces et pedunculi et petioli folia
peltata supra obscure sive nervi subtus villosi
puberula obtusa. stipula setacea petioli unguiculari
pedunculi axillares 2-3 inaequali linguiculari
Corolla purpurea~~

Calice teres flexuoso pilosus bipedali. Folio quandoq;
ovata sicut ovato-cuneata serraturis minimis in
setam brevem desinentibus. flores subsimples solita-
rii. Stipula lanceolata Cavan
aspinulata quem plurimum hinc hinc fol. vel laevifol.
herb. 4us

~~non vid.~~

glomerata L. foliis oblongis serratis mollissimis, floribus axillaribus congestis subsessilibus

Sida glomerata foliis ovato-lanceolatis dentatis subsessilibus, floribus conglomeratis sessilibus *Caran. Diss. pag. 10. tab. 2. fig. 6*

Habitat in Insula N. Oculi *Pflanz. West. 5*

Caulis pedalis erectus, ramosus ^{superior} pubescens. Rami alterni simpliciter. Folia breviter petiolata oblonga vel ovalia pallida in altero latere pagina obliqua inferiori majora pollicaria supra glabra superiora utraque ^{truncata} tomentosa mollia. In nervis saepe plura ex eadem gemma. Flores 5 subsessiles Calyx angulatus laciniatis attenuatis fructu longioribus. Capsula 5que. breviter. Sepala lanceolata lanceolata
affinis videtur albaefolia

oivta J. folus anguste lanceolatis dentatis inferne integris, flori-
bus sessilibus solitariis Pavan. Desf. p. 15. t. 2. fig. 3.

Althoa coromandeliana angustis pro longis foliis femine bicornis

Plukh. mant. p. 10 t. 334. fig. 2.

Sclagunium longifolium ~~Burm.~~ Rumph. amb. 10.

cap. 32. t. 10. fig. 2.

Sida folus lanceolatis serratis stipulis setaceis, floribus axil-
laribus solitariis Burm. ind. p. 147.

Habitat in Java.

Pauli teneris ramosis. Folis breviter petiolata. Axillis enormes
Aspula lanceolata petiolo longiore Pavan.

angustifolia. foliis linearibus lanceolatis serratis subtus tomentosis
stipulis setosis, axillis obtuse tripartitis Mur. fl. gött. p. 220
L. V. p. 621

Habitat in America, Anpula Bourbon Cavanilles. 5
Rami teretes virgati subcaneiscentes superne angulati
Folia petiolata, basi ovata superne angustata linearia
serratis margine saepe purpureo cincta supra glabra
nervoso sublineata subtus nervi exstantibus mollispon-
denia bipollicaria. Petiole semipollicari styli-
co setoso ^{ultra} pedunculati axillari
cum rami florifero glaberrimo unifloro petiolo
parum longiore. Calycis lobis semis facibus ovatis
acuti Capsula 5que bistrata

Sida angustifolia foliis angustis oblongis serratis
axillis subtripartitis: Unum speculum in media
majore Cavan. Desf. pag 14. T. 2. fig 2

leucifolia L. foliis cuneatis int. oppositis hirsutis, floribus corymbose spicatis
Sicut Vermunculibus Caran. Desf. p. 14. tab. 2. fig. 1.

~~Halimolobos~~ ~~Papava~~ ~~Pani~~
Malva hirsuta graminea foliis Nass. Franc. aegypt. 72.

Halimolobos Papava Pani 3

Caulis teres hirsutus, intricatus ramosus, bipedalis. Folia bidentata
lobata. Sepala subulata creta. Calyx angulatus. Corolla al
ba. Capsula subnatis. Car.

non vid.

microphylla L. foliis ovatis dentatis, pedunculis axillaribus pluribus
petiolo longioribus.

Sida microphylla caule erecto duro ramosisimo, foliis
ovatis dentatis parvis, floribus axillaribus pluribus
in caulis & ramorum apicibus. *Cavan. Des. pag.*
22. tab. 12. fig. 2.

Habitat in India orientali.

Caulis teres ramosus durus. Folia breviter petiola-
ta. Stipula setaceo parva flores in summitate
caulis et ramorum pediculi gemulati. Calyx
pentagonus corolla lutea. Capsula 7 intra calycem
breviter

michi haud nota

villosa L. foliis cordatis crenatis tomentosis, floribus subsolitariis, capsulis septemlocularibus rotundis depresso Lin. Am. acad. 9. p. 402 +
Althoea populi folio villosa Cav. & Ferrato Sloan. herb. 1. p.
22. t. 139. fig. 4.

Habitat in Jamaica ^{in hila S. & Cruis West} ^{villoso}

Tomentosa, mollis ^{et hirsuta}. Caulis erectus teres ramis villosis. Folia
cordato-ovata, crenulata, attenuata 1-2 polliciana. Stamina
parva, tomentosa mollia. Petioli et pedunculi villosi ^{villosi}.
Pedunculi filiformes axillares solitarii vel gemini, petio-
lo brevioribus, unifloris. Calyx villosus magnitudine fructus
Capsula 7. nutria

Ciliari L. foliis ovalibus retusis serratis stipulis lineantibus cilia
tis, femoribus multinatis Lin. Am. acad 5. p. 4014

S. V. Caran. desj. pag 21. tab. 3 fig. 9 et tab. 127 fig. 2.

Malva minor supina, betonicæ folio, flore coccineo feminibus
aperti Sloan herb. 1. p. 217. N. 137. fig. 2.

Habitat in Jamaica.

Caulis teres ramis declinatis rami tenues e villos adpressis
canescentes folia petiolata vix unguiculata extropium
anguste serrata supra glabra subtus leviter villosa. flores
solitarii brevissime pedicellati axillares Calyx angulatus
villosus. Capsula vix rostrata

Caulis ramifer: rami scabriusculi, pilosi. Folia unguiculata
oblonga, utrinque obtusa, extropium serrata, supra glabra, axillari
energia, subtus villosa, minima. Stipula subulata herb. 4us.

Stipulata L. foliis lanceolatis dentatis acutis pilosis, stipulis
obliquis floribus longioribus Cavan. Diss. p. 22 t
t. 3. fig. 10

Habitat in insula Franco, China
Caulis pubescentibus ramosis. Pediculi axilla
res petiolo subopales Cor. lutea Capsula 7
bracteis Cavan.
varietas Chinesis foliis longioribus

non arbor

carpinifolia L. foliis bifariis ovato-lanceolatis serratis: serraturis
acutatis, umbellis axillaribus Lin. Suppl. p. 307. W. V.

~~Cavan. Diss. pag.~~ p. 621

Taiqu. coll. 1. p. 30.

24

Cavan. Diss. pag.
274 tab. 134.

fig. 1

Habitat in Madaga

Rami patentes bifarii pilosi. Folia breviter petiolata
serraturis terminata pilo vel seta rigida venosa glabra
Stipula subulata petiolo longiores. Pedunculi

axillares raris foliarii longitudine petioli
pilosus. Calyx glaber capsula obtransversa. Lin.

Rap. metrica sic und Cavan. flor solitarius pedun-
culis geminis alteri floris alter 4 floris pedicel-
lis umbellatis Cavan

Rami petioli. Folia breviter petiolata, ovato oblonga, bipollicaria, acu-
ta, anguste serrata, nervoso-venosa, utraque glabra. Stipula anguiculata
subulata. Pedunculi axillares plures: herb. Hrus
Dacrydium hirsutum

~~non vidi~~

Nonogi S. folius oblongis rhomboidalibus subtus ^{serpenti} puberulis pedunculis
superne confertis

Habitat in India Orientali

Trunci teretes superne a tomento tenuissimo canescentes, angulati
Folia petiolata bi-3-f. 4-pollicina, facie S. rhomboid. et

multo majora basi obtusa apice acuta, grosse serrata nervis
supra glabra subtus puberulis prope nervos, pallidiora

Stipulae 2e saepe Petioli folio breviori. Flores in apice
ramulorum lateralium & terminalium plures. Pedunculi, flori-
feri pollicares Catycis lacino orato attenuato, dorso unico
nervo. Pappus 2-f. villosus nigro bicornis, conicali
fasciculati retrosum pulsi. Semen. albae capae circumae villosae

sessiliflora L. foliis ovatis serratis subtus incanis floribus axilla-
ribus ^{sub} sessilibus ^{foliis} capsulis mucicis
Sida ovata foliis ovato-oblongis serratis pedunculis axillari-
bus foliatis uni floris petiolo brevioribus Forst
Desf. par. 124

Habitat in Arabia &

Inter humilis, ramis ^{secreta} sparsis glabris. ramuli
axillares ^{frequentar} breviter ^{brevis} canescentes. folia breviter petiolata, semper unguiculata
vel unguiculata, serratis utraque 2-5: obtusissima, aspera
juniora utraque ^{se} villis conferti stellatis subtomentosa adulescentia
senes ^{senes} nudiora glabra subtus incana nervosa. Stipulae line-
ares, caducae. Flores in apice ramulorum sessiles. Omentum
depressius orbiculare. Calyx fructiferus subtus lineis elevatis
Capsula o. dorso rugosa, monosperma

mauriana L. foliis cordatis acutis holosericeis indivisis, pedunculis
petiolo longioribus, capsulis multi locularibus hispidis, caule fructi-
coso ~~Asperula L. V. p. 62. Mispel. 2. p. 352. ic. rar. t. 29~~
Habitat.

infructuosa
flavescente tomentosa
Sida foliis cordato-ovatis oblongis, serratis pedunculis axillari-
bus subternis

Habitat in India orientali occidentali.

Caulis erectus. Vires ramosis uti tota planta a villis ferdide

flavescentibus tomentosa. rami axillares simpliciter.

Folia petioli longiora cordato ovata vel superne
cordato oblonga acuta & crenata subtus villosiora mollia

bipollicaria stipula subulata unguiculata ~~peduncul.~~

2. vel 3 in axillis ^{stipulae parvae longiores} unguiculatae uniflori laciniis
calycis ovata. Capsula v. villosa

Gatrophoides. folio palmato peltatis: laciniis lanceolatis unin-
natis lobatis Hort. kew. 2. p. 443.

Sida palmata folio palmato magnis serratis stipulis nullis
floribus pubescentibus
Car. Desf. 1. p. 20. Desf. 5. p. 274. Tab. 131. Fig. 3.
Tab. 3. Fig. 5.

Habitat in America australi ☉

conspicuo molli

Caules teres tripedales superne pubescentes ceteris ramisque

Folia petiolo breviora villosa basi cuspidata 7-9 por-

tita laciniis lanceolatis extropum latioribus serratis.

Stipulae nulla. peduncululi axillares. flores in

racemis compositis. lacinus calycis linearis lanceola-

to villosa. Corolla violacea. fructus antheris
vel muticus

~~retusa~~
~~alnifolia P. foliis orbiculatis plicatis serratis~~
~~alnifolia ^{H. B.} flor. reyl. Ter. V Carson. Des. p. 10. t. 3. fig. et tab 131.~~
~~Malesiana foliata alnifolia Willd. Lekt. 1792. p. 277. fig. 2.~~

Caethoa India Habitat in India Orientali
 latiori folio Rami teretes inferne scabriusculi superne angulati ore levis
 cordiformi foliis breviter petiolata unguicula ora basi
 adsummum acuta arenae subtus oblique ^{retusa} nervosa oris armato vellosula
 sinuato Platanus nallada supra glabra basi vespis integerrima. Stipula
 alm. 26. t. 9. Letaeo. pedunculati filiformes folios longiores medio
 fig. 2. geniculati prollares solitarii uniflori. Calycis nondum
Elagunum Rumph. florentis pyramidati acuminati. Laciniae ovato. Capsula
 umb. 6. p. 44. glabra inquetus mutuo
 t. 19. cum *alnifolia* confundit ~~Distichlis~~

~~valde~~
~~valde~~
~~Caran. patuli~~
~~quod in flora reyl. plantae mesit. Desf. sub uno nomine~~
~~quod in flora reyl. plantae mesit. Desf. sub uno nomine~~
~~et in part. ^{pubertate}~~
~~foliis obovatis serratis plicatis pedunculus atellontibus~~

Hinc specimen cum planta Libani Herm. contuli et omnino eadem
~~Caran. patuli~~ ~~Desf. sub uno nomine~~
 Dubium videtur

multi-flora ^{tomentosa} foliis ovatis crenatis floribus pipenonibus congestis frequen-
copiosi.

Sida multi-flora foliis ovatis dentatis tomentosis floribus nu-
merosis pedunculatis petiolo longioribus. Cavan. Disj. pag
10. Tab. 3. fig. 3.

Habitat in America meridionali v. Rohr, West. Comerspa
per Thour.

Rami incani, copiosi ramulosi. Folia pinnatifida herb Thour.

habes fr. herb Thour.

descript inter americana sub nomine Sida molles
an eadem ac Althaeifolia Sw videtur

multiflora f. folia ovatis dentata ~~Lin.~~

~~no~~

Herbacea Sida foliis subcordato-oblongis crenatis, ramis subtriquetris pilosis
pedunculis superioribus congestis

Sida herbacea caule erecto piloso ramoso, foliis subcordatis
crenato-dentatis, pedunculis petiolo brevioribus
capsulis novem brevissimis. Cavan. Diss. pag. 19. Tab. 13.

fig. 1.

Habitat in India orientali

inceditur sum nam mea Cavan. Specimina habui a La Martiniere ^{tamen}

et hinc quo optime cum figura et Descriptione Cavan.

Rami ^{lymbati} inferne teretis, pilis longis subtilissimis vestiti superne

compressis triquetris foliis polliciana mollissima obtusa

petioli pilosi stipulis setaceis pedunculi in axillis in

ferioribus solitariis longitudine petioli superne et in ramis

li frequentioribus conferti. Calyx villosus. Tementopus

Capsula 9. nervis rostris ultra calycem porrectis

helvola
helvola
rubiflora
hemisphaerica

^{obtusis}
Sida foliis ovatis ^{suboppositis} fere crenatis ^{tomentosis} vasculis que ^{tomentosis}
floribus axillariis ~~simplex~~ capsulis multatis

Habitat in America. ^{floriferis}

Frutex. Vires ramis alternis incanis. Folia pollicaria petiolo
longiora villosa subrepentia inaequaliter crenata, obtuse tri-
nervi ^{vea venosa} ^{vea geminis vel ternis} ^{brevis} stipula subulata. Pedunculi ^{brevis} calycis

unguiculari ^{affinis} ^{iniani} ^{micant.} La Mart. an eadem.
nam bene affinis ^{iniani}

micans L. folus subordato-orati dentatis tomentoso-mollissimis

Sida micans. folus subordatis oratis lanceolatis dentatis to-
mento mollissimis micantibus, calycibus globosis decem
angulatis Cavan. des. pag. 19. t. 3. fig. 1.

Habitat in 4. n. S. Dominico.

Caulis erectus, ramosis tomentosus, uti tota planta. Folia
subrugosa petiolo duplo longiora. Axilla pulchra anthera
to. Pedunculi axillares solitarii petiolo parum breviores.
Calyx 10 globosus. Corolla lobis. Capsula novem breviter
Cavan.

maculata L. foliis ovatis serratis tomentosis, floribus terminalibus
racemosis

Sida maculata foliis ovatis serratis tomentosis floribus
spicatis terminalibus, corollis maculatis Cavan
Desf. pag. 20 t. 3. fig. 7.

Habitat in Inf. H. Dominici

Caulis durus ^{obtus} tomentosus. folia inferiora orbiculata
superiora ovata. stipulae subulatae. Flores axilla-
res solitarii in racemo dispositi. Calyx pentagonus
vellosum. Corolla magna flavescens angustis
inflexis lobis. Capsula novem bracteis. Cavan

non vidi.

rotundifolia L. ^{pilosa} foliis cordato subrotundis crenatis pubtus tomentosis; capis
lanam rostris exsertis fasciculatis

Sida rotundifolia foliis subcordatis subrotundis crenatis tomentosis,
capularum rostris fasciculatis herbis Caran. Desj. pag 20
Tab 3 - fig. 6 et Tab. 194 fig. 2

Habitat in Anglia Boupton 5

Caulis ramosus teres pilis frequentibus adpressis uti pediculi
pedunculi et calycis. folia unguiculata juniora
magis ^{semisungiculata} ovata, utraque molliter tomentosa pedunculorum ungui-
culata basi subcordata supra glabra et stipula
setacea. pedunculi axillares solitarii longitudine
foliis in apice ^{et} ramulis conferti Calyx subglobosus
Capulo breviter

planicaulis f. folis oblongo lanceolatis inaequaliter serratis; floribus
axillaribus sessilibus; caule superne compresso

Sida planicaulis folis ovato lanceolatis serratis caule compresso
floribus subsessilibus Cav. Desf. 24. t. 3. fig. 11

Habitat in Brasilia

Caules pedalis super, glaber superne pilosus scaber
e punctis elevatis piliferis. Folia brevissime petiolata
polliciana basi obtusa glabra. Stipula subulata petiolo
longiore. Flores solitarii. Caps. breviterata.

affinis rhombifolia

Rami compressi, pilosi. Folia bipolliciana, oblonga, altero
latere basi angustiora, utrinque glabra, acute serrata
nervosa, venosa. Stipula subulata. Pediculi brevissimi con
gritudine petioli, uniflori herb. Mus.

rhombifolia L. foliis lanceolatis - ^{lanceolatis} rhomboidale^{bus} serratis, axillis subspi-
ginosis & Reuzl. 2524 Caven. Diss. pag 23. Tab. 3 fig. 12
Malvinda unicolornis, foliis rhomboide, perennis Will. elth. 216.
4. 172. fig. 212.

β. *Althoea carpinifolia*, flosculis luteis Boerh. ju. 11. 8. 6. fig. 2.
Althoea pernambucana, carpinifolia, flosculis minimis Monj
hist. 2. p. 520. f. 5. t. 14. fig. ult.
Habitat in India utraque 5. C.

Caulis erectus lignosus quadripedalis ramosis inferne
tenuis superne angulatus sub apice subpulverulentus.

Folia breviter petiolata, bipollicari utrinque obtusa
^{interdum} saepe uno vel altero obovato pollicari cavi. Innervia
utrinque glabra subtus glauca. Stipulae setae
pedunculatae axillares solitariae. Calyx angulatus.

Caps. 9. birostrata

invisis minutis ad basi petoli

alba L. foliis cordatis subrotundis, stipulis setaceis axillis subtri-
pinnatis Lin. Spec. pl. pag. 960+

~~Althoea rostrata comandulensis, pumpebella majoris folio~~
~~vellosi et glabro Dill. Alth. subrotundo, femine bicorni~~
Plukh. alm. 26. t. 9. fig. 3.

Mulva bicornis, sanguisoba folio vellosi et glabro Dill. Alth.
24. t. 17. fig. 210.

Habitata India C

Simillima L. pinnata sed folia rotunda flores albi stigmati-
bus purpureis pediculis apices purpurascens, tota
demum planta major Lin.

an *Sida alba* Cavendish pag. 22. t. 2. fig. 2. ad em
cum Linn.

michi haud nota

orientalis - f. foliis oblongis subrhombicis ^{glabris} ~~extus~~ inaequaliter serratis; cap
sulis muticis
Sida orientalis foliis ovato-acutis aut rhombicis ^{inferne} integri
supra inaequaliter serratis, stipulis oblongis linearibus,
pa capulis muticis Caran. Desf. pag. 2. v. 12.
fig. 1.

Habitat in India orientali.

Caulis ramosus. Folia breviter petiolata, ovato lanceolata
Stipulae lineares. Flores axillares plerumque. Pedunculi
petiolo parum longiores. Calyx angulatus. Caps. 9-10
muticis Car.

michi ignota

capensis L. foliis ^{oratorum} ovato. Can. ocolatis subrotundis ~~ve~~ dentatis: stipulis
ciliatis, capsulis muticis. Car. des. pag. 23 tab. t. 12. fig. 3
Habitu in cap. b. spec.

Caules erecti dumo apper. ramosis ~~pinis~~ virgatis.
Folia subsessilia. Stipulae lineares ciliatae pedunculato
longiores. Flores solitarii breviter pedunculati. Calyx
pentagonus. Cor. lutea. Fructus globosus. Cap. 10
Baran.

canescens L. folus rhomboidibus subtus villosissimis subsessilibus
stipulis petalaeis nigri erectis Cavan. disp. p. 23. tab. 8. fig. 3

Habitat in India orientali & in Senegal &

Caulis humilis fruticosus vix pedalis ramosis ramis
decumbentibus. Folia supra glabra subtus alba
extropium serrata. Flores axillares solitarii. Pedun-
culi folios longiores. Cavan

non vidi.

cordifolia L. foliis cordatis subangulatis serratis villosis Lin. Spec. pl.
pag 9614 Cavan. Diss. pag 19. Tab. 3. fig. 2.

Aethoa maderaspatana, subrotundo folio molli et hirsuto,
multi-pulis. Plukh. alm. 25. T. 131. fig. 2.

Malva bicornis, ballotes folio molli Bell. Elth. 211. T. 177.

fig. 207.

Habitat in Andra et ad Cap. 6 spec. C

Planta vel molliter tomentosa. Caulis teris villosus ramisque
erectus folia petiolis breviora cordato cuneata inaequaliter
serrata acuta subtus et junctura utraque mollissima
pallidiora. Stipulae petiolo femurquiculae. Peduncul.
axillares solitarii cum ramulo florifero longitudine
fere petioli villosi. Cor. Calycis villosi incani pentagonus
laciniis ovatis Caps: 10 villosa breviter; rostris fasciculatis
ultra calycem prominentis

habes spec. herb.
(405)

calyptrota lida foliis cordatis attenuatis dentatis

lida calyptrota caule herbaceo glabro foliis cordatis ovato-lanceo-
latis oblongis dentatis, floribus solitariis feminibus calyp-
tratis Bonpl. Desf. pag 57. et p. 276 tab. 133. fig. 11

Habitat in arenosis circa Lemam B

Caules teres erectus terpidatus ramosus. Folio petiolo longiora
semper attenuata. Stipulae capillares. Pedunculi longissimi
axillares solitarii uniflori. Calyx globosus. Corolla fimbriata
fulphurea. Fructus depressus decem sulcatus. Caps. 10 sperma-
^{calymna} lida lida lida lanceolata flava fecta utraque dentibus
prominentibus instructa. Cav.

non vidi

Spicata Lda. foliis cordatis ovatis ^{lig. utriq. attenuatis} subtus, florum inanis floribus racemosis

Abutilon repensum flore luteo majus Plum ii. tab 2. fig. 1.

Sida spicata foliis subcordatis acuminatis: pedunculis petiolo
parvo supra longioribus, capsulis pendulis obtusis, floribus

Spicata Cavan. Desf. pag. 24. tab. 8. fig. 1.

Habitat in America ^{fructu}
flos mollissima inicha. Rami teretes folia petiolata

bi 3-4 pollicaria supra ovata subtus venosa inaequa

+ ^{nervorum} ~~terminalium~~ loc. circuli loco stipularum. Racemi
terminales erecti, in meo compositi. Pedicelli paten-

tes pedicelli unguiculati medio geniculati. Calicis
calycis lanceolatis. Petala crenata. Corolla ^{fructus}

angulis plurimis exstantibus loculi monospermi

ex stipulari Linn

Spec. ad deid. Lupina, fuppon, pyramidata, Munaji + triloba
ninnoder subensa coronata, rermannoides mollissima