

Sidentis

* ebracteata

1. canariensis. fruticosa villosa, foliis cordato oblongi acutis ^{trilobatis} floralibus ^{ovatis} ^{fructibus} verticillatis ante florentiam nutantibus foliis ^{fructibus} ^{ovatis}
2. candiaria. fruticosa tomentosa, foliis ovato-lanceolatis cordatis apice ^{floralibus lanceolatis} ^{atque} ^{emittentibus} ^{subtus} ^{nerviis}, verticillis ^{sub} ^{oppositis} ^{floribus} ^{remotis} ^{foliis} ^{floralibus} ^{oblongis}
3. cistifolia. fruticosa nivesca, foliis cordato ovatis obtusis ^{partim} ^{fructibus} ^{verticillatis}, foliis ^{floralibus} ^{oblongis}
4. synaia. fruticosa ~~laeta~~ tomentosa lanata, foliis lanceolato-oblongis ^{floribus} ^{floralibus} ^{ovatis} ^{concoloribus}, verticillis ^{sex} ^{floris}
5. persfoliata. herbacea hispida pilosa, foliis superioribus amplexicaulis ^{floralibus} ^{cordatis}
6. montana. herbacea, calycibus corolla majoribus ^{superis}, lacinis ^{superis} ^{se} ^{trifidis}, foliis lanceolato-oblongis

7. romana L. herbaea decumbens, calycibus spinosis. labio superiore ovato, foliis lanceolato cuneatis serratis ^{reticulis hirsutis}
8. elegans L. herbaea villosa ^{vulgaris} diffusa, calycinis laciniis subaequalibus, ~~reticulis~~ foliis oblongis crenatis.

xx bracteata

9. sicca L. suffruticosa tomentosa, foliis linearibus integerrimis bracteis ^{dentatis}
10. hyssopifolia L. foliis lanceolatis glabris integerrimis, spicis interruptis, bracteis cordato-spinosis, calycibus aequalibus ^{spicis subimbricatis}
11. scordiodora L. foliis lanceolatis subdentatis supra glabris, bracteis ovatis dentatis spinosis, calycibus aequalibus
12. spinosa L. hirsuta, foliis lanceolatis bracteisque cordatis dentato-spinosis ^{spicis subimbricatis}
13. hirsuta L. foliis lanceolatis obtusis dentatis nervosis, bracteis dentato-spinosis hirsutis ^{spicis subimbricatis}
14. ciliata L. herbaea, foliis ovatis serratis, bracteis ciliatis
15. lanata L. foliis cordatis obtusis villosis, calycibus multilobis laciniis ^{spicis oblongis}

Sedentia

Sedentia hispanica erecta folio angustiore Tournefort. Inst. R. h.

Habitat in Hispania herb. Desfont. †

Caulis frutescens, basi ramosi, semipedales, caescentes. Folia semipollucina, lineana, villosula, integerrima, acuta: rudimenta foliosa ramulorum in omnibus axillis. Spica terminalis et verticilli plurimi distantibus 6 flori. Bractea cordata, venosa, dentibus spinosis uti calycis laciniis, ut tamen pungentibus, longitudine calycis.

Stachyoides Sidentis

Habitat in Syria herb. Desfont. 2

Caulis basi lignosus, erectus, striatus, subramosus, glaber, obtuse tetragonus. Folia sesquialtera
sesquialtera cuneata, crenata, lanata, profertim juniora, rugosa, inferne magis ap-
proximata, superiora remota, angustiora. Verticilli 2-5 remoti, 6-flores. Bractea
cordata, venosa, acuminata, pungentes, integerrima, villosa. Calyces uti Corolla
extus villosi: Latius ovato, pungentes. Corolla flava

Sidentis

marubiacetrum orientale, flore luteo minuto, in amplo calyce rotundi
tum Tournef. Cor. pag. 12.

Habitat in Armenia herb. Tournef. C

Caulis erectus, spithameus; basi ramosus, villosus; superne canescens.
Folia petiolata, unguiculata, oblonga, villosa, mucronata, cetero
rima vel extrorsum dente uno alterove, avenia, crenata, mucroni pun
gente
aut a montana satis diversa

Sidaea fulvifolia
Habitat herb. Tournef.

habes

Holoptelea Pidentis

Cavan

Habitat

Herb. ha. Her. Le Pauv.

caulis suffruticosus, basi ramosus; ^{ut planta} tota in cano-tomentos. Folia lanceolata, semipollucina, basi attenuata, obtusa, acuta, enervi, superne remota: ramulorum rudimenta in axillis foliorum. Verticilli superne, distantes, 6 flori. Bractea subrotunda, intus glabra, dentata, pungens, uti Calycis.

Yucca folia Sidentis

Sidentis aegyptiaca Yucca folia herb. Vaillant.

Habitat in Aegypto herb. Pers. f.

Caulis suffruticosus? lanatus, ramosis, niveus. Folia breviter petiolata, remota, semipollicaria, ovata vel oblonga, remote serrata, acuta, tomentosa, incana. Verticilli axillares, multiflori, tomentosi, incani. Calyces aristati, subquingentes. folia floralia integerrima.

Sidentis

Habitat in oriente herb. Mus.

Tota villosa tomento sa, incana. Solia lanceolata, ^{radicalia sesquipollicaria} pollicaria, inferiora petiolata, ^{laevina} obtusa, obsolete crenata: superiora scissilia, integerrima, suprema ovata lanceolata. Vesticilli remoti. Bractea cordata, acuminata, minima, pungens. Corolla bractei six longior, flava: labium superius bifidum.

Excludit synonymum Tournefort. in Sident. petiolato et huc refer
a S. D. synonyma differre videtur cui omnia magis lanata, folia versus basin attenuata. Bractea pungens

Sidentia

Trigonanum 11. Clus. hist. 355.

Sidentia hispanica erecta folio angustiore Tournef. Inst. r. h. pag. 191.

Habitat in Hispania

Erubescens semipedalis vel parum ultra, basi ramosa: rami intricati. Folia vix semipollicaria, linearia, patentissima, acuta, integerrima, incana, cum foliis utroque laterum in omnibus articulis. Verticilli plures, distantes. Bractea cordata, spinosa, pungens, uti dentes calycis. Calyx villosus intricati

bituminosa Lidentis

Lidentis hispanica bituminosa angustifolia caenata Tournef. *Inst. R. h.* pag. 192.
Habitat in Hispanica herb. Mus.

Caulis erectus, pedalis, fruticosus, ramosus: rami oppositi frequenter, erecti, altitudine saepe
caulis, glabri, superne oculo armato villosi. Folia sessilia, vix semi-pollicaria, linearia
extrosam partem dilatata, remote serrata, basin versus integerrima. Fasciculi foliorum
in axillis. Verticilli superne, remoti. Bracteae cordatae, spinoso-dentatae. Calycis
villosi purpurei.

Sidentis

Sidentis hispanica frutescens lignosior Torines. Guss. R. herb.

Habitat in Hispania herb. maj.

Caulis fruticosus, ^{basif}ramosus: rami erecti, simplices, inferne interdum glabri, cortice cinereo, superne villosi, interdum tota villosi, superne ramulosi. Solcia sespilia, canaliculata, sesquipollicaria, basi attenuata, seabriusculo villosula, supra linea ter, subtus venis simplicibus exstantibus, remote dentato-spinosa acuta. Vesticilli remoti. bractea dentato spinosa uti calycis eorumque longitudine. Calyx 4-lobus.

Sidentis

Metonica orientalis sidentidis facie, flore purpureo Tournef. Cor. 13.

Habitat in oriente.

Caulis plures, vel caulis. basi ramifer: rami simpliciter, rami. Folia inferiora in
netulum attenuata, semi pollicaria, villosa, superiora sessilia, lanceolata, distan
tia, obtuse serrata. Verticilli superne, et moti, folio florali equante. Folia
floralia ovata. Calycis limba terminata, vix pungente. Corolla est ut nomen
loso. Bractea integerrima, cuspidata.

foet. Dupina Iberici

Denti hispanica foet. Dupina glabra, flore purpurante et coma canescente
Tournef. Inst. v. herb. 192.

Habitat in Hispania.

Caulis erectus, glaber, ramosus, obtuse tetragonus: rami altitudine caulis. Folia
lineari-lanceolata, pollicaria, basi attenuata, integerrima, interdua respici-
entem dentem uno alterove uti apertum spicula terminali, remotam. Vestibuli fre-
quentes, hirsuti, incani, inferiores distantes, superiores approximati. Bractea in-
dulo, dentato spicula: spina alba innocua, uti calycis, inferius longior; omnes
flore longior

Carandulifolia Sidentii

Habitat in Hispania herb. Guss.

Caules plures, erecti, ramosi, villosi, canescentes. Folia unguiculata, linearia,
mucronata, integerrima, margine revoluta, mucrone pungente terminata. Fasciculi
foliorum in axillis. Verticilli remoti. Bractea cordata, nervosa, venosa, spinosa
dentata, longitudine florum. Flores utroque 6. Calycis pungentes.

Limfolia Sideritis

Sideritis hispanica crocea folio angustiore F. Pauc. hist. 191.

Habitat in Hispania herb. Auf.

Caules plures, basi lignosi, semipedales, erecti, simpliciter, superne villosi. Folium vix semipeltica
nei, lineana, integerrima, mucrone subpergente terminata, y lobis. Verticilli pinnati, parum
dispartes. Bractea cordata, villosa, frons plurimis dentata. Calycis pinnati, villosi, longi
tudine bractearum.

Indentata Dentii

Dentii hispanica bituminosa angustifolia crenata.

Habitat in Hispania herb. Aust.

Caules basi ramosi: rami elongati, villosi, canescentes, virgati. Folia petiolata, unguiculata, ^{vee petiolum vel} cana, canicollata, basi attenuata in petiolum, glabra, arena, sub nervosa, obtusa, utrinque dente 1 vel 2. subperforata. Verticilli biflori, remoti, villosi, incani. Bractea cordata ~~perforata~~-dentata, longitudine calycum. Calycis perispermici.

organifolia Lidentii

Habitat in Syria herb. Desfont

Suffruticosa. Caulis pedalis, inferne ramosus, villosus. Folia brevissime petiolata
ter, unguiculata, ovata, obtusa, integerrima, venata, villosa-mucronata. Verticilli
superne, remoti, multiflori, folia duo sub pagulo verticilli. Pedunculis utrin-
que 1, villosus, multiflorus. Bracteae lineares, longitudine calycis. Caly-
cis lacini 3 subovato, acuta, angustiores
an potius Nepeta frons

Cynoglossum orientale glabripilum, flore atrooculis
Habitat in Oriente herb. Mus.

habes

virgata. Sibthidi

Habitat in Syria herb. Desfont. 5

Similis S. incana. Caulis basi ramosus: rami elongati, incani, sesquipedales,
virgati. Folia pollicaria, linearia, incana. Verticilli plures, remoti. Brac-
tea ovata, dentata, juncta. Calycis tomentosi, incani: laciniis fetidis

glauca Pedenki

Habitat herb. De font.

Caulis superne trifidus, glaber. Folia remotissima, semipollucaria, lineari lan-
ceolata, crassifolia integerrima, glabra. Verrucilli distincti. Bractea
ovata, uti calycis enormes.

Tedeniifolia Sidentis

Galeopsis orientalis fruticosa minor *Venicifolia* Tournesf. Cor.

Habitat in Armenia. Herb. Desfont

Caulis ramosus, glaber, superne oculo armato velloso. Rami altitudine caulis. Folia petiolata, unguiculata, ovata, acuta, grosse serrata, glabra, a venis nervosa, subtus nervosa. Pedunculi superne, axillares, brevissimi, utrinque terni, uniflori. Bractea nulla. Calyx oculo armato velloso, dentibus quinque rigidulis nervosis.

glauca sidentis per radice perenni foliis lineariibus patulis glau-
cis subreticulatis Cavan. Fic. 2. p. 60. tab 104

Habitat in hispania &

Caules semipedales basi prostrati ^{integerrime} tumosi dein erecti
glauco uti tota planta. Folia radicalia lineari ob-
longa caulina opposita. Verticilli sex flori bractea
duo ovata squedentata. Corolla dilute rosea labi-
um superioribus linearibus. Semina ovata nigra Cavan

ovata Denti foliis ovatis crenatis: bracteis serratis-fimbriatis, glandulosis
an umbriatis Cavan. ii: 1. pag. 36. tab. 40.

Habitat in Panu

Cucurbita Licoeoides foliis lanceolatis breviter villosis apice spinosis, caulis
fruticoso humilis. Carum 4. No. 2 Tab. 304
Habitat in Hispania 7

Chamaedryfolia Lidentis folus cuneiformi ovatis incisive crenatis: bracteis
obtusis crenatis subsessilibus, cauli erecto ramis villosis Cavan. 4.
vol. 4 pag. 1. t. 6. 301.
Habitat in Hispania 4

non vidi

canariensis L. glutinosa villosa, foliis cordato-oblongis acutis petiolatis, spicis
verticillatis ante floriferaam nubantibus, ramis divaricatis den-
Scept. p. 801 & Jacq. hort. 3. t. 30.

Scitulus amplissimis verticillatis foliis, floribus albis parvis non galca-
tis, spica betonica Plukh. alm. 356. t. 322. fig. 4.

Habitat in Canariis &

crutesca Ramis tomentosis puberatis. Folia petiolata cordato-
oblonga attenuata, venata utrinque tomentosa, pubes supra
rindiosa subtus incana villosa tri vel quadrupollicaria. Folia
infera pedunculorum sessilia integerrima. Pedunculis ex
apice ramorum longis. verticilli multiflori distantes
bractea cordata attenuata longiora verticilli inter-
glabra. Calyx eschari, mucronati

verticillis multifloris foliis floralibus
bracteis ovatis

Candicans / fruticosa tomentosa, foliis ovato-lanceolatis cordatis apice
attenuatis subtus niveis, verticillis suboppositis remotis Hort. kew. 2. p.
209.

Stachys canariensis frutescens verbasi foliis Commel. hort. 2. p. 197.

t. 99.

Habitat in Maderaty

Tota planta tomento niveo tectis. Folia petiolata crenis 9. 10. se crenata
supra tomentosa et minus nivea quam subtus. Peduncululus terminalis
elongatus. verticilli ^{inferiores} remotiores. Folia floralia subpetiolata, integerrima
nivea linearia oblonga obtusa. Calyx 5 denter obtusi

trist foliis floralibus lineariibus.

Cretica L. fruticosa tomentosa, foliis cordato-oblongis obtusis petiolatis,
ramis divaricatis, spicis verticillatis Lin. Spec. pl. pag. 201 &

Rachys cretica latifolia Tournef. ~~cod.~~ 4. R. 4. 106?

Habitat in Creta.

Ind ex ramis densissime tomentosis novis uti reliquo partes
planta. Eolia petiolata obtusissima sequi pollicaria
petioli longitudo crenata juniora et pedunculati integerrima supra minus
na foliorum ^{na tamen non videntur} ^{an affores, etiam aqua nuton} spica ^{ordis et dichotomia} ~~dichotoma~~ ramorum
creta pedunculati tri vel quadri perleaves superne verticillati
duo vel terni. flores lutescentes in singulis verticillis
bracteis oblongis longitudine calycis.

^{novis}
foliis cordato ovatis utraque tomentosi.
bracteis oblongis

Synaca L. fruticosa tomentosa lanata, foliis lanceolatis integerrimis, floribus verticillatis her. Spec. pl. pag. 801 x
Sideriti cretica tomentosa eandem idiosmia flore luteo Tournef. corol.
12.

13. *Stachys minor* Italica Bauh. pin. 236

Pilosella synaca Bauh. pin. 262.

Stachys lychnoides incana angustifolia, flore aureo Barret. ic.

1107.
Habitat in Preta. 7

Caules plures adscendentes inferne ramosi lanati tomentosi uti tota planta. Folia lanceolata oblonga basi versus attenuata in petiolum superne sessilia. Spica terminalis verticillata elongata. ^{folia florales} Bracteae ^{conicava} cordatae acuminatae longitudine verticilli floris pallide flori

~~aliam ab hac vix discreta nisi caule foliis que dense villosi
nec lanatis potius perfoli
bracteis cordatis~~

perfoliata f. herbarica hispida pilosa, foliis superioribus amplexicaulis hinc

Spec. pl. pag. 0024

Sidentis orientalis phlomidis folio Tournef. corol. 12?

Sidentis foliis oblongis acutis amplexicaulis serratis, floralibus
cordatis acutis integerrimis Royen. huydb. 310.

Habitat in Oriente?

Caulis ^{erectus} pilosissimus pilosus. Folium inferum caulis petiolata, superiora
amplexicaulia cordata lanceolata attenuata pilosa subserrata venoso subreticulata - floralia cordata cuneata
integerrima. Spica ternis ex ultimo ^{capite} pedunculata. verticilli
approximati triflori. Flores longitudine bractearum Calyces villosi
f. dentibus spinuloso subpungentibus corollae extus villosi

folia inferum oblonga basi attenuata petiolata

mentana L. herbaeica, calycibus corolla majoribus spinosis, labeo superiore tri-
fido Spei. pl. p. 202 + Guss. fl. austr. 2. 1. 4 3 4

Sidentis montana, parvo variegue flore Bauh. pin. 233.

Sidentis montana, parvo flore nigro purpureo, capite medio croceo
Col. Ephr. 1. p. 198. tab. 196.

Habitat in Italia C

Caulis hirti folia lanceolata basi attenuata pollicemina nervosa
extorsum utrinque serratis parvis villosa. Corolla flava
margine ferruginea, calyce minoris verticilli 5 flori

in saxosis creta in pratis procumbens

romana *S. herbacea decumbens, calycibus spinosis: Labio superiore ovato. Lin*
Spec. pl. pag. 202 x

Sidentis genus verticillis spinosis Bauh. hist. 3. p. 420.

Sidentis, verticillis spinosis, minor procumbens Monf. hist. 3. p. 300.
f. 11. t. 12. p. 5.

Habitat in agris Europa australis et Barbano B

Caules plures procumbentes simplices hirti. Folia basi attenuata
pollucaria albo oblonga extropium spinata hirta. verticilli perflori
Corolla albo labio superiore emarginato

— Lame oblongo lanceo subcuneatis —

elegans? herbacea villosa, caule diffuso, calycium laciniis suboppositis
spinulosis Murr com. Got. 1770 p. 92. 7. 4

Mappa foliis ovatis tomentosis corolla alba cum limbo nigro Tabr
herb. Helmsf. Ed. 2. p. 106.

Habitat.

Cultus. Caulis villosus ramosus. Folia caulina petiolata, floralia sessilia
pelticaria, oblonga, obtusa ciliis crenato-ferata villosa. Verticilli
flexiles uti valde hirsuti prope summi floris parvi. Calycis
spinula terminati inermi Corolla labium inferius atropurpureum
superius emarginatum album apex lobis atropurpureis. Labium
lacinis calycis lanceolato.

herbacea, verticilli hirsuti, foliis oblongis crenatis

incana l. suffruticosa tomentosa, foliis lanceolato-linearibus integerrimis, basi
veis dentatis Lin. spec. pl. pag. 002. 7

Hyssopus montana verticillata major Boiss. musc. p. 17. 7 67.
fig. 2. Barrel. ii. 239.

Habitat in Hispania &

Stemulis six pedalis ramis simplicibus erectis tenuibus tomentoso
incanis uti tota planta. folia sessilia lineana exhorsum pan
dilatata six pollicana integerrima apice patula. verticilli
superne 3-4 remoti saepiori. per calycem dentes subpergentes
colla sulphurea

linearibus.

hyssopifolia L. foliis lanceolatis glabris integerrimis, bracteis cordato spinosis,
calycibus aequalibus Lin. 1. 5
Sideritis VII. Claf. hist. 2. p. 41.

Sideritis alpina *hyssopifolia* Bauh. pin. 233.

Habitat in Helvetia, Pyrenaeis, Thuriis &

Caulis basi perennans basi rami simplicis summi erecti tetragoni
centro villosi. Folia sessilia linearia ^{interdum lanceolata} ^{linearia} ~~oblonga~~
uniquiculana. Spica terminalis a vertice illius panem remoti
vel confertis. Bractea nervosa Calycis villosi. Flores flavi
~~Folia interdum vertice uno altero remota utroque~~

lobis oppositis albena
peltatis sem villosis

foliis linearibus

specie interrupta

Scordiscoides L. foliis lanceolatis subdentatis supra glabris, bracteis ovatis dentatis
spinosis, calycibus equalibus Lin. Spec. pl. pag. 8034

Dentes f. ferunabrit heraclea Lobel. ii. 523

Sidentis foliis hirsutis profunde crenatis Bauh. pin. 233. Basel.
ii. 343.

Habitat Monspeliis

Caulis basi perennans ascendens simplex interdum ramosi
ab hirsuta differt caulibus rectioribus; foliis supra saepe glabris
Corollae labis superiore etiam luteis. Spec. ovatis non emittunt
bracteis ovatis dentatis ciliatis spinosis

subimbratis

10-11. Sperosa Sidentis ^{Sidentis} hispida foliis lanceolatis bracteisque cordatis dentato-spinosis.
Sidentis spinis interruptis, foliis lanceolatis, utrinque dentato-spinosis Flora Amaz.

pag. 74. quamvis spinis non interruptis in meis.

Passim in Castiliis inque Amazonia Legi 4

Caulis basi ^{perennans} ramosissimus diffusus, ^{rigida} ~~non hispida~~, rigidus, herbaceus.
Folia lanceolata, basi angustiora, ^{rigida} hispida: dentibus utrinque binis spinosis.

Spicae terminales, sesqui pollicares.

Bractea ^{cordata} ~~ovata~~, ^{perispermata} ~~dentato~~ incisae, ^{perispermata} glabra, dentibus spinosis.
Calyces utrinque tres bractea brevioris, hispidi; lacinae spinosis, equalibus

hirsuta. foliis lanceolatis obtusis dentatis pilosis, bracteis dentato-spinosis
caulibus hirsutis decumbentibus. Lin. spec. pl. pag. 803 +

Sidentis III. Classe hist. 2. p. 40.

Sidentis hirsuta procumbens Bauh. pin. 232.

Habitat in Gallia Narbonensi, Hispania, Italia &

Caulis basi perennans ramifus rami adscendentes inferne inter
dum ramos duobus ^{semipediculis} hirsuti. Folia sessilia inaequaliter vel
paucum ultra. Folia interdum extrosum dilatata, serrata
nis adnigrae 3-4. pubes profertim hirsuti rugosa subplicata.
verticilli remoti hirsutissimi sex flori caule in verticillos
et calycibus hirsutissimi. bracteis cordato serrato-spinosis
& molle flavae tubo incurvo labio superiore nudo

ciliata f. herbacea; foliis ovatis serratis, bracteis ciliatis Thunb. fl. jap. p. 295 +
f. N. pag. 32.

Habitat in Japonia

Caulis herbaceus erectus, uti tota planta villosus, ramosus, rami in
flexi. Folia petiolata, acuta, subtus pallida supra punctis
impressis pertusa, vix pollicaria. Spica terminalis laxo
lato erecto, digitales. Bractea suborbiculata, acuminata
nervosa, ciliata, imbricata. bractei ciliatis non prope
a reliquis differt. Thunb.

lanata). foliis cordatis obtusis velatis, calycibus mutis lanatis, spica oblonga
caule erecto. Lin. spec. pl. pag. 8047

Habitat in Aegypto, Palestina &

• Planta fruticosa erecta tota lanata. caulis simplicissimus. folia
cordata subsessilia, obsolete crenata, obtusa. Spica in caule
longior terminalis et verticillis sexfloris remotis valde lanatis
Corolla atro-violacea, longitudine calycis. Bractea ovata, obso-
lite serrata, lanata lin.

S. lanuginosa. Bantiji