

Siderodendrum

Siderodendron

Coussarea violacea Jacq. secundum Aubl. secundum Richard

Habitat in Guiana herb. Jusf.

Rami glabri, teretes, apice compressi, scabri spuli. Folia petiolata, opposita, supra pollicaria, elliptico-lanceolata, utrinque attenuata, acuta, membranacea, venis sive venosa, glabra, supra nitidiuscula, integerrima. Petioli unguiculares. Stipulae truncatae, medio subulatae. Pedunculi ex axillis supremis, brevissimi, 3-5 flori, fusco-purpurei: pedicelli breves. Calyx dentatus. Corolla unguiculari

Siderodendrum

Character essentialis. Corolla tubulosa. Calyx subquadridentatus. Stigmata duo revoluta. Bractea dicocca bilocularis: loculi monoposonii

Siderodendron triflorum.

Sideroxyloides ferreum. Jacq. hist. pl. Amer. pag. 19. tab. 175. fig. 9.

In Montserrat legit Ryca 3

Vetus cum pennis Rami glabri, inferne teretes, superne subtetragoni, apice compressi.
ferum ad nodos Tolia petiolata, opposita, quinque-vel sexpolluciana, elliptico-lanceolata,
floridum Plum 40. acuminata, basi apiceque acuta, integerrima, utrinque glabra,
quid fur. tenuiter venosa, subtus parum pallidiora.

Petioles six unguiculares, subtus convexi, supra plani. Stipulae interfoliaceae, ovatae, acuminatae.

Peduncululi axillares, utrinque gemini, semiunguiculares, fistili, glabri; pedicelli tres, brevissimi. Bractea utraque ad basin pedicellorum, parva.

Calyx. Pentantherium breve, subintegerrimum, obsolete quadridentatum, glabrum.

Corolla monopetala. Tubus unguicularis, cinerascens. Lobi lacinae octogono, obtuso, patentes.

Stamina. Filamenta vix ulla. Anthera lineares, erectae, laciniis limbi dimidio brevioribus.

Pistillum. Germen inferum, oblongum. Stylus capillaris, longitudine corollae. Stigmata duo, lanceolata, acuta, revoluta.

(Corolla saepe mutatur, forte ab insecto quodam, in folliculos ^{um} oblongos, semipollicares, carnosos, ^{um} intus carnosos, apice acuminato ^{um} terminatos, fructum nascentes mentiens.