

Sideroxylon

1. mita S. inerme, floribus sessilibus
2. inerme S. inerme, foliis perennantibus obovatis, pedunculis teretibus, ramis
punitatis
3. mastichodendron S. inerme, foliis perennantibus lanceolatis, pedunculis unifloris
4. melanophloeos S. inerme, foliis perennantibus lanceolatis, pedunculis ag
gregatis, ramis lobatis
5. sericeum S. inerme, foliis ovatis subtus tomentosis - sericeis
6. cymosum S. inerme, foliis oppositis petiolatis, cymis compositis decompositis
7. lycoides S. spinosum, foliis lanceolatis deciduis.
8. decandrum S. spinosum, foliis deciduis ellipticis
9. spinosum S. spinosum, foliis perennantibus.
10. myrtoideum

myrtoideum Sideroxylon? inermis, foliis obovatis nitidis; pedunculi axillares
uni flori.

Habitat in Montserrat St. Ryan &

Rami teretes, glabri, cortice cinereo.

Folia petiolata, alterna, vix pollicaria, obovata, integerrima, coriacea,
glaberrima, avenia, obscure multinerviâ, supra lucida.

Petioles brevissimi

Pedunculi axillares, 2-3, uni flori, seminequivalares.

cum flores desunt, de genere dubito

punctatum Sideroxylon

Habitat herb. La Martini

Glabrum. Folia superne, flores subsessile

habeo

racinatum P. de Royle

Habitat in Carolina Herb. Desfont.

Rami teretes, glabri, flexuosi, punctati: ramuli juniores cetero, patentes simpliciflori et floriferi, fune una alterna lateraliter. Folia aggregata, semipollicaria cuneata, basi acuta, apice obtusissima, parum emarginata, integerrima, venosa, supra nitida, tenera. Pedunculi ex eodem puncto ac folia, plures uniflori unguiculares.

Des. Royle Bot.

mangilo Sideroxylon

Habitat

Herb. Thouini

glabrum. Rami teretes. Folia petiolata, alterna, oblonga, coriacea, bypollyana
obtusa, acuminata, enervia, integerrima. Petioli brevissimi. Flores axillares, plures
brevissime pedunculati.

vide la Mart.

Launifolium Sideroxylon.

Habitat. herb. Thourne

glabrum. Folia petiolata, lanceolata, tripolliana, utraque acuta, venosa. Flor-
na vidi, nam rami floriferi ad *Daph. mezereum* pertinent.

Sideroxylon

Habitat in insula Franco incolis bori de fer Ductum Bon mes. herb. Gus. 5.

Rami teretes, crassitie fere panna cygnea, glabri, griseo-punctati. Folia petio
lata, sparsa, sive pollicaria, elliptica, submembranacea, tenuissime venosa
glaberrima, acuminata, integerrima, utraque acutiuscula. Pedunculi
axillares et laterales, aggregati, 4-5, semiconguiculari. Petioli pollicia
res.

tenax *Sideroxylon* foliis cuneatis subtus tomentosis

Habitat herb. Guss.

Rami teretes, fusci, punctati, superne griseo tomentosi. Folia petiolato, cuneato, ceteri
gemina, interius submarginata, basi acuta, supra glabra, subtus aureo tomentosa, ob
liure venosa, polluciana vel ultra. Petioli unguiculati. Pediculi axillares, aggregati,
copiosi, petiolo parum longiores, uti calyces aureo tomentosi.

reclinatum Sideroxylon.

Habitat in Carolina Herb. Nutt.

glabrum Ramis junis ceteris, repleti. Folia aggregata, oblonga; basi acuta, unguiculata
senosa, integerrima. Peduncululi axillares, folio breviores, plures.

Salicifolium Pedunculatum

Habitat herb. la Mantii

Fructus infra foliaci, brevissime dunculati

Vidit la Mantii

nitidum Sideroxylon

Habitat herb. La Martini
glaberrimum. Sola petiolata, distantia, oblonga. Peduncululi autem illo
res, plures, unguiculares

Labelo

pauciflorum Sideroxylon

Habitat herb-la Martini

habes

contomease *Sideroxylon* ^{palmas} ~~plum~~ *inermis* foliis ~~plum~~ pedunculis solitariis ut illanbis
Lour-fl. Cochinch. pag. 122.

Habitat Cantone Siamum.

Interex Pandeni vero. Folia glabra alterna. pedunculis multiflo
n. ^{cori} *Caecum* si que interiori acuta. Baccia 4 loculoni sperma

non vidi

Somen tofum Berros

Herb. pl. Comm. Tab. 20

pauciflorum. Rad. inermis, foliis lanceolatis, acuminatis glabris, junctibus
subullopis floribus axillaribus. La Mart. P. E. 2. p. 42.
an Bumelia pentagona Swartz.

Habitat in America meridionali 5

multiflorus Sid.

nunciatum Sideroxylon inerme, foliis oblongo-ovalibus obtusis, glabris
basi subtus punctatis, floribus lateralibus subsessilibus. Lamour. F. E.

2. pag 42

Habitat in Carolina
an hujus generis

Tomentofum Sideroxylon inerme foliis oblongis obtusis junioribus tomen-
tosis pedunculis aggregatis uti illanibus longitudine petioli

Wild. spec. pl. pag. 1090.

Sideroxylon tomentofum Roxb. Corom. 1. p. 20. V. 20.

Habitat in India orientali 5

obovatum. Sidae spinosum; foliis obovatis obtusis, basi cuneatis, utrinque glabris
La Mart. P. E. p. 2. p. 42.
an Bumelia rotundifolia Sw.
Habitat in America meridionali.

non vid.

multiflorum
pauciflorum *Senecio spinosum*, foliis obovato-cuneatis obtusis glabris coriaceis
pedunculis divisiis fasciculatis lateralibus La Mart. P. En. 2 p 43.
Habitat in C. 6 spec 5
an huius generis

quora an sint limites inter *Senecio* Kunth. Achr. et *Chrysoph.*

non vid.

nitidum Demokylon enorme foliis ovato-oblongis glabris nitidis petiolatis
pedunculis confertis axillaribus La Mark P. E. 2. pag 42.
Habitat in Domingo &

non vid.
Munzella Swartzii secundum La Mark ad Siderox pertinet

argenteum. L. foliis ovatis, velut tomentosis, floribus pedunculatis Thunb
Habitat in Cap. b. p. 5

non in

Carex S. folius ellipticis lobatis subperennantibus, spenis foliiferis
pedunculis unifloris Walt. fl. Car. p. 100
Habitat in Carolina

non id.

mita *Beronylon inermis* floribus sessilibus Lin S.V. p. 232. Jacq. Coll. 2. p. 249. *

Beronylon mai inermis Mill. ic. p. 199. t. 299. f. Jacq. Coll. ~~ap. p. 249~~

Habitat in promont. b. p. 1/2

~~Arbor~~ Ramis ceteris ~~et~~ ^{et} ~~caulis~~. Folia lanceolata, acuminate, integerrima, glabra
coriacea, lucida, petiolata. Peduncululi axillares aggregati, teretes, breves,
alii simpliciter uniflori, alii multiflori. Corolla nivea, anthera flava.
Corolla rotata quinquepartita. Jacq. l. c.

~~non~~ ^{non} mea Lin. convenit sat bene cum Burm. Tab. 84. f. 7. et cum
cum descriptione Jacquinii haud satis in meo Folia oblonga obtusifolia
coriacea subreticulata, glauca viridia marginata basi acutiora
facie mauritania. Flores laterales et axillares glabri
descriptio ad *B. inermem* transfer

non vidi

inermis Desotylon inermis, foliis perennantibus obovatis pedunculis teretibus

Loisy Coll. v. p. 250

Desotylis primiv. deni Congo Indorum nomine data arbor Hill. Eth. p. 357. t. 265. fig. 344.

Desotylon inermis: inermis Lin. S. V.

Habitat ad Libyptis

Folia brevia petiolata obsolete retusa, subtus venoso rugosa subpubescentia
vindi glauca, obliqua nervosa. Flores axillares et laterales aggregati pe
dicellati. Corolla rotata herbacea albicans Bergius

Descriptio mea Ser. m. t. huc refer

ramis punitatis

ramis

Mastruhodendron bicolor ylor iner me folia perennantibus lanceolatis, pedunculis unifloris

Jacq. Coll. v. p. 253. t. 17. fig. 5

Cornus folia laurina, fructu majore luteo Patef. Car. 2. p. 75. t. 75.

Habitat in Carolina 5

non vidi confer Jacq.

Panicum Sideroxylon merone, foliis ovatis subtus tomentoso-sericeis Hort. Vind. 1. p.

262.

Habitat in Nova (South Wales) h.

non vidi

Cymosum siderostylum inermis, foliis oppositis petiolatis, cymis compositis & sic
compositis Lin. Suppl. p. 152. t. v.
Habitat in monte Tabulari Cap. bonifaci
Frutex parvulus

non vidi

Lycrodes spinosum, foliis canicollatis deciduis Lin. S. V. Duham. arb. 2. p.

260. t. 68.

Arbor folio salicis vindi alterno splendens, spini longioribus alternis

ad alas foliorum Boesh. leg. 66. 2. p. 263.

Lycrodes Hort. Cliff. 400*

Habitata in Canada

Facies lycii altitudo humana. Folia alterna, petiolata obtusa undulata
la integerrima vinda. Spina axillari brevi Lin. Witm.

Decandrum Sideroxylon spinosum foliis deciduis ellipticis Lin. Mant. 407 S. V. p. 232

Habitat in America septentrionali

Arbor spinosa axillares, solitaria. Folia alterna, elliptica laevia, reticulata, petio-
lata annua. Pedunculi axillares, uniflori, plerumque, petiolis paulo longiores.
Corolla sphaerica obtusa infundibuliformis. Laciniae concavae vix explicatae. Necta-
rium pentaphyllum, serratum, breve, ad singulam corollae laciniam singulo lobo
adnato. Stamina 10 subulata longitudine nectarii. Germen globosum. Simili-
s. lycioides, sed ab eo aut specie aut cultura nimis vanum Lin. M. L. C.

Deciduum foliosum