

Silene

Silene calycibus mucatis pertinet ad divers. pedunculo dicto
+ omni
s. + dentato. Rami oppositi, uti folia linearia villosi. Pedunculi
aeterni remoti, uniflori

S. pennsylvanica id est Tur.

Character specimen non mihi adhuc sufficient quamvis ipse
improbat

~~Silene nodosa ad hoc con. salab. n. p. 18404~~

Cot. folia. S. calycibus clavatis, petalis bifidis, foliis ovatis acuminatis
natis lobatis. Torr. J. 2. p. 165.
Habitat in Barbani

pinguis Silene

Lychnis mantima pinguis ex Corchia Boic. mus. part. 2. 65. 4. 54.
Caryophyllus sylvestris Vill. Clus. hist. 209.

Habitat herb. mus.

Radix dichotome divisa, nodosa, laxa, apice cauliferus. Caulis dichotomi; divaricati, villosi. Folia lanceolata, sesquipollicaria, basi versus attenuata, acuta.
Peduncululi ex apice et dichotomia, solitarii, uniflori. Calyx semipollicaris;
Petala bifida

Secundum Synonyma est Silene Salepaca L. Diversi tamen videtur

hirta *S. hesperis*, ^{spicata} ramosa, foliis lanceolatis attenuatis, calycibus ex
pedunculatis cylindricis fructiferis erectis petalis bifidis

Habitat in Barbana Scherboer ①

Caulis erectus pedalis, uti tota planta hirsuta ~~spicosa~~ ^{spicosa},
superne subcylindrica & crispis. Folia sespalia bipollicaria
si abnucula utraque attenuata. Pedunculi terminalia
5-6 pollicaria ~~floriferi~~ ^{floriferi} alteri ³ pinnati. Calycis ³ floriferi
cylindrici hesperis ³ fructiferi longius peduncula
ti & proli clavati

hirsuta P. flombus subpinnatis secundis. calycibus alternis hirsutis sessilibus
petalis emarginatis Par. d.
Habitat in Babana

non eadem cum frugosa

~~Par. d. 2. p. 169
Habitat in Babana~~

colenda P. calycibus alternis lobatis, petalis hirsutis, lobis pinnatis
Par. d.

Colorado Silene

Habitat

Red. La Mancha

colorata L. villosa, foliis spatulatis, calycibus clavatis rariemosis secundis
^{nudantibus}
Silene colorata: foliis spatulatis, calycibus alternis coloratis, petal
is bifidis Par. 4. pag. 186

Habitat ad margines agrorum Tuneti

Caulis basi ramosus, pedalis. Verticilli villosi. ramuli et ~~cauliculi~~
caeterum simpliciter. Folia spatulata pollicaria et ultra
mucronata ciliata profertim versus basin, ad caulem mem
brana ~~tereti~~ connata glabra oblonga. ^{ulm opposito minor} Peduncululi alter
ni infemi saepe triflori superiores ^{foliati} ~~triflori~~ ^{triflori} ~~triflori~~
brevi. Calycis decem angulati piloso superne ampliat.
Petala rubra bifida magna.

aliam in Italia egi caule ramosore foliis minoribus
crasporibus gl. calycibus angustioribus glabroribus
ut specie diversa

^{nudantibus}
floriferis infundibuliformibus fructiferis
clavatis petalis bifidis

flava Silene f

Habitat in Hungaria Vitebel
synthara cui ad ultim coctum simpliciter Varietas.
Caulis plures basi ter & subramosi adscendentes, fere filiformes, basi
apiceque pubescentes articulati articuli infirmi breves & comi. Solea inferius
runeata acuta, pollicina, quatuor vel quinque parum superiorum ramo
fidissima linearilanceolata ses & dec pubescentia densior in minoribus
pedunculi terminales plerumque solitarii interdum gemini uniflori
calyx cylindricus, pubescens decemurqueulari rix & semipollicari
Petala viridi flavescentia bifida, corona faucibus brevi

hemimaculatus glab. foliis lanceolatis perangustis petalis superioribus
brevioribus patentibus reflexis truncis inferiorum lateralibus
maculatis angustioribus. La Mart. J. Enc. pag 117.
Hab. stat. in Q. b. nei

non vid. i

ornata

Silene

petala profunde bifida; laciniis obtusis denticulatis

1820
1821
1822

+
menanella A corollis infundibuliformibus, foliis linearibus Len. P. V. pag. 874
Watsonia humilis, foliis linearifiliiformibus, tubo floris longissimo
Mitt. Bot. 190. t. 1. 1897.

+ menanella Glad color menianellus corollis cernuis, tubo duplici, limbi
laciniis ovatis, foliis enipiformibus ^{allopis} glabris Thunb. Glad. n. 11
Holl. ^{et} ^{var.} Hab. Lat. in Cap. b. p. rei 2
+
capis simplex sed qui pedale erectus vaginatus, superne
flexuosus. Folia unum vel duo in pappo, longe vaginante
vagina nervo striatis pilosa, sicapo breviora. Floris 3 vel
quatuor secundi cernui, flavo incarnati. Spatha lanceolata
uniquilari. Tubus duplex inferne filiformis, gemula
tub., inde cylindricus, curvus. Limbi laciniis subrotunda

ad Glad. amandanda

Sila fruticulosa caulibus basi lignescantibus, foliis spatulato-lanceolatis, calycibus cylindricis decemstriatis, petalorum limbo bipartito margine basi utroque undentato Massch. in Silod. Journ. p. 8. b. 16. pag. 461.
Habitat ad latera collum andanum inter Rubam et Siamathum 7.
Habitus *Cucub fruticulosi*. Flores a dichotomia

Silene

Silene maritima pinguis a Coscia Boiss. Mus. 2. p. 65.

Habitat in Coscia

Caulis prostratus vel parum ultra, villosus-viscosus, apice dichotomus. Folia sesqui-
pollicaria, remota, lanceolata, acuta, villosa-viscosa. Pedunculi a dichotomia
solitarii, pollicares. Calycis semipollicares, clavati, nervosi. Petala bifida.

Platone folia Silene

Lycinus orientalis var. *fofa* Centauri lutei folio, flore longissimo. Tournef. Corol.

Habitat in oriente herb. fusc.

Caules, ^{inter se quadrato} ut in tota planta, cylindrici, teretes, articulati, nodis inmersis, dichotome
ramosi. Solea sessilia, ^{superiorum} semi pollicaria, cordata, acuta, inferiora oblonga
subpetiolata, carnosae, ^{obtusae} arenariae, ~~per nerva~~. Peduncululi e dichotomia et apice,
bipollicares, viscosi. Calyces clavati, glabri, fructiferi pollicares.

Silene

Silene montana viscosa, sessilibus noctiflora angustifolia perennis glabra, floribus
amplexibris nunc albis, nunc subpurpureis Michel. in herb. Vaillant.

Habitat in Italia herb. Mus.

Caulis erectus, herbaceus, sesquipedalis, ramosus, scabriusculus, glaber. Folia
lineari-lanceolata, pellucida, glabra, scabra, Flores superne, oppositi,
pedunculati: pedunculi uniflori, folio longiores. Calyx purpureo lineatus,
unguiculari. Bracteae duae in pedunculo. Petala caduca
a n. sata a noctanti diversa?

Silene

Lycinus lusitanica montana foetida Tournef. Inst. rei herb.

Habitat in Lusitania herb. Mus.

Caulis plures, erecti, fruticatosi. Folia radicalia lanceolata, superiora ovata, acuta, villosa-subviscosa, uti tota planta, inferiora inter nodos fere longiora. Caulis apice bi-dichotome divisus. Calyx angustularis, sursum sensim latior

municata Pers

Lychnis orientalis angustifolia calycis frons rugosa Sherard herb Vaill.

Lychnis orientalis flore albente bifido calycibus pulchre rugosi

Habitat in oriente herb. mus.

Caules herbarum, erecti, teres, dichotomi, villosi. Folia ad ramificationes, sessilia inferiora pollicaria, sursum minor, villosa, coccinea, basi ciliata. Peduncululi ex apice et dichotomias superantur, ubi triflori. Calyces clavati, sulcati, semi pollicares, lineis elevatis sulcorum inferne spiraculis membranaceis, superne spiraculis albidis membranaceis in speciem incurvam deponentia mucronata, squar dentati.

patula Silene

β. Desfont.

Caulis erectus; ramis, elatus, nianus. Folia inferiora cuneata, petiolata, obtusiji
ma, superiora linear-lanceolata, villosa-tomentosa mollia. Bracteae confluae super
ne oppositae ovibus. bris vel ter dichotomis. Calycis nianis, strati
on parvis oxa.

Oryzoides Salene

Lichnus orientalis foliis subrotundo herbis viscoso, floribus minimis undulatis,
capulis longis

Habitat in oriente herb. mu!

villosa-viscosa. Caulis teres, erectus. Folia radicalia obovata, in petiolum latum
depressum, bipolliciana, trinervia, acutiuscula, glabra: caulisia simplicia, oblonga, tri-
polliciana, acuta, subvillosa, obscura trinervia. Pedunculi axillares et ter minales
oppositi, longitudine folii, apice bi vel ter dichotomi. Calyces cylindrici, villosi-
visosi: lacus setosus. Petala bifida: laciniis lineares, angusta
prope ygariteam

Silene

Habitat herb. mus.

Caulis decumbens, basi ramosi, pedales, rami altitudine fere caulis, glabri, teretes. Folia ciliata, floralia suprema recurva. Pedunculi laterales triflori terminalia lei budaeidomi. Calycis viscosi. Petala intus alba, extus vixenti albida.

an a Lych. orient. coryoph. holsteifolia diversa? an cultura mutata.

habes

Süpena Silene

Lychnis maritima Süpena *hirsuta* *crispifolia* Boissone Mus. 2. 170. Tab 118

Habitat in maritimis Sicilia herb. Mus.

Caulis plures, ^{basi ramosi} diffusi, uti tota planta, villosi, subnigri, palmares et ultra. Folia lanceolata, basi alternata, obtusa, crassa. Pedunculi terminalis, solitarii, uni flori. Calyx vix semi pollicaris, striatus, sursum sensim dilatatus. Petala bifida

Lychnis marina alba aversa parte rubra, viscosa, hirsuta, auricula mucifolia crasse ciliifido repando Cup. hort Cath

Silene

Lychnis maritima gadanensis angustifolia Tournef.

Lychnis minima hispida noctiflora Bot. monspel. app. 303.

Habitat herb. Mus.

Caulis subdichotome ramosus, pilosus, superne viscosus. Folia linearia lancolata, angusta
pollucaria, siliqua, remota: basi cili foliorum in axillis. Flores laterales terni.

Calyces floriferi tubulosi.

ven a *Silene nitida* ~~en pi~~ non differt.

Silene

Lychnis noctiflora angustifolia odorata Tournef.

Habitat herbanum Tus.

¶ Zan stirp. rar. ed. nov. 147. Tab 806.

Caulis altus, teres, simplex, superne divisus; inferne glaber, inter pedunculos villosus
viscosus. Folia inferiora glabra, superiora pubescentia, lineari-lanceolata, 6 pollicana
superiora angustiora et breviora, remota: folia sub pedunculis. Pedunculi triplin^{is},
positi, patentes. Flores omnes pedicellati, pedicellus intermedius parum brevior
Calyx pollicanis, striatus, pubescens. Petala bifida: laciniis oblongis
forte a paradoxa non diversa

Silene

Lycinus orientalis viscosa Saponano folio floribus Tournef. Cor.

Habitat in oriente Herb. Mus.

Caulis erectus, sesquipedalis, teres, villosus. Folia remota, basi in petiolum attenuata, sesquipollicaria, oblonga, obtusa, acumine brevisimo terminata, integerrima, glabra, trinerviâ, avenia, superiora sessilia, villosa. Petioli basi subconnati, margine villosi. Pedunculi superne et ex apice pollicares, uti calycer villosi-viscosi. Calycer plures fasciculati, 6-7, tubulosi, fere pollicares: lacinis fere 20.

ovata Silene

Habitat in Syria Herb. Desfont

Caules villosi, dichotomi. Folia sessilia, pollicaria, ovata, acuta, avenia, enervi, villosa, integerrima. Pedunculi ex apice et dichotomia, uniflori, 2-3 pollicares. Calycis six pollicares, clavati, villosi. Petala bifida

Flava Silene

Habitat Patna in herb. Desfont. 5

Suffruticosa, ramosa. Rami teretes, ascendentes, inferne glabri, superne villosi-
siosi, subanescentes. Folia sesquipedaliana, vineato-lanceolata, basi attenuata
obtusae, superiorum lanceolata, acuta, villosa, canescentia, suprema reflexa, Pe-
dunculi superne, oppositi, patentes, folio parum longiores, triflori: pedicelli
breves, laterales, bracteati. Bractea ovata. Calyx clavatus, villosus, cane-
scentis, striatus, semipollicaris. Corolla flava, ungue petalorum calycis lon-
gioris. Lamina obovata bifida: laciniis oblonga.

auriculifolia Silene

Habitat in Syria herb. Desfont.

Caules alternati, subcompressi, villosi, viscosi superne. Folia radicalia auriculiformia, bipollicaria, margine villosa, acumine brevi terminata, areolis, canalicula oblonga. Pedunculi terminales, terni; laterales triflori. Calyx villosus.

Silene

Silene orientalis supina maritima, capulis Lychnidis coronata Tournef. Cor.

pag.

Habitat in oriente herb. Desfont

Caules simpliciter vel basi ramosi, palmares vel parum ultra.

herb. No. a

pubera Silene

Habitat

herb. Buch.

habeo

Silene

Lycium cretica angustifolia et *herba* Tournef. herb.
Habitat in Creta herb Tournef.

habes

Silene

Lychno orientalis, minima, multiflora, flore seu se rubente Tournef. Cor. pag. 24

Habitat in Cappadocia herb. Tournef.

Planta ex palmaris, basi ramosa

habeo

Silene

Silene orientalis, Saponaria folio sub hirsuta Tournef Cor. pag. 24

Habitat in Armenia herb. Tournef.

Hirsuta, dichotome ramosa, pedalis et ultra. Sobo se qui pollicaria, lase
ceolata, acuta, basi attenuata. Pedunculi elongati, dichotomi. Flores
in dichotomia, breviter pedunculati, reliqui alterni, remoti. patenti
fimi. Calyx oblongus. Petala bifida

Silene

Lynchnis cretica, angustifolia, floribus longissimis infidentibus pediculis, capsulis pyramidalis Tournef. Cor. pag. 24

Habitat in Creta herb. Tournef.

Caules plures, pedales, erecti, simpliciter, inferne villosi. Folia radice alia oblonga, obtusa, basi parum attenuata, semipollucaria; superiora longiora, laniceolata, acuta, internodiis breviora, omnia villosa-punctata. Pedunculi ternariae, semel bifidi, diphylli, uniflori, cum pedicello in diversum, aphyllis longiore. Petala bifida. Calyx tubulosus, brevis. Capsula ovata.

Silene?

Lychnis orientalis, fruticosa, radi folio, Statice capitata Tournef. Cor. pag 24
Habitat in Armenia herb. Tournef.

Calice Caulis basi in ramos diviso; vane flenti, crassitie pennis asprino

habes

Silene

Lycinus orientalis, minima, Caryophylli folio, calyce persistenti strato. Tour
nef. Cor. pery. 24

Habitat in Armenia herb. Tournef.

Caules plures, vix palmares, simpliciter

Habes

Silene

Lychnis orientalis, ^{minima} gramineo folio, calyce purpurascente fructo Tournef. Cor. p.

24

Habitat in Armenia herb. Tournef.

Caulis plures, superne semel vel bis divisi.

habes

Lilene

Lychni ^{humilis} Graeca, umbellifer, polygonifolia, flore albo cum ciliolato
purpureo Tournef. Cor. pag. 24.

Habitat in Graecia herb. Tournef
Caules plures, digitales, basi rami

habes

Silene cretica maxima portulacis sylvestris folio. Torinae Cor
dichotome ramosa, villosa. Folia lanceolata. Pedunculati terminalia
ca. et in dichotomia, capillares. Flores parvi herb. Desfont

Obs. no 304

Digitata ~~Scheffera~~ Torst. Cham. ~~gen.~~ p. 20. t. 20
Habitat.

non vidi

argyrophylla. S. caule paniculato, foliis linearibus, petalis argyris
fr. integerrimis Port. et. 2. p. 169.
Habitat in Barbana

argyrophylla

vellosissima incana villosa hirsuta
nissensis L. foliis linearibus canaliculatis subaequalibus calycibus plentibus
clavatis fructibus obovatis

Silene nissensis villosa villosa, foliis linearibus obtusis, petalis
semibifidis fructibus ovatis calycibus decem striatis All. Musi
Taur. 5. p. 20. n. 123. fl. pedem. no 1576. tab. 44. fig. 2.
Habitat ad litora maris arenosi in Italia inque Barbaria

Caules ^{in fissis} diffusi dichotome ramosi basi decumbentes rami
diffusi ^{in fissis} prothamoi uti tota planta villosa copiosissima
incana villosa folia infima cuneiformia vix unguiculata
superiora linearia apice parum reflecta unguicula
obtusiuscula floralia parva ovata. Pedunculi
oppositi plerumque triflori. Calycis decem striati
Petala semibifida. fauce squamis subrotundis coronata.

Lycetani in aridissima pinguis e Corsica huc potius Horiconi Musi tab. 54
hinc forte potius huc quam ad Vallefrancam
in locis a mare remotioribus proetiusculu

Muscipula sil. petalis bifidis, caule dichotoma, floribus axillaribus sessilibus, foliis glabris
L. S. V. pag. 422

Muscipula Lb. Ad.

Lychnis sylvestris III. Clus. Hist. 1. p. 289.

Lychnis sylvestris vesicosa rubra altera Bauh. Pin. 205.

Helene floribus trifidis, foliis lanceolatis sessilibus, capsulis trilocularibus, floribus
ternis. Sauv. mon. p. 145.

Habitat in Hispania, G. Narbonensi

Caulis erectus strictus teres glaber ^{superne} dichotoms ^{ramosus}, nudus
menta ramulorum. ^{vesiculosus} ^{lanicofata} esse axillis. folia linearia ^{crusculifolia} glabra
arsenica sesqui pollicaria ^{et} flores ex apice ^{et} dichotomia
sessiles inter duo folia pedunculata. Calycis glaberrimi. Recepta
culum seminum ^{et} totum

— linearis lanceolata

Ed. T. De font

Scroderi P. floribus pedunculatis, caule viscoso humili: Octotomo.

Per. d. 2. p. 164

Habitat in Barbana

aleppica P. folus radicalibus cuneiformibus caulibus laniolatis
calycibus fructiferis oblongis subsessilibus remotis.

Halitatem in ore Allioni

Caulis pedalis erectus villosus dichotomus ramis patentibus

Folia radicalia et caudicibus cuneiformia mucronata

subvillosa caulina linearia laniolata basi ciliata

floribus ^{subsessilibus} in spica terminali saepe ~~interdum dichotoma~~

remoti oblongi non angulati striati semiunguiculati
res

umbella sil. erecta laxis, calycibus subglobosis glabris venosis, corollis inapertis Hort. Ups.

112. * S. V. p. 421

Vispago lusitanica, flore tubellovix conspicuus Dill. Elth. 324. t. 314. fig. 406.

Habitat in Lusitania, Oriente C. herb. 4 us

Caulis erectus, rectus, vix pedalis, non ramosus. Folia inferiora cuneiformia obtusa, superiora lanceolata; articulus supremus caulis longior. Flores congesti caulem terminant, dichotomi tres vel septem. Calyces glabri, cili subglobosi venosi. Corolla rubra bifida, vix unquam aperta, minutissima et vix conspicua Hort. Ups. l. c.

Caulis pedalis. Folia uncinata, pollicaria, glabra, crassa. Flores fasciculati. Calyces tubi nati, unguiculares, pallidi subvenosi.

conocida 1. calycibus fructus globosis ^{attenuatis} acuminatis striis trigonata, foliis
glabris, petalis integris. Lin. S. V.

Lychnis sylvestris 2. Clus. hist. 1. p. 200.

Lychnis sylvestris latifolia, calycibus virgidis striatis Bauh. pin. 205.

+ Habitat inter segetes Hispania O

+ Lychnis glabra annua, foliis oblongis mucronatis, flore amplo in
bello, capsula oblonga pyramidali. Monf. hist. 2. p. 542. f. s. 236.

fig. 6.

~~Caulis simplex vel subdichotome super ne parum diviso spitha
mou. erectus quadriflorus~~

Caulis simplex super ne dichotome diviso villosus villosus
folia sessilia sesquipolliciana glabra lanceolata inferna
basin versus parum angustata. Pedunculi ex apice et ducto
somni uniflori Calycis pollicaris attenuati villosi villosi
Capsula globofo-ovata acuminata. calyce brevior in

ab in sequente differt caule robustiore, foliis calycibusque
majoribus magis elongatis

conica L. calycibus fructus conicis semis triginta, foliis mollebus, petalis bif.

Dis. Lin. L. V. Jacq. fl. austr. 3. V. 253

Lycnium sp. red. in angusti folia, calycibus virgidi striatis Bauh. pin.
205.

Habitat in Hispania, G. provincia, Oriente C

~~Caulis simplex superne dichotomo divisus villosus viscosus. Folia
lanicolata sessilibus inferiora basi versus angustata. Pedun-~~

Lycnium orienta
lis nervosa flore
purpurascens
Tournef. Cor.
ser. herb. Jasf.

~~culi est apice et dichotomie uniflori Calycis ovati
attenuati fructu villosi viscosi pollicari fructus Capsula
ovata acuminata calyce brevior~~

Tota planta pubescenti sabianescenti. Caulis simplex vel
superne parum dichotome divisus folia sem. basi subconnata
lineari lanicolata attenuate pedunculis dichotomie
et apice uniflori calyces ovati laciniis valde atte-
nuatis capsula immixto longior.

Folia angustiora magis attenuata quam in conidea

bellidifolia L. Calycibus fructus ovatis villosis, foliis pilosis subsessilibus, petalis
bifidis L. S. pag. Jacq. hort. 3. 4. 81
Habitat.

michi ignota

virginica lilicolyibus floris cylindricis villosis, panicula dichotoma Lin. Spec. pl. p. 600 *

~~L. h. v. p. 21.~~
Lycnis viscosa virginiana, flore amplo coracino s. muscipula regia Pluk. alm.
231. t. 203. fig. 1.

Lycnis flore simpliciter precioso coracino, foliis acuminatis oblongis adpressis, caule
viscoso Gron. Virg. 161.

Habitat in Virginia & hab. Guss.

Planta polymorpha. Flores sive alychniis albi, ad saturate rubri; Calyces an-
gustiores quam in congenitibus, hesuti. Stamina cum stylis extra florem promi-
nentia. Caulis nunc simplex digiti longitudine, terminatus floribus infra
sciculam collectis, nunc pedalis apice trichotomus, pedunculo intermedio pro-
per unifloro. Folia oblonga s. lato lanceolata, ut in Gomphrena globosa.
Lin. Spec. l. c.

villosa viscosa. Calyces clavati.

Catesbei

P. calycibus cylindricis, petalis laciniatis, panicula
subtrichotoma. Walt. fl. Angl. Car. p. 146.

Habitat in Carolina

non vidi

caroliniana L. Calycibus cylindrico petalis oblongis, panicula subterestris
Wall. fl. car. p. 142.
Habitat in Carolina

non vid.

noctiflora L. Calycibus decem angulatis. Dentibus tubum squaratis, can-
le dichotomo, petalis bifidis. Lin.

Orymoides noctiflorum Cam. hort. 109. Tab. 34.

Lychni noctiflora Bauh. pin. 205.

Cucubalus calycibus fructus ovatis erectis: angulis decem: albemis
venosis Hort. Ups. 1094

Lychni orientalis Habitat in Suecia, Germania
Caulis erectus sesqui pedalis ^{dichotome} subdivisus villosus viscidus folia
longifolia lanceolata ^{subdivisa} utrinque acuta bipolluciana villosa
flore purpurascens peduncululi ex apice et dichotomia, Calyces florigeri cylin-
drici fructiferi ovati velosi viscidi
Tournef. Cor. secund. herb. frus.

ornata L. calycibus fructus oblongis carinatis pilosis, petalis bifidis; foliis
lanceolatis pubescentibus sessilibus planis, caule sessido Host. kew. v. p.

96.

Habitat ad Cap. b. p. p. B.

Planta mea an huius speciei similis noctiflora modo quod villosior
foliis nervis evidentioribus
folia et caulis pubescentia folia nervosa. Petala purpurea
facie Silene noctiflora.

non vid.

undulata S. calycibus fructu clavato-cylindricis pilosis, petalis bifidis;
foliis lanceolatis pubescentibus undulatis, caule adpendente Hort.

New. Z. p. 96.

Habitat ad Cap. b. frei ♂

non vidi.

Atrietia Sil. petalis emarginatis, calycibus glabris reticulato venosis acuminatis pedunculo
longioribus, caule dichotomo fiorito Lin. Am. Acad. 4. p. 314* L.V. p. 421.

Silene caule subdichotomo, floribus erectis subsessilibus, foliis lanceolatis petiolo
viscidis L. Clem. Ac. 1. p. 158.

Habitat in Hispania et Tolofo ①

Caulis erectus glaber, dichotomus, striatus, viscidus. Folia lineari lanceolata;
superiora longitudine articulorum. Calyces clavati, erecti, glabri, venis reticula-
ti, dentibus acutissimi. Pedunculi solitarii brevissimi, dichotomia caulis.

Corolla parva, petalis emarginatis, corona valde obsoleta. Differt a Sil. Baken
floribus erectis, calycibus angustis acuminatis, foliis angustis. Lin. Am. 1. c.

Oratis

inaperta L. caule dichotomo paniculato, calycibus lobatis, petalis brevissimis
emarginatis, foliis glabris lanceolatis. Lin. S. V

Sisyrinchium, inaperta flore Bill. Elth. 424. T. 379. fig. 407.

Habitat in Europa Australi ☉

Stamina sex: et corolla absque limbo

Caules erecti ad basem ~~veluti~~ pubescentes. Folia lineari lanceo-
lata superiora angustiora. Pedunculi filiformes calycis basi alu-
ti oblongi glabri tenui s. oblongioribus elevatis.

Opuntia ^{folia lanceolata tomentosa}
Opuntifolia Synonymus, ~~fo~~ calycibus hirsutis venis reticulatis supra
inversatis petalis bifidis Gmel. d. 3. p. 306. tab. 32. fig. 2.
Habitat in Persia
Folia lanceolata tomentosa

non nisi inter S. floribus & Dichotoma coll.

Becken 5. calycibus glabris ovatis venoso-reticulatis Lin. Spec. pl. pag. 599.

L. v. ^{vepiana}

Lychnis (Cretica), parviflorae purpurascens Willd. Elob. 427. T. 317.

fig. 409.

Lychnis cretica, parviflorae, calycibus striato purpurascens Tournef. Coroll. 22.

Habitat in Creta O

Caulis dichotome ramosus cretus villosus folia inferiora
cuneiformia superiora oblonga semiamplexicaulia sesqui
pollicaria obtusa aut interdum superne acuta, obtuse neu
rosae scaberrima margine serrulata. Pedunculi a dichotomia
et apice villosi in spontanea cespitibus brevissimi
Calycis tenues pallide submembranacea florum basin versus
narium angustati, fructiferi ovati

folia superioribus oblongis semiamplexicaulis

Endula l. Calycibus fructiferis pendulis inflatis. angulis decem scabris

Host. Ups. 1094

Cucubalus floribus & nymphis erectis, fructibus pendulis, calycibus striis
decem crispis. Host. Plett 170

B. Siliago hirsuta sicula, Lychnidis aquatica facie, supina Dill. Elth.
421. t. 312. fig. 402.

Habitat in Creta et Sicilia O

Lychnis supina ^{pubescenti} ^{v. rufus} ^{tami} ^{patentes} ^{divisus} ^{semipedalis} ^{stratus}
sicula calycis cuneata ^{post} ^{longipolluciana} ^{superiora} ^{conceolata}, ^{vellosa}
amplexime ^{fen-}
to ^{to} ^{tenes} ^{ref.} ^{4r/8} Calyces floriferi subilavati angulis piloso rufis. Petala
bifida rubra
v. h.
herb. Guss.

procumbens. S. Calycibus ovatis inflatis erectis obsolete decemangulatis
petalis subannulatis bifidis caule procumbente Murr. in Pom
jott. 1704 d. 05 p. 03. Tab. 2.

glaberrima
ruricola L. floribus erectis, petalis emarginatis, calycibus vesicibus, foliis lanice
latis Lin. N. fl. Dan. tab. 4. Jacq. coll. 2. p. 05.

Alpine alpina glabra Bauh. prod. 110. pin. 251.

Curicula muris alpina glabra Bauh. hist. 3. p. 360.

13. Caryophyllus holosteus alpinus gramineus Bauh. prod. 104. pin. 210.

Habitat in montibus aridis Europa septentrionali et Helvetia ♂

Caulis plures palmares ^{scissus} glaberrimi superne in ramos dichotomos
floriferos divisi geniculis incrassatis. Folia sessilia glaberrima
linguiculata glauco viridia, longitudine internodiorum, arena
acuta. Calycis campanulati petala alba

an huc Lychnis noctiflora minima flore etyco Bauh. pin. Boer pl. rar. 92. herb
Vall. Ded. 4. usque

— Lencani lanicolata

glauca glaberrima
glaucaifolia foliis oblongis glabris glaucis, pedunculis terminalibus ternis
Hab. sat in Hispania

Caulis fruticulosus adpressenti angulati digitales vel parum ultra
glauca ut tota planta. Folia semivinculata crassiuscula
avenia. Pedunculi terminali terni calycis campanulati

antirrhina l. petalis emarginatis, calycibus ovatis, pedunculis trifidis
foliis lanceolatis subciliatis L. l. v.

visago americana noctiflora, antirrhini folio Will. Ellh. 442. 1713.

fig. 403.

Habitat in Virginia, Carolina C

Cauli exili: octostomus oculo armato pubescent, Rami elongati
Folia inferiora subcuneiformia, superiora lanceolata ^{atropurpurea} ~~laevigata~~ ^{laevigata}
Cana arenae enervia integerrima. Flores ex apice ramorum
Calycer glabri utrinque angustiores, Petala pallide purpurea calycis
parum longiora

potensis L. Caule dichotomo paniculato, calycibus striatis, petalis bifidi;
foliis lineariibus Lin. Spec. pl. pag. 600 4

Habitat in Lusitania

Caule ~~sive~~ ^{inter pedunculis} pithanow vel panicula ultra ~~sub~~ dichotome ramosus. ^{inferne v. foliis} foliis angustis
fina internodiis dimidiis brevior. Pedunculi filiformes, longi erecti
ex apice ramorum plerum gemini alter longior angulifer vespis apicem
diphyllus alter brevior crispus aphyllus, Calyces clavati longi purpurascens
pubescentes lopes vides albedo striato.

pedunculis ~~stip~~ pubescentibus

polyphylla Silene foliis fasciculatis petalis: ramorum florentium oppositis L. S. V. p. 422

Lychnis fulvestris VIII. Clus. hist. 1. p. 290.

Lychnis fulvestris, plurimis foliis simul junctis Bauh. pin. 205.

Habitat in Pannonia, Austria, Bohemia &

Cretica l. erecta tenuis, calycibus erectis decemangulatis, petalis bifidis.

Lin. Hort. Ups. 1124 Spec. pl. p. 6014

Lycnis viscosa, foliis inferioribus bellidis similibus, flore minimo car-
neo f. rubro magn. bot. 126.

Viscago foliis inferioribus bellidis, superioribus tenuis calycis fructiferae
A. Turgidore Dill. Cat. 422-4314. fig. 404-405.

Habitat in Creta annua C

Caulis dichotomo paniculatus, patens, filiformis, articulis vispidis

foliis inferioribus cuneatis superioribus ^{congestatis} attenuatis. Pedunculi ex
apice et dichotomia elongati uniflori. Calyces glabri fructiferi
obovati. Antheris 10 elevatis

— foliis lanceolatis pedunculis unifloris

Senecio P. foliis lanceolatis canescentibus, pedunculis ternis ^{subcarnosis} *calycibus tubulosis*

Silene senecio foliis acuminate mucronatis hispitis lucidis, flore carneo
all. fl. ped. n. 1573. tab. 79. fig. 3.

Habitat ad littora maris in sabulosis Italia. ☉

Caulis teres statim a basi ramosus ramis appendentibus ^{pedalibus} simplicibus
ubi tota planta senecio incana. Folia inferiora lanceolato-cuneata
superiora lineari-lanceolata, omnia acuta. flos ternarius
calyx floris fere pollicari decem striatus & circum marginem
albido. petala magna lamina obcordata, dilute rosea bifida
squama faucis acuta

Cordifolia L. foliis ovali cordatis ovatis acutis; floribus terminalibus subsessilibus solitariis, caulebus simplicibus

Silene cordifolia: caule simplici foliis ovatis acutis, floribus subsessilibus terminalibus, petalis semibifidis All. fl. ped.

n. 1501. tab. 23. fig. 3

totaplanta

glutinoso viscosa

Habitat in montibus ^{ibid} neceanibus 4

Caules plures digitales vel palmares erecti, tenues simplicibus
mi leviter villosi ~~operti~~. Folia inferiora minora lanceolata
superiora unguiculata et panem ultra villosa. flos termi-
nalis solitarius vel terni brevissime pedunculati. Calyx un-
guiculatus pubescens decem angulatus. Petala semibifida
albido rosea. Capsula oblonga loculari

Oxytricha L. petalis emarginatis utrinque dentatis, foliis subtomentosis.
Lin. Suppl. p. 241. + S.V. p. 420.

Habitat in Aegypto

Caulis herbaceus, palmatis, brachiatis, terisime tomentosus. Folio ob-
ovata, basi angustata, vix carnosu lora acutiuscula. Flores
terminales; utrus alterve, pedunculati, erecti. Calyx
clavatus, subpubescens: dentibus brevibus. Petala incarnata
emarginata, calycis breviora dente utrinque acuta. Coto-
nula brevissima, obtusa emarginata lin.

Silene succulenta Forst.

numulo s. caulebus unifloris floribus maximis, calycis ^{sub} conato ventricos
campanulato hirsuto Wulf. apud Jacq. in Coll. 2. p. 126. tab 10

non vidi

Saxifraga L. caulebus subunifloris, pedunculis longitudine caulis, floribus hermaphroditis foemineisque, petalis bifidis in spec. pl. p. Borfai qu. coll. 2.

p. 37.

Caryophyllus Saxifragus Bauh. pin. 211*

Saxifraga antiquorum quibusdam Bauh. hist. 3. p. 330.

Lichnis minor Saxifraga Seym. ver. 431. t. 6. fig. 1.

Habitat in montibus cretensis Gallie, & talis 7

^{scaberrima vel palmata}
Caules fissi formis descendentes glabri simpliciter. Folia subulata
sive unguiculata glabra, fasciculi foliorum in axillis. Pedunculi
caulem terminant erectis unifloris Calyx clavatus glaber
limbo subtus rubro

foliis subulatis

elongata s. foliis linearibus ciliatis caulibus filiformibus unifloris ^{sub} nudis

calycibus glabris
Silene elongata. foliis linearibus, petalis emarginatis, calycibus subpelviformibus Mellandi observae. botan. pag. 60

Habitat Pedemontii subalpina Mellandi

Caulis cespitosus basi vaginis confectis foliorum secti. Folia unguiculata glabra excepto margine. Caulis vel potius pedunculus elongatus bipollicaris medio foliis tenuibus parvis. calyx campanulatus glaber
affinis cauli forte varietas

acaulis l. caulis depressa, petalis emarginatis

fl. Dan. 7. 20.

Lichnis alpina pumila, folio gramineo Bauh. pin. 206. Dill
Eltz. 206. f. 167. fig. 206.

Muscis alpinus, *Lichnidi* flore Bauh. hist. 3. p. 767.

Habitat in Alpibus Europae

Planta caespitosa caulisculis ramosisimo ramis brevissimis
loco in hemisphaeris collecti. Solia lineana conferta basi
imbricata vix unguiculata ciliato serrata pedunculata et apice
ramulorum inter uniflori solitarii interdum flos sessilis caly
ces campanulati glabri
vixet foliis brevioribus absque ciliis

alpestris S. petalis quadrifida, caule subnifloro, foliis linearibus canaliculatis
glabri Gaertn. cat. fl. austr. tab. 96

Lycium alpestris Lin.
quadrifida Scopoli

~~non in~~

non videtur alio et herb. Saxon. & cuius rami oppositi
folia linearia villosa. Pedunculi alterni remoti unguis