

Silene

xxx

vallis s. caulis subniflōs decumbentibus, foliis lanceolatis tomentosis longi
tudine calycis Lin. Mant. 305. all. fl. redim. n. 1574. tab. 23 fig. 2

Liparis maritima pinguis e corsica Boiss. mis. V. 54.

Habitat in alpibus valliacis, Valdensibus

Planta cespitosa. Solia ad radicem aggregata graminea lancea
lanceolata, ciliata unguiculata. Caulis decumbens palma
re rotundum ut digitatus vellosus pubtomentosus. Solia tantum duos

Caryophyllus in caule. Calyx rotundus plante magno unguiculato foliari
sylvestris Lin. VII plenum gemini levati membranacei angulis decolor purpureo
hist. 205

Caryophyllus alpinus lobis est rotundatis fimbriatis inflatus ut in Silene behen.

foliis lanceolatis tomentosis caulebus unifloris Hall.
ciliis oblongo ovato- Vulpago foliis lanceolatis tomentosis caulebus unifloris Hall.
hirsuta Brachin his 1. n. 910.

herb. Vadel.
Dedit Gust.

Decem angulatis vellosi

foliis lanceolatis ciliatis, calyculis

All. conic. figura melius a nostra recedit an specimen cultura mea

tab. synon. Boiss. non ne potius ad neocarpap. pertinet?

Silene

Lycchnis sylvestris cretica Reichen albo-purpurei florae parvo purpureo calice
fracto Tournef. herb.

Lycchnis cretica, parvo flae, calyce fracto, par purpureo Tournef. Cor. mag
24.

Habitat en Creta herb. Tournef

Caules plures, frusthamoi, ascendentes, foliis dichotomis divisi

polyphylla Silene

Lycium vescoxa erecta canephylloides Röhl. Sylloge

Lycium sylvestris minima flora muscosa Bot. Monspel.
Habitat herb. Aug.

Pauli formi pedalis, erectus, subramosus, tener, uti folia canescens. Tela lineana
unquiculata, angustissima. Pedunculi pubdehovomi, cum pedunculo in Echoto
mia. Flores parvi. Calyx sublavati, glabri.

peruiana Silene.

Habitat in oriente herb. Tuf. 4

Radix crassitibi digiti intermedie, superne in ramos diversos, e rizopodio foliorum dense dentata
folia in apice, rigida, constrictissima, ferruginea, ferruginea lutea (P. cast. - peripetalis) glabra
caule palmato, semi-pinnatis, simplicifloris, oculo armato, villosi, canescens; folia
caulina basi membrana connata, inter nodos breviora, canescens. Pedunculus verne-
nalis, solitarius, brevissimus. Calyx pinnatis, superne tubo fimbriam plato, pubescens

Silene

Lycinus erecta setacea ex folio Boiss. Pl. 2. 170. Tab. 110.

Glabrat herba Mus.

Pauli adspicendae villoso-virgineus. S. Olla inferiora oblonga, obtusa, basi attenuata, superiora lanceolata, acuta, semipeltinaria, avenia, enervia; marginie costaque villosa. Pedunculi 2. Dichotomii et apice, uniflori. Calyx unguiculatus, villosi, nervosi. Petala integra.

bicolor Silene

Lycne marina alba avifa parte rubra rufiflora, auricula muni crasso foliis latius
pulis separando Hort. Cath. 118.

Lycne maritima superna herpeto crasso foliis Boiss. mus. 2. 170 tab. 118

Habitat ad littora mari Sicilio herb. Mus.

Caule erectus, basi ramosus, rufiflorus. Pedunculi laterales, alter uniflorus; alter
bi-f. & triflorus. Petala bifida

Silene

Habitat herb. Gus.

Caulis erectus, hirsutus utri tota planta. Folia simplex, ex pollicarii linearis, angusta, basi connata membrana, remota. Pedunculi superne, terni (vel pedunculus brevissimus biflorus). Flores intermedii pubescentes. Calyx clavatus.

habeo

pulverulentum
dene

Lycchnis maritima pulverulenta folio carnosof Tournef. Grph. v. h.

Habitat herb. fusc. O

vellofa, creana. Caulis crassiflòe penne anserine, simplici, tereti, pugne rame
fusco. Solia inferiora cuneata, basi valde attenuata in petiolam, 5-6 pollicaria,
perfum minor, linearis lanceolata, acuta, crassa, molle. Pedunculi
superne, oppositi, primum trifidij deinde bis vel ter dichotomi, cum pedunculo
in dichotomia. Calyx fructiferi clavati. Cappula ovata.

Silene

Lycium speciosissima flore aequate purpureo granatina seu saturata rubra, nubecula per medium segmentato Hort. Bath.

Lycium superbum seu lata calyx amplexans Tournef. Hort. R. herb.

Habitat in Sicilia herb. Mys.

Caules erectus, subdichotome ramifer, vellosus. folia pollicana, lanceolata vel oblongo-lanceolata, basi attenuata acuta, vellopula. Pedunculi e dichotoma et alijs pinnatis, foliatis, uniflori. Calyx membranaceus, viridis, quinque nervis. Flores magni. Petala bifida.

Campanulata Silene

Habitat in ripis Baicalensis Siberia herb. Mus.

Pauli erectus; simplex, palmatis vel ultra, simplicissimus. Stems plurima radicibus,
6 c. in parte in caule, bipinnatis et ultra, lineana ^{caulina minor} ramos-pubescentia: florulae breves
marginè membranaceæ. Pedunculi oppositi, uniflori, folio florali breviores. Stems
verso nutantes.

Silene
tricuspidata

Lycoris alpina satellitum minusma flore albo, petali vnicuspidatis, semi rubor marginata
Sic Michel. Plant novae et neop. no 711.

Habitat in Italia Lest. Mus.

Ranunculari, filiformis, Digitalis; basi ramosa; glabri

habes

Tenuifolia Silene

Lycium orientalis frutescens, foliis angustis glabris, floribus pectati albi

Habitat in Oriente herb. Mus.

Ramulis plurimis suffruticosis; brevibus, ramosis: rami alterni, errecti; simplices; fructuosa
modo. Sola ^{anfangs} ^{suspenso} ^{erecta} semipeltaria, linearia, glabra. Flores alterni, floriferi et fructiferi
errecti; pedicellati.

habeo

Silene

Lycii nis orientalis Saponaria folio subhispido Tournef. Cor.

Habitat in oriente herb. prus.

Panis in spontanea super ne dichotomus, ramosus, cum flore breviter pedicellato in
Dichotomia, Veres, villosus, fraber: rami longi. Sola pollinaria, lanceolata, villosa,
acuta. Flores racemosi, distantes, interdum 4-5; interdum plures. Calyx oblongi,
hirsuti; breviter pedicellati: erecti feni oblongi, erecti:

Specimen ex horto Parf. commun: Desfont.

Sabina Silene

Lycne alpina incarnata longis calyculis hispida et pendulis Cap. host. Cath. L3

Habitat in Sicilia herb. mag.

Pauli eretur, duhotomus hirsutus, scaber. Folia sessilia, bipinnaria, oppositione bimaculata, lanceolata, obtusa nervosa, aenia, villosa. Racemi Verminalis, secundi, plenumque bifidi, raro indivisi, cum pedicello unifloro in diri fuso. Pedicelli brevisimi. Calyx cinctus quinque in singulo racemo, clavatis; hispiti. Petala bifida

Salvia-folia Silene

Lycneis maritima annua hispanica, Salvia folia Tournef. Gr. & R. herb.

Habitat in hispano maritimis. herb. muc.

Panice palmarum, statim a basi ramosi, velloso-virgofii, uti tota planta. Rami petioli
adspicentes, simplices. Solia squalia, semi-pollucans, linearis caniculata, obtusa. Pedunculi
axillares et terminalis, solitarii, uniflori, semipollucans. Petala subbifida

habeo

~~Salvador~~ Salazar S.

Silene

Lycium orientalis caryophylli holostei folio Tournef. Cor.

Habitat in oriente herb. f. s. decumbens sedales

Caules plures ^{tumescentes tempore florae} pretiosi, basi subramosis, articulis nodosis, ramos, villoso-cane
scens. Sola semipollucaria, inferiora confusa, superiora remotiora, linearia, angusti
fima, ciliata. Flores ex apice ramulorum superiorum et per minores. Pedunculi
in flori: flos inter medius sessilis, laterales pedicellati. Calyx vellosus; fructi, floribus
nisi tubulosi, sursum latiorer: fructi feri clavati, unguicularer. Petala trifida
lacinia lineares. Capsula ovata, parva.

~~Radix saponaria Diogo~~

naboo

Sobane

Lychne crista angustifolia, floribus longis flos, pedunculis cinctis, capilla
pyramidalata

Habitat in Crete herb. Taf. May.

Pauli erectus, sed qui pedalis, Terer, oculo armato punctatis, superne v. spars. Dolia
lespida, inferiore oblonga, unguiculata vel parum ultra, superiore laniola
ta polliciana. Pedunculi a Duthoniis et apice. Oalyces floriferi oblongi,
angulati, glabri, glandiferi ovati, decem liseatis.

in Crete.

Selene

Lycne orientalis caryophylli Hortensis folio Tournes. Cor.

Caules basi lignosi, ramofit[#] rami erecti, fere pedales, teretes, inferne glabri; superne pubescentes. Dolia sessilia, pollicaria, membrana brevi connata, pubulata oculo armato villoso, canescens. articuli caulis nodosi. Pedunculi duos tomi. Flores in apice. Polygynae ericti, foliarii, clavati, fere pollicariae, villosi. Petala biloba. lobii rotundati

articulati, nodosi

Prad ex superne dicitur

habeo

ciliata. *Silene*

Ranunculus alpinus orientalis

Habitat in oriente herb fus.

Planta cespitosa. Folia unguiculata, lanceana, ciliata, acuta, exterrorum
semper parum latiora. Caulis digitatus vel spathamei, folia duo vel 4 recto
tessima, simpliciflora; glaber, teres, uni-florus vel triflorus. Flores alter
ni, subsessiles. Calyx et fructus pri clavati, semi-polliares, nervosi, nervi villosi.
Bractea sua minuta ad basim pedicellorum

Silene

Lycchnis Lusitanica annua bellidis folio, flore purpurascente Tournef. i. v. herb
pag.

Habitat in Lusitania Herb: Gusf.

Ramulis semipedalibus et ultra, teretibus, pubescens; sub simpliciis. foliis cuneatis,
superiora lanceolata, semi-peltaria, villosa. Flores racemosi, secundi, digitato-
tegosi. Calyx clavatus, nivulosus, villosus, pungens fere hirsutus, fructiferi erecti.

legi in Barbaria

Silene

Borriano

Lycne orientalis ^{palmarum pluvia} pupina maritima cappulis lychnidis Tournes. Cor.

Caules humiles, Veretei, sublanatis. Sola inferiora cuneata, pupera lineana,
unguis ulana vel parum ultra, acuta, sublata. Flores terminalis. Nitid
tomea foliis, duo in pedunculi lateribus, bifidi; duo vel 3 flores ^{ramos} foliis
diffantes. Bractea duo glabris, lanceolata, membranaceis, acuto, parvo;
dorsum fuso villoso. Calyx villosum, intans vel sublatus, tubuloso.

Rabed

bellidifolia Silene

Lycoris *cupitana* annua *bellidis*-folia flore carneo Tournef. Guf. & herb.
neq.
Habitat in *Cupitana* herb. May.

Huber

Cuſtanica s. *hufuta*, petali dentati in diviſo, floribus erectis, fructibus
divaricato-reflexis alternis len. Spec. pl. pag. 5947
Sifago hufuta cuſtanica, bellato flore Bell. Elth. 420. v. 311. 5940.
Habitat in Cuſtanica C

a relegat *I.* quinque vulnera differt petali dentatae pallide
nubris calycibus fructiferis maturis hori dentatae patentibus.
~~florifer oblongi~~ Calyx clavati hufutis sum. & olia inferiora cuneatae ariente
coules plures fructiferi simplici formi folia florula leucana brevi

foliis radicibus curvatis

calycibus fructiferis ^{alternis} ovatis diuariato reflexis

strobila *infissari oblongis auctoribus*
herufata *s. foliis lanceolatis calyculis subfusilibus secundis hispetis pennis*
petalis tenuibus
~~*lilene herufata*~~ *floribus subspicatis secundis calyculis alborose*
hispetis, fusilibus, petalis emarginatis *Poir. et. pag. 187*
Habita in monte Tanei *in graminibus*

Caule pedalis simplicifloro erecti vellopi. Folia acuta
veli rigida vel substrobila, infissa oblonga superiora
lanceolata fer. quipollucaria floralia altero magore
lineari lanceolato altero minore petalos. Calyx angus-
ti pubolavati fer. pollicaro brevissime pedunculati. Peda-
comulus floriferis
ex ostilla rufina la angusta bifida subella
folia florali protes
flor. solitarius

calyculis fructiferis clavatis

an herufata Poir. et

ceratoides Sil. hispida, petalis emarginatis, fructificationibus erectis, calycibus subfiliis subspicatis Lin. S.V. p. 420

Silago cerasti foliis, va sculis erectis, spilebus Dill. Elth. 416 t. 309. f. 397.

Silene hispida, petalis emarginatis, fructibus erectis alternis hispiti spilebus Lin. Spec. pl. I. p. 417

Silene nigridula Am. Acad. 4. p. 313 *

Habitat in Europa Australi

Gifford a Sil. anglica cui primissima, paulo nigridore magisque divaricata, quamvis folia caulina utrinque pelosa et margine inferiore ciliata; floribus pedunculis brevissimis; bracteis erectis; calycibus paulo magis pelosis, et floriferentiis stria angulare fusa concava; petalis pallidis incarnatis. Lin. Am. t. 6.
folia operata, caulis simpliciter spinosus superne bifidus

— calycibus —

fructiferos erectis rotatis

multo haud patet nota

ceratoides Villarsii dicit Leibnitz

ngliae Sil. hispida petali emarginati, floribus erectis, fructibus ^{ovatis} reflexis pedunculis alter
no den. Spec. pl. p. 594 * L. V. pl. 420

Leychaeus sylvestris hispida annua, flore minore albo Vaill. Par. 121. t. 16 fig. 12.
Vipago cerasiformis, rufulis pendulis anglica Dell. Elth. 417. t. 309 fig. 398.

Habitat in Anglia, Gallia C.

Petala in hac non crenata, in Lusitanica et emarginata et crenata. Sola
inferior obvato - lato - rotata, versibus apicem ciliata. Calyx non pilosus, sed
angulis mucronatis aculeis reflexis vix conspicitur Lin. sp. pl. C.

Silene gallica Specie non differt

quunque vulnera s. petalis integrum subrotundis, fructibus erectis alternis

Linn Spec: pl. pag 595: 4

Lycoris hispida minor, flore vanegato Dod mem. 4. p. 99.

Lycoris sylvestris canuginosa minor Baum. pin. 206.

Habitat in Hispania, Lusitania, Italia, Gallia.

Paulis erectis Verso vell villoso-pubescente ramulis

Bulbi scapula laninean laneo-olata pollicana villosa

Palpis atillares plenimque foliatis alterni ovati
erecti pilosi uscidi. Petala obtusa vix emarginata integer
rima purpurea margine albo

ovatis

al' erectis

gallica s. floribus subspicatis alternis secundis, petalis indivisis, fructibus
erectis Lin. s.v

Lychnis pycnostachys hispida annua, flore menore carneo Vaell. pars
121. t. 16. fig. 12.

Viscago hirta gallica, flore parvo carneo, petalis integris Coll. Elth. 419.

t. 310. fig. 399

Habitat in gallica 0

eadem planta ferte ac anglica

nocturna s. floribꝫ spicatis alternis secundis pediculis, petalis bifidis

Lin. Spec. pt. pag. 595. 4

Lychnus sylvestris nocturna pilosa, floribus unius ordinis dilute-purpureis

Lychnus sylvestris hispida elatior spicata, lini colore Barbel. c. 41027 fig. 1.

Sisyrinchium hirta noctiflora, floribꝫ obsoletis spicatis Dell. Cth. 420. 4.

360. pag. 400

Habitat in Europa australi et Pennsylvania

Ramis erectis semipedatis simplici. Solea inferiora obovata con-
cava rigida floris profusa, ex bracteis oppositis alterni alter-
nam florente. Petala alba bifida, magis pila subtiliter vire
fientia nec post antheptum nuda. Lin-

Lychnus sylvestris alba, spica reflexa Mayr. bot. monsp. G. Cath. S. 3 hab.
Lychnus nocturna, floriculis albis subtiliter plumbis uno ordine G. Cath. Vaill.

vellosa — — — calycibus spicatis fructiferis oblongis

in Pennsylvania eadem

reflexa. S. petala bipinni, corona conditata, calycibus pubescens decurrentia
tis, florum alterne peti. off. 3 p. 21.

multe ignota

raspifolia. l. pedalis emarginatis, foliis suborbiculatis carnosis hispidis, racemo secundo
Lin. p. Pl. pag. 597 * L. V. pag. 421.

Habita in Cap. b. spei

Paulis bi-pedatis, firmus, hispidus. Rami alterni. Folia orbiculata, s. obovata, otte
spinosa, Portulacea, crassa, carnosa, utrinque veluta. sit extimae foliis magnitudi
ne. Racemus terminalis, secundus, Flores 8. f. 12. tragi. colore; calyx et hispidis; brac
teris ovalis. Petala emarginata, rite coronata. Lin. Spec. l.c.

non vidi

velloso *S. hospit*^{incana} folia lanceolatae ssp. plebeia petalis bifidi oblongis basi connate
sic Forsk. de For. pag. 180
Habitat in A. rubra.
tota incana folia confusa. Polycies larati secundi.

note apud

oymoidea L. foliis in flexoribus prothulatis superenoribus ovato-spathibus

Habitat in Hispania.

Caules filiformes rapi repente, uti tota planta glabri. Solia inferiora
petiolata superiore sessilia omnia acuta serrulata angustula. Pedunculi
ciliati ad apicem ciliati oppositi capillares uniflori medio foliis
bifidis parvis. Petala bipida.

cuneifolia vellosa petiolis integris crenulatis, foliis cuneiformibus bafi exaltatis
Forstii filii deper. pag. 210

michi hanc nota

~~forstii filii deper.~~

nutans. P. Horologium syriopum foliis lanceolatis, caule duobus ramoso,
cappulis reflexis
Habitat in Bonaria?
Simili d' uhotomo at caulis stratus, folia angustiora cappilla brevi-
ore non exserti, calyx es minor, menù attenuata
an a orthotropo diffinita
petala calycis planum longiora bifida

involuta P. petalis bracteis, foliis lanceolato linearibus spathulatis
subtus somentosum Forst. fl. arab. p. 210

Forst.

non vid.

chlorofolia s. calycibus glabri clavatis, petalis semibifidi, foliis glaucis:
inferioribus ovalibus, fimbriis cordatis amplexicaulis. Smith. pl. 1. p. 13.
Lycium orientale v. *spicatum*, *Centaurea* *lutea* folia, flore longo spissimo Tourn.
¹⁻¹³

Corol. 24.

Habitat in Armenia⁴

Caules plures, pedales erecti; dichotomi recte, glabri. Dolea oppositoria
nuda, glauca, fibra nona mucronata, margine scabra. Pedunculi
ciliati longi, medio villoso. Flores erecti maximi. Calyx glaber
vix rimus 10 ftinatus clavatus, dentibus margine membranaceo. Lobi
petalorum semibifidi. Capsula ovata Smith.

non nuda

mutabilis. Sil. petalis bifidis, calycibus angulatis pedunculatis, foliis lanceolatis linearibus ha

Am: Acad. 4. p. 314 * Spec: pl. pag. 296 * S. V. pag. 426

Lycchnis flore albo minus Raj. hist. 906.

Lycchnis arvensis minor anglica Raj. hist. 1004.

Habitat in Europa australi.

Differet a sil. nocturna, cui simillima: Foliis linearibus, nec ovatis, etiam ad radicem
floribus pedunculatis nec subfusilibus; Calycibus decagonis, foliis 10 profun-
dis, nec obsoletis; Petalis post florifertam extus purpureo-pentibus, nec viri-
cibus ha. Am. de.

notis ignota

*S. pedalis bifidis, floribus lateralibus secundum cernuis, panicula
nutans* Len. s. v. fl. Dan. s. 242.

Lychnis montana rufa alba latifolia Baub. p. 205.

*Silene foliis lanceolatis, caule paniculato, floribus nutantibus, calycie
finito, corolla involuta* Len. fl. s. 3004

Habitat in Europa borealibus pratis aridis &c superne interdum glutinofr.

Paulis erectus hisquipedaliis simplicies. Sola radicale lanceolata.
cuneato, ^{acuto} calicea linearia, interdum glabra interdum
et cassa vnde canescens & villes minutissimis orculo ar-
mato in dendis pedunculi opposti rafenores longiori bi-
f. triflori remote calyces clavati glabri. Corolla alba

amona sed petalis bifidis: coronula pubescens, glomeris secundis; pedunculis oppositis trifloris, ramis alterno leviter Spec. pl. p. 596. & S. V. p. 420
Lychnis marina Anglica Lobel. Cl. Tab. Bauh. Hist. 3. p. 357
Lychnis maritima repens Bauh. Hist. Pl. 205.
Lychnis perennis angustifolia marina anglica procumbens Monf. Hist. 2. p. 535. f. 5.
t. 20. fig. 2.

Habitat in Tataria; in Anglia meridionalis littoribus et

caules diffusi, leviusculi, ascendentes. Rami alterni, divaricati, breviorer. Dolia supra glabra. Racemus secundus: pedunculis oppositis trifloris. Calyx angulus 10. purpureo scutellis villosi. Petala alba, lobi bifida: Nectarii cellulari bifides, pallidi, stria alba. Lin. Spec. b.c.

paradoxa sib. floribus racemofis, calycibus decem pectatis ruficidis, floribus alios flamenibus
expositis, alius metuens spec. pl. pag 1673. & L.V.p. 420. Gallica hist. vol. 3. t. 84
Lycnis viscosa peregrina noct. flora odorata Zanon. hist. t. 109.

Habitat in Italia

Racuna sib. nutantis, sed aplo major. Dolia linearia lanceolata, canaliculata. Caulis
pubescens: alii florent ex sericeo pedale, alii steriles breves que pro fabro anno.
Flores racemofis: Pedunculus lateralis in floribus ruficidis. Corolla purpurea scintens,
alii albida, noctu explicata et odore: Petala semibifida, superenata: corona
acuta, superenata. Pistilla et stamna cum Clathris in aliis plantis pri-
mum prodeunt in quodivane aliis. In aliis plantis Pistilla max prodeunt
stamnia vero intra tubum floris effusa hincidit. Rami inter flores valde rixos
s. - ha Spec. l.c.

Caulis herbaceus, vellosuli, Teretis, Dolia lanceolata acuta, marginae
vellosulae, sericeo pallidiora, remota, superenata uscoph. Pedunculi super
ne oppositi, triflori, pedicellati, squales. Calyx velloso-ruscifi, angustior
Camer. Petala bifida: laciniæ linearis herb. Diffor

~~maki aplo~~

Lini folia Scleene

sub nomine Egyptiaci nrogo
caulis piliformes, erectus, ^{folia superna denseis}
pollicaria, oculo basi reticulata, super con canaliculata, subtus con-
vexa aiuta. Flores solitarii inque dichotomia. calyx clavatus
deinceps angustato-angustati pubescentes. Petala emarginata, calyx
puna longiora, albidio virescens.

pulvrenento C. folia oblongo - lanceolatis dentato - serratis raccisis, ramis pulvrenentis
fl. penus 1. pag 14.

Habitat in Canto prænuptis.

Caulis suffrutescens, organalis, ramosis summis scutis, Vener. Rami erecti patuli,
e pulvri ex concreatis asperi. Sola breviter petiolata. Pedunculi acillares foliatae
subquadri flori, foliolum unicum sibi pedicellis fl. Vener. l.c.

~~Lampranthus~~
~~oblongo~~
~~lanceolatus~~
~~dentatus~~
~~serratus~~
~~raccisis~~
~~ramis pulvrenentis~~
~~fl. penus 1. pag 14.~~
~~Habitat in Canto prænuptis.~~
~~Caulis suffrutescens, organalis, ramosis summis scutis, Vener. Rami erecti patuli,~~
~~e pulvri ex concreatis asperi. Sola breviter petiolata. Pedunculi acillares foliatae~~
~~subquadri flori, foliolum unicum sibi pedicellis fl. Vener. l.c.~~

glauca Silene

Habitat hot. Hafn. O

Folia glauca, glaberrima. Caulis palmaris geniculatis infra. Tis, Veres
4 simplicibus. Sola & sessilia besqui pollicaria cuneata one lenti
margine denticulata ciliata & crassiuscula, aerea nerva, pedunculus
terminalis oblonga ovata loco sub venosis, interstites pallidioribus. Petala
lineana bifida parva, basina alba Lacinia lineare anguste virga
cata, linea maxilaris purpurea in singula obtusa

~~Anserina plana~~ Anisotrum ⁶ caule erecto, spicis cylindricis, fructibus undique
¹⁰ armatis, foliolis linear-lanceolatis subtus hirsutis,
Habitat ad felum magellanicum Commerc. herb. Fiss. 4
Paulis simplicissimis, base squamis lanceolatis imbricatis, Veneris; Oria-
tus; inferne pilosus, apice hirsutus inanus. Solea planima radice
lata paucis in caule petiolata, c. vii dec 10 juga: foliola sessiles ex-
temora pollicaria vel ultra, opposita, in Veneris & ensim munere
alterna, infima minuta remota, interrima, reliqua profunda
permato puncticida, Dentibus ^{lineatis} obtusis scabulis supra glabra. Spica
terminalis, polliciam et ultra; flores inferiores sope remoti.

Argentariae Eustachia
60. d. 27th Sept. 1833. f. 112. 1/2
C. M. L. 1833

pedoedes Silene

Basis decumbentes adscendentē palmatae ramoscī e pīlī apicē
glutinosi: rami inferne dichotomi & viridi. Sola sessilia inferiora ce-
niformia superiora linearia. Pedunculi solitarii & dichotomast
apicē. Palpi clavati.

Ceratostylis Silene

Habitat in Hispania? 0

Paulis eretris pedalis parum ramosus; uti rami pedifolia marginie, pedunculi et calycis pilis glandulosis adspersi. rami dichotomi. folia
pedicellis remota, apicem pollicaria inferiora cuneata, superiora lineana
lanceolata, ciliata, apice reflexa supera conica ^{caespitosa} va, subtus con-
vexa villosa. Flores e dichotomia et apice solitarii. Calyx
viscosus tubuloso clavatus decim d'natris. Petala bipartita
extus viridi albito irrectentia supra alba. Corolla linearis
~~quam~~ ex corona fons brevi, squamis undatus. Rumenum fons
ex longiori. germen cylindricum

1088/16

~~Op. loc. 3. 900m by organonum 1000m
near Lucca, Liguria, Italy. Openings open 1000m by 1000m. dry ungrazed grass~~

8 cabinae : Pape folios lati orato, acuminatis ab aquis negari

ordines. Itinera deinceps regum et regalis. Sicuti. L. C.
etiam. Quoniam in natura subiectum a deo est omnium. formae
deorum. pulchritudo rerum. etiam. Yerades. domus. sicut etiam
naturae. etiamque. Hoc in nobis subiectum est. Quia illa tecum ducet
deum quinque vel sex adiuuantes. sed ut alio
~~ut ergo in. tunc deinceps formate. deinceps dominum. qd~~
deum. sicut etiam suorum. et hoc. id est. p. 59. in scriptura
Pater sub lumen. fratres. Ego vobis. acuminatis. afflatus incepit. qd
admodum. illud. 8. 5.
~~deinde. etiamque. ex parte mea. secundum formam. qd~~
Pater etiamque. qd. illud. 16.
~~modo. subiectus. etiamque. secundum formam. qd~~
Pater deinde. etiamque. secundum formam. qd
secundum secundum

~~Oct 20. 17. d. 1800~~

~~monogram~~

villosa Silene Dosthaloi misa

*Paulis semi pedalis uti tota planta mollescet villosum. Semiplast
Dichotoma Divaricata. Solia semi-petiolata super
ra decolorata crenulata, avenia Flores solitariae.
erecti. Calyx glomeriferi tubulosi, fimbriati clavati. Petala
calyx nonn. longiora rubra, bipinnata.*

~~Oct 20. 17. d. 1800~~

~~monogram~~

mis. 1800

americana ~~Brastinut~~ foliolis petiolatis elliptico - ovatis attenuatis integerrimis
subtus glaucis

~~Brastinus carolinensis~~, foliis angustioribus utrinque acuminatis pen
dulis Pater. Carol. 1. p. 80. V. 10?

~~Brastinus novae anglie~~; foliolis integerrimis, petiolis teretibus
Mill. Diet. n. s. D. Mart.

~~Brastinus americanus~~; foliolis integerrimis, petiolis per Veratibus
Linn. Spec: pl. 15^10.?

~~Brastinus acuminata~~; foliolis integerrimis, longe acumi
natis pendulis petiolatis subtus glaucis La Mart. Diet. bot.
2. p. 547.

~~Brastinus americanus~~; foliolis petiolatis oblongis acuminatis integri
mis, subtus glaucis

~~Tornidus in Jacto~~
~~La Mart.~~

~~Echada Lan & trans art. 6. Tuerib. Grecianum ib. Broderia I
Islandia ib. Mustela ib. Doryanthes & Leptospermum ib
Solex ib. rota ib. Pygea revoluta ib~~

Silene

Sub nomine clandestina missa pedales

Praeles diffusi platin a basi ramosi rami olyudine caulis dichotome
dorsi terete, villosum & calvusculi. Solea Berolina bisquipollucciana et
ultra inferiora curvata obtusa cibaria. Superiora linearis laniculata, mer-
gine & velli minutis rigidis & calvuscula inferre levata, crassa & rugosa
glabri. Flores solitarii in dichotomia et apice pedunculati. Calyx oblongi
linei & que delationibus cum foliis operacionibus alter noster apice quinque-
gulati coeterum teretiusculi. Petala calyx planum longioribus alba. tubo
flavescens bifida

~~as exterritio invenit in oris aquarum. Proximis paludibus.~~
~~de subterraneis manibus fuligineos, secundum.~~
~~de. Erit ex aliis locis levioribus, in nocturnis abhinc~~
~~comit. postea & ultra fortioribus, propter invenit, in inferis,~~
~~aff. aff.~~
Gunneria Schwerba s. V. 66. s. tenuis aff. nov. aff. 328. f. 1.

Bonarota 2 Poderota folis subrotundo ovatis, corollatum galea integroa Wild. Spec.
pl. 1 p. 77

Chamodrys montis Sumanus Baeh. Hist. 3. p. 289.

Bonarota montana Italica, chamodryos folio, flore coeruleo Mich. gen
19. n. 1. t. 15. f. 1.

Poderota Bonarota foliis serratis oppositis Lin. Spec: pl. 1 p. 20 Jacque
fl. Aust. 5. app. t. 39

Poderota coerulea; corollatum labio superiore indumento Lin. Suppl.
84.

B. Bonarota montana Italica chamodryos folio rotundore et quasi
circinato, specie coerulea habitu Mich. Gen. 19. n. 2. t. 15. f. 2.

Habitat in alpibus Austriae, Carniolia, Italiæ &c.

Saxum Veronicæ. Caules simplicissimæ, erectæ, rure, palmariis,
superiori villosis, pubescens. folia petiolata, plenariae sive rotundatae,
ovata subrotunda ovata vel polliciana, suprema et infima minora
subrotunda - ovata vel oblonga, obtusa vel acuta, a medio ferè
ad apicem serrata, glabra vel puli rauionibus adspersa. Racemos
terminali, pollicans. Palices pilosiusculi.

in Cauda

fructuosa s. petaliis trigedisi, caule fructuoso, foliis lato lanceolatis, panicula
unihoroma. Lin. I. V.

Ocymoides fructuosaum Lam. Hort. 109. V. 33.

Cynoglossum mystifolia Lichen albo limellis Baum. jun. 205.

Saponaria fructuosa, acutis foliis, ex Sicilia Bocq. fl. 5. V. 30.

Habitat in Sicilia, Germania

Caules ad scindentes basi perennantes Veretrustruuli inferne pubescens

superne rufosi. Cibae superne linearis lanceolata acuta

Pedunculi superne oppositi divisi. Calyx tubulosus superne

attenuati pollicares

oxymeris S. velloso canescens foliis linearibus lineolatis pedunculis
oppositis trifloris subramosis
Habitat in Europa australi? ex hotto parvas
Tota velloso cano caulis ascendens pedalis complexus nisi nisi
menta ramorum in distibus. Sola hypoleica rufa capitulo
basi versus attenuata, rufa versus apicem elevata proposita
basi. Pedunculi raiemoposi oppositi remoti basi rufioposi
in flor. pedicelli laterales sive iterum triflori. Calyx
tubulosa clavata. Petala semibifida
aliam fatisimilem modo minorem caule humilem
foliis minoribus pedunculis unifloris brevibus Neapoli
legi an prima tantum cultura diversa

an eadem cum fructuosa

upileuroides. Si petalis bifidis, floribus pedunculatis oppositis bractea brevioribus, foliis lanceolatis
acutis glabris. Lin. S. V. p. 420

Lycchnis orientalis, Bugleuri folio Tournef. Corol. 2. H. 2. p. 139. t. 154.

Plene caule foliis herbaceis, foliis lanceolatis acutis glabris, calycibus erectis.

Hort. Claff. 171.

Habitat in Persia

In meo nos 1574

non vidi

gigantea L. petalis bipidis, foliis radialis lobis Cochleariformibus obtusis pinnatis,
floribus subverticillatis Lin-Spec. pl. pag. 5904

Lycium gracile, sed: arboreferentis folio et fructu, flore albo Walth. locit
32. t. 11.

Habitat in Africa B. f. 5

T

tetragonum

Folia primis anni maxima. Caulis posterioris anni bipedalis, radim
ta nemorum in axillis crassissime digiti minimi obscurae tetragonum
vellosas articulis inferioribus brevioribus superioribus longioribus
nudis usque ad alter natum utrinque foliis exstans. Folia patens
lata saepe quipollae anapollae fragiles pubescentia. Pedunculi
communes opppositi horizontales patentia brevissimae, dichotomae
calycis pubescentes. Corolla vindex Capsula glabra evata

viridiflora s. petalis semi-bifidis, foliis ovatis Fabniis sculis auctis, panicu-

la elongata subaphylla Lin. Spec: pl. pag. 5974

Lycnis olympia in facie, flore viridi Herm. parad. 199. V. 199.

Habitat in Hispania

Racemis pedatis et ultra velloso-irsofis exectus oblongo Tetragonum foliis
utrinque estriatis, geniculis intus sati. Solia lanceolatae ovatae
acuta pubescens viridia. Panicula brachiatæ pedunculis
obtusis panicis floris. Calyx et nutantes cylindrici angules deca-
rifici uti pedunculi. Flores albidæ irscentes petales semi-
bifidis lobis recurvato crenatis Lin.

armena L. glori'bus fasciculatis festigatis, foliis superioribus condatis gla
briis, petalis integris Ls. 5. V.p. fl. Dan. v. 559

Armenius flor. quartus Dod. pempt. 176.

Lynchnis viscosa purpurea Catifolia loris Bauh. pum. 205.

Habita in Anglia, Gallia ♂

Caulis glaber ramosus teretiusculus. Sola fructuosa remota
suprema acuta, semiaplexicaulis, glabra Pedunculi dicti
tomi, Dichotomis foliatis reliqui fasciculati calycis clava
ti glabri. Corolla purpurea

semiamplexicaulibus

orchidea s. floribus fasciculatis, petalis quadrifidis, foliis ovatis glabris

Lin. Suppl. p. 241 & t. V. p. 422.

Synthesis grossa, bellidis foliis, verney flore nardo, deluteo purpureo ferte.

Tournefort Cor. p. 24. tab. 9us

Habitat in Oriente O

Caule debili stratus, dichotomia ad centrum pubescens superne subrufopurpurea nocturna vix granosa
inferne ramosa. Sola clavata glabra inferiora pauciflora (Glandulae
folia puberulae lin) superne glabra ovata sessilia. Flores terminales
dichotomie pedunculis solitarios ex dichotomia. Calyx pubescens
clavatus.

Silene atocion Gaerke

at supraemis ovatis sessilibus

foliis glabri inferioribus spatula

Scabie s. foliis infestioribus lanceolatis oblongis, pedunculis racemoso alterno
margini scabris
subtriangularibus
Habitat in Africa boreali Tunetii.

Radix pedalis erecta leviter pubescens ad radicem ramosa. Dolia radicio
lia cuneiformia obtusa basi ciliata bipinnata ramea caulina inferior
oblonga lanceolata obtusa superosa angustiora acuta omnia glabra
margini ore lenti microdentatibus minutis scabria. Pedunculi terminales
interventum bifidi cum pedunculo unifloro in duobus oncia relegui
alterni brevissimi. Calyx clavatus decem angulatus vellosi. petala
bifida calycis parum longiora