

Silybum

Cal. squamae exteriores appendiculatae, appendiculis marginibus
apiceque reflexis: intimis cochleariformibus. Pappus de
eodem pelopis

marianus & foliis amplexicaulis hastato pennatifidis serratis calycibus apiculatis, seminibus canaliculatis basi spinulosis Lin. T. V. p. 726

Carduus marianus Dalech. hist. 1475

Carduus albus maculis notatus vulgari Bauh. pin. 281.

Habitat in Anglia, Gallia, Italia aggeribus ruderalibus

Caulis striatus glaber

Folia

Peduncululi elongati uniflori. Calyx globosus. ^{Foliola} ~~Squamula~~ calycina
aucta squama rigida in spinam canaliculata
dentata marginibus spinis flavescens plurimis spina ~~spinis~~ ter
minalis spinulosa dentata

ovato attenuata

~~Squamula calycina~~

Calycibus squame spinulosa spinulosa

cernuus. Cn. foliis cordatis, petiolis crispis pinnatis foliis amplexicaulis, flori-
bus cernuis, calycibus pinnatis. Lin Hort. Ups: 2517

Carduus foliis ex cordato-lanceolatis margine serratis et pinnatis, squamis calycum
membranaceis laevibus pinnatis, capitulis nudantibus Gmel. ps. 2. p 47. 4-14

Habitat in Sibiria &

Caulei altitudine hominis nani sulcatus a medio ramoso paniculatus
folea radicalia cordato-lanceolata basi per petiolum parum decurrentia
infera similis radicalibus, superiora cordata per petiolos decurrentia
basi dilatati amplexicaulis, suprema angustiora fere lanceolata
omnes supra glabra subtus nuda margine serruloso denticulata uti
petioli. Flo. Pedunculus terminalis solitarius uniflorus. Calyx imbrica-
tus squamis reflexis inferis fimbriatis, fere saevatis in pinnatis ^{sup} calum
natis intermediis cochlearis pinnatis terminalis fere cernuis margine
denticulatis. Flo. paleae luteae Pappus simplex