

Sinapis

1. arvensis L. filiquis multangulis torosis - Turgidis lobibus rostro anei
natis longioribus
2. orientalis L. filiquis retroflexa hispida apice subtrigonis compressis
3. brassicata L. foliis obovatis denticulatis lobibus
4. alba L. filiquis hispida: rostro obliquo longissimo ensiformi
5. nigra L. filiquis glabris, racemo appressis
6. pyrenaica L. filiquis sinuatis scabris, foliis reniformibus lobibus
7. pubescens L. filiquis pubescentibus erectis rostro compressis, foliis lyratis
oblongis
8. chunensis L. filiquis lobibus subarticulatis pediculis, foliis lyrato-reni-
natis subhirsutis
9. juncea L. foliis inferioribus lyratis, ^{dentatis} summis lanceolatis integerrimis
10. Rossii A. DC. foliis inferioribus pennatifidis, superioribus petiolo-
tis lanceolatis serratis, filiquis ovatis glabris
11. montana L. filiquis glabris pedicellis incurvis, foliis pennatifidis
glabris, superioribus subsessilibus petiolatis denticulatis

12. emendat. S. siliquis lobatis aequalibus, foliis lyratis oblongis glabris
caule scabro.
13. allionii siliquis ovato-oblongis ^{sub} peltatis, foliis pennatifidis laciniis
inæquis
14. brachycarpa S. siliquis oblongis glabris, foliis pennatifidis laciniis
linearibus lanceolatis dentatis
15. hispanica S. foliis duplicato-pinnatis laciniis linearibus
16. incana S. siliquis racemo adpressis lobatis, foliis inferioribus
lyratis scabris: summis lanceolatis, caule scabro
17. corrigata S. siliquis lobatis, foliis lyratis glabris: summis lanceolatis
caule teri
18. cernua S. siliquis lobatis peltatis, folio radicali lyrato: lobis
terminali ovato-inæquis dentato.
19. japonica S. siliquis erectis lobatis, foliis inæquis-pennatifidis gla
bris
20. frutescens S. siliquis linearibus lobatis, foliis inferioribus
oblongis dentatis, superioribus lanceolatis integris, caule
glabro frutescente

naftasti folia Sinapis

Deid la Markt

Flexuosa Sinapi.

Habitat herb. La Martini

Caulis herbaceus, flexuosus, ramosus, retrosum pilosus. Folia petiolata, lyrato-pinnatifida: lobis oblongis, obtusis, dentato-angulatis, subtus in nervis pilis raris. Pedunculi superne et terminaliter glaberrimi; pedicelli patentissimi. Siliqua semi-pollucaris, hispida, rostro ensiformi terminata
aa diversa a Sinapi alba

brachycarpa Sinapis

Sinapi aegyptiacum luteum filiqua breviori crassa - Leppii.

Habitat in Aegypto herb. Mus.

Caule teres, striatus, glaber, uti tota planta. Folia inferiora, petiolata, oblonga, sinuato-
~~subsinuata~~ subserrata: laciniis ovata, dentata, superiora sessilia angustiora.

Siliqua pedunculata, oblonga, vix unguiculari, terminata, stylo longitudine aequa
filiquae.

an Sinapi Allionii, convenit certe in variis

Sinapis

Turritis orientalis ^{foliis} cichoraceis dentatis, flore lutes magno Tournef. Cor.

Habitat in oriente

Planta caespitosa. Caulis ^{vel ramum ultra} digitales, ascendens, raris pilis. Folia radica
lia copiosa, unguiculata, lineari-lanceolata, in petiolum attenuata;
caulina oblonga, semiunguiculata, acuta, basi angustata, omnia den
tata, serrata, subtus pilis raris stellatis, radus tubis. Flores flavi, magni
ratione planta. Calycis glabri. Siliqua baccata, rostrata, a pilis stellatis
incans.

sub nomine Chervanthi descripta ex herb. Desfont.

prostrata Sinapi

Habitat herb. Desfont.

Caules plures, prostrati, spithamei, rigidi, villosi, basi foliosi. Folia cuneata, semi pollicaria, stellato villosa, incana, indivisa, integerrima. Flores per a basi, remoti. Pedicelli breves, folium ad basin pediculi, pedicelli eoque longioribus. Siliqua unguis clares, hispida, dispersa, interdum torulosa, rostro compresso, fimbriato, verrucata.

alba L. siliquis hispida: rostro obliquo conypho ensiformi Lin.

L. V.

max. 429

Sinapi sativum alterum Dod. pempt. 707.

Sinapi apii folio Bauh. pin. 99.

Habitat in agris Belgii, Angliæ, Gallie. Pubescentia culta glabra
Caulis erectus striatus glaber, ^{pilis} ^{perispermis} ^{pubescentibus} ^{multis} ^{glabris} ^{tergatis}
laciniis oblongis alternis paucis, ^{dentatis} ^{terminalibus}
maxima dentato sinuata basi ^{dentatis} lacina retinque.
racemus elongatus. Siliqua patente pelis concosis pellucidis
adspersa rostro glabro

Sinapi hirsutum folio lobatis floribus sulphureis coloris Tour
ref. cap. h.

ut usi varietas albo videtur. Siliqua omnino similes: differt
foliis pennatis: pinnis sinuatis laciniatis: laciniis inaequalibus
obtusis. Siliqua pelis raris adspersa herb. must.

1
Sinapi Cateum procor foliis Lampsana Hist Cath. S. 3.

Planta non incana. Folium radicale laciniis oblongis obtusis, denta-
tis. terminalis subrotunda, supra villosa. Siolmuscula superior glabra
herb Guss.

Carpina

Cat. folia P

arvensis L. f. legum multangulicostoso ferebris Corvus rostro anicipiti Longio
nber Lin. L.V. fl. Dan. 8. 53.

Grön Buchf. hist. 257.

Rapistrum flore luteo Bauh. pin. 95.

Habitat in agris Europæ.

orientalis L. filii qui retrosum hippocidii cylicae subtetragonis compressis

Lin. Am. aced. 4. p. 2004

Sinapi orientale maximum, rapifolia Tournef. Carol. 17.

Habitat in oriente O

Simillima Sinapi arvensi sed tota planta retrosum hippocida
et filiqua salivata trifuriam retrosum piaba cum in.

S. arvensi glabra. Lin.

SV non vidi.

brassicata L. foliis obovatis denticulatis Corbrus Lin. S. Nat. 3. p. 231, 7

Sp. n. 602

Habitat in China

Natura Brassica aut Lactuca, sed Calyx Inaequus. Caulis si quidem
ei, longissimus. Folia radicalia obovata, obtusa, dentata glabra
albido venosa petiolis canaliculatis. Caulina media oblonga
ad basin petioli subauriculata, summa canaliculata simplicia
amplexicaulis. Flores similes B. oleracea. Calyx flavus
patens. Petala flava. Siliqua similis Brasf. oleracea
Lin

~~an~~ non vidi

negra L. filiquis glabra racemo appressi Lin. S. V. Fl. Dan

Linapi napi folio Bauh. pin. 99.

Habitat in agris videri in Europa septentrionalibus O

descript. hujus uti et arvensis deserventer cum praerogativa hucus
in herbario deservit

pyrenaea s. pleguiflora scabra, folis nuncinatis lobis Lin Spex
p. 934 Jacq. hort. 3. 4. 97.

Crypsinum dentis leonis folio, perenne pyrenaeum Tournef. J. R.

228.

Habitat in Pyrenis 4

Folia nuncinata lobata, costa albida. Radiculae carnis

triangulis denticulatis caulium concoloratis.

Caule lutescens. Flos parvi lutei - siliqua recta

sileo strata, scabra pilis siliqua spectantibus obsoletis
h.

Allexii s. pyrenaea diversa recta

non vid.

pubescens & siliquis pubescentibus erectis rostro compresso, foliis lyratis
vellopi Lin. Mant. 95. & V. p. 602.

Sinapis hirsuta, caulibus frutescentibus, foliis inferioribus lyratis
& pennatis auriculatis, superioribus linearibus lanceolatis
Ard. spec. 1. p. 21. & 9.

Habitat in Siedes monte Busambarensi &
Tota planta ^{pubescens} ~~pubescens~~ ^{canescens} ramosa, canescens folia inferiora
lyrata laciniis oblongis remote dentatis terminali
lobata ovata dentato-repanda superiora dentata intesa
oblonga basi attenuata. Siliqua erecta pilis longis
hirsuta.

chenensis L. plegui lobis subarticulatis patulis, foliis lyrato uncinatis
natis subhirsutis Len. man. 95. + S. V. p. 632.

Sinapis plegui glabris subarticulatis divaricatis, foliis in senoni-
bus lyrato-pinnatis auriculatis, superioribus linearibus lacini-
latis Ard. spec. 1. p. 23 & 10.

A habitat in China? O

Caulis inferne hirsutus: folia costa ^{aquea} pabra & margine denta-
ta. flores parvi albi

Junica L. ramis fasciculatis, foliis summis lanceolatis integerrimis
Hort. Upp. 1914 Jacq. hort. 2. t. 171.

Sinapi indicum maximum, latius folio Herm. parv. 230
t. 230 ^{max.}

Habitat in Asia, China O

Caulis bipedalis erectus teres nec striatus nec patulus leviter
ramis fasciculatis. Folia inferiora ovata latius

librae fere rami formia: superiora lanceolata, integerrima,
indurata, utrinque glabra. Flores stipites sinapi areolati
sed angustioris rami tuberculato, terose lin.

Cum lobe lacini terminali oblonga magna inaequaliter
profunde dentata

lobis sinapis lobo terminali oblongo magno inaequaliter
dentata herb. Jacq.

mea omnino eadem ac. *Linnaeus*

Diospyros: foliis inferioribus pennatifidis superioribus petiolatis lan-
ceolatis serratis, Siliquis ovatis glabris

Habitat in oriente Tosph.

glabra ramosa erecta. aunculo duo in foliis superioribus
lanceolatis dentatis lacinia extrema In pollicia nisi
basi utranque lacinia duobus remotis, serrata. Siliquis
breves rostrati.

mantima. foliis pennatifidis glabris superioribus petiolatis denticulatis
subhastatis, filiquis glabris pedicellis inermis

Sinapis mantima All. fl. ped. n. 9614

Habitat in mantimis Italiae

caulis erectus glaber ramosus sesquipedalis. Folia inferiora
pennatifida laciniis lanceolatis dentatis superiora petiolata
lineam angusto lanceolata dentata supra deorsum uno alterove
loco laciniis utrinque ad basin subhastata. Filiquae angustae
nolliculares glabrae pedicellis inermis

enicoidea L. siliquis lobis aequalibus, foliis lyratis oblongis glabris,
caule scabro Lin. Mant. 429 Am. acad. 4. Gaëqu. hort. 2. T. 170

Sinapi hispanicum pumilum album Tournef. G. R. H. 227.
p. 322x

Enica sylvestris, flore albo, Italiae Barba. id. 132.

Habitat in Italia, Hispania ad vias, vineas &
Pauli scaber. folia Enico, sed magis oblonga, undia, glabra

Petalis alba Diophani erecta ungueculana vix distincta.
Calyx + patens specus violaceus. Sepala glabra pedunculis
patentibus Lin
mea in 4. usq. eadem

alleioni. S. Siliquis ovato oblongis patulis, foliis pinnatifidis: laciniis incis. Gaigu. hist. 2. t. 160. p. 602.
~~Suaresia pyrenaica~~

Habitat.

Caulis glaber ramulos. Folium petiolato glabrum. Folium laciniato ^{lobis} pinnatifida laciniis lanceolatis inaequaliter remota paucis: dentatis fuscis subseruatis. Siliqua brevior crassior quam in reliquis glabra; laves rostro brevi brevi subbiloba.

forte Pyrenaica All.

~~brachycarpa~~
Chinensis
brachycarpa

f. foliis pennatifidis foliis oblongis glabris

Habitat in China

lacina foliorum anguste lanceolata dentata. Folia ad costam
usque pectata nec ad medium ut in *brachycarpa* Allionii cui
satis similis

habui ab alio juveni sub nomine *brachycarpa* vel *brachycarpa*
Chinensis *Thunbergii*

recurvata L. pilosa foliis pinnatis fissis

Hispanica L. foliis duplicato-pinnatis: laciniis linearibus Lin
P.V.

Senapi hispanicum, mastudii folio Tournef. J. B. H. 227.

Habitat in Hispania

Caules plures, erecti, pedales, ramosi, glabri, teretes, laevi. Cilia
bipinnata, pinnae lineares, anguste, serratae, serrulae, dentatae
aliquae semipollicares, utraque acuta glabra, rostro subu-
lato brevi herb. Tuss.

incana. Siliquis rademo adpresso lobatis, foliis inferioribus lyratis.
scabri: summis lanceolatis caule scabro Lin Am. 4. p. 2014
Paquet. herb. 2. 8. 169.

Erysimum foliis puberulis, siliquis brevissimis Herm. parisi. 115.

N. 155

Habitat in Gallia, Lusitania, Hispania &

Caules tripedales, ramosi, teretes, vides, scabri. Folia cana
ferentia: inferiora pinnato lyrata repando dentata
utrinque scabra: extima ovata majori: caulina summa
lanceolata, lobata petiolata. Flores lutei, calycis
colorati. Siliquis compressis brevibus, frapo ante adpresso
ut in Erysimis officinali her

hispida L. foliis lineato pinnatifidis, caule retrosum hispido,
piliis hispidi in rostro lineari obtuso piloso incanis
Habitat in Regno mauritano Schouboe

Conyza L. piliquis lobis patulis, foliis lyratis glabris: summis lanicula

in caule lori Len. Am. 4. p. 201.

Enysii varietas Heron. par. 155.

Habitat in Lusitania, Hispania O. S.

Habitus et omnia P. idicno sed folia glabra, caulis glaber
Lovesimii. Piliquis sic non adpressi sed magis distantes
flores majores Len.

si naca lundii folia sup non sunt petiolata integerrima
vel pubescentia

non vid.

cernua L. Siliquis lobatis patulis, folio radicali lyrate: lobo terminali
maximo ovato inciso dentato Thunb. fl. jap. p. 862 t. V. p. 602.

Habitat in Japonia

Tota glabra herbacea, Caulis erectus frutescens lavis ramosus; ramu-
lamulosi. Folia petiolata, inciso pennatifida angulis rotundatis
acuta digitalia. Summa folia minus profunde pennatifida,
apice saepe dentata. Racemus longissimus. Peduncululi capillares
patenti erecti. Siliquis erectis, subangulatis, lavis, glabris, apice
attenuatis. Thunb.

non vidi

Japonica *S. filiquis* erectis lobatis, foliis inciso-pinnatis sedis glabris
Thunb. fl. jap. p. 261 + S. J. p. 602.

Habitat in Japonia

Tota glabra. Folium radicale Lyatum: Cili suboppositi, oblongi
integri, semipollicares, longitudine in ternationum: Terminalis
ovatus, obtusus, incisus, dentatus: dentibus latis, parum incisus
nervosus, magnitudine fere folii Brasiliae. Folia caulina
subopposita, oblonga inferne integra superne dentata, nervosa
d. igitalia, superius versus inferius minor. Caulis striatus,
glaber superne ramosus. Rami florentes cernui. Flores albi
pediculi capillares. Siliqua lineari apice attenuata
loves glabra. Thunb.

frutescens l. foliis lineari-bus lobatis, foliis inferioribus oblongis dentatis,
superioribus lanceolatis integris, caule glabro frutescente Hort. Kew
2. pag. 404.

Habitat in Madera 4

non vidi

millefolia L. foliis bipinnatis: pennulis ovatis serratis

Pauc. Coll. 1. p. 41. et rar. cent. 1. v. 87.

Habitat.

non vidi

parviflora Sinaps foliis oblongis ^{superioribus lanceolatis} subpetiolatis dentatis
caule glabro ~~habitu~~

Habitat in India orientali

caulis herbaceus erectus flores minuti

municata

S. foliis mucronatis caule mucronato
legi in Europa Australi
planta dubia filiqua non vidi.