

Siphonia

elastica Siphonia

Hersea guianensis Aubl. fl. Gu. pag. 371. Tab. 335.

Fatoupha? elastica foliis ternatis ellipticis integerrimis subtus canis-  
longe petiolatis. Lin. Suppl. pag. 422.

Paoutchouc. Richard.

Habitat in Guiana Dr. v. Rohr &

Ramus teretes, superne crispiti fere penna cygnea, cinerascens, glabris, i-  
carnicatis, rugosi.

Folia vesper apices ramorum, parva, approximata, ternata. Foliola ex api-  
ce petioli, petiolata, tripollicaria, extorsum vesper pollicem lata  
vel ultra, aequalia, subuncata, integerrima, basi acuta, apice  
obtusissima cum acumine brevissimo, utrinque glabra, tenuissime  
venosa, supra conulescentia (saltem exsiccata) subtus cinerea  
nervi exstantibus

Petiolus communis quinque pollicaris, subtus concavus, supra pla-  
nispulus, lineas exaratus, glaber: partialis semiunguicula  
res. Stipula nulla

Peduncululi ex apice ramorum, plurimi, bipollicares, tomentosi: per-  
iales rarioribus, alterni, breves, tri vel quadriflori. Flores parvi,  
tomentosi incani-



elastica 4 foliis ternatis ellipticis integerrimis subtus canis longis petiolo

Dis Lin. Suppl. pag. 422. + 1751. + 1752. S. Vp. 865

Herica Guianensis Aubl. fl. Gu. p. 871. t. 335.

Habitata Guiana, Brasilia

~~Arbor 6. pedalis, ramifera. Rami nodosi, tetragoni oppositi ramum  
supra axillares. folia opposita ovata oblonga acuta glabra  
rigida integerrima, petiolata. Stipulae brevissimae subrotundae acutae  
breves deciduae. Flores in capitulo pedunculato ad axillas~~

foliorum

Arbor 6. pedalis. Rami longi nudi ramuli foliosi et floriferi  
folia alterna, conferta. Stipulae acutae supra glabrae, sub  
tus cinerea, integerrima, subsessile Aubl

elastica resinosa Siphocia

Calycis lobis margine reflexis. Germine omnino monospermo, sic capsula  
monosperma non vero 1 vel 2 sperma Richard

~~non~~ Descriptio inter Amer. in veritate.

Refer in Aubl. addatur