

Sison

1. ammonum L. foliis pinnatis: pennis ovatis lanceolatisque serratis
inermi, umbellis erectis
2. segetum L. foliis pinnatis, umbellis cernuis
3. candense L. foliis ternatis:
4. ammi L. foliis tripinnatis: radicalibus linearibus; caulinis setaceis; stygia
caulis longioribus
5. inundatum L. repens, umbellis bifidis
6. verticillatum L. folioli verticillatis capillaribus
7. falsum L. foliis radicalibus compositis: folioli subverticillatis papilion
caulis lanceolatis, caule aplyllo, ramis umbelliferis dichotomis

Trifolium Ligon

Habitat in Carolina herb. Ruth.

Caulis erectus, pedalis, simplex, glaber, teres, lani. Folia petiolata, remota,
ternata: foliola ovata, glabra, serrata, unguiculata vel semipollicata, sub
senis, terminale petiolatum. Umbella terminalis, 6-radiata: radii inaequaliter
pedunculati, sive, radiata. Semina oblonga, subtrinata. Involucra et involuella
ut ulla

pusillum Tison

Habitat in Carolina herb. Prut.

Planta peruviana vel parum ultra. Folia radicalia petiolata, tripartita: laciniis trifido: caulina subtripennata, semipollicaria: lacinis linearibus, angustis. Umbellae terminalis et laterales, 3-4 radiatae: umbellulae 3-5 floris: pedicelli inaequales. Involucrum et involucella minuta, triphylla. Petala aequalia. Semina oblonga, acuta, subfulcata, scabra
affine *Sauro Droniata* Walth

bulbosum Lefm

Habita in Carolina herb. Reich.

Radix bulbosa. Caulis palmari, subsimplex. Folia ternata, pennata. penna
pennatifida

habes

marginatum L'epx

Habitata Carolina herb. Rich.

Caulis herbaceus, erectus, glaber, levis. Folia remota, petiolata pennata, trijuga:
Supremum ternatum: foliola sesipila, semipollucaria, interdum bipollucaria,
cuneolata, ovata, enervia, acuta, glabra, integerrima, margine cartilagineo
albo. Umbella terminali bracteata. Involucrum nullum; pariter multiradia-
to, involuella minuta. Petala aequalia

Lyon

Asium trifoliatum Seminebus: parvis pendulis Diapenso folio Boicon. mus. append

Habitat herb. mus.

Caulis teres, virens, striatus, glaber. Folia petiolata, remota, ter nata, simplicia, ovata, tenera
lesque pollicaria, superiora minoria, profunde serrata, serraturis serrulatis, mucronatis,
senosa, intermedia subhombes, utrinque acuta. Pedunculus terminalis, elongatus, per
vales distantes, oppositi, foliolum subulatum ad basin singuli. Umbello gemina
alter parum inferior, quadriradiata: radii capillares: umbellula quadriradiata,
semina plerumque omnia abortientia proter unum, oblonga, glabra, striata.

amomum 1. foliis pennatis umbellis erectis Lin. l. v. Mant. 355. Gaertn. hort.
3. 1. 17.

Petrofelenum macedonicum Turchi Dod. pempt. 697.

Sifen quod Amomum officinarum nostrum Bauh. pin. 154.

Habitat in Anglia humilis lutofis

Caulis erectus bipedalis striatus flexuosus glaber ramosus rami
alteri ramulosi folia pennata ^{glabra} ~~trijuga~~ ^{trijuga}
folioli ovato oblongis teretibus serratis subincisa serraturis
mutis ^{ovatis}, caulinarum lanceolata profundius ^{infe} serrata
to ^{trijuga} incisa. suprema angustissima lineari umbello equis
to laterali. et ^{umbellae et} terminales 5. vel sex radiata involucrum
folioli 40 radii umbellulae inaequales
^{adulterum caulinarum} pennis ^{ovatis} lanceolatisque serratis ^{trijuga} incisi. suprema ^{ovata} lineari

Pegetum P. foliis pennatis, umbellis cernuis Lin. S. V. Gaigu. hort. 2. t. 134

Summum terrestris umbellis rorantibus Monf. hist. 3. p. 283. f. 9. t. 5. fig. 6

Habitat in Anglia agris inter fegetas J

Caulis tripedalis parum ramosus flexuosus teres glaber striatus

Folia 5-8 juxta foliola ^{mutua} parva ^{mutua} septima ovata inaequaliter
Serrata ~~suprema~~ linearia foliorum ~~suprema~~ linearia angustis
lima

in nudi radicalium ovatis serratis incisivi

ad Sepeli forte spectat

canadense L. foliis ternatis Lin. Spec. pl. pag. 363.

Myrtilis canadensis trilobata Monf. hist. 3. p. 301. f. g. v. 11. fig. 4

Habitat in America septentrionali 4

Caulis erectus bipedalicentus paucis ramosis teris glaber
Folia petiolo & petioli superiore vaginantes. folia ovata
utrinque acuta inaequaliter angula serrata intermedium
subpetiolatum lateralia altera latere angustiora umbello
laterales et terminales trif. quadrifido radice inaequalibus

Myrtilidis speciei sec. Aub.

ammis. foliis tripinnatis: radicalibus linearibus; caulinis setaceis; stipularibus
longioribus. Len. t. V. p. 363. 4 Jacq. hort. 2. t. 200
Ammi Cam. epit. 522.

Ammi parvum foliis foeniculi. Bauh. pin. 159.

Habitat in Lusitania, Apulia, Barbaria, Aegypto &

Tota glabra. Caules pedales pedunculati. Solia tenuissima umbella
rursus oppositi folio sesiplos vel pedunculati bis. trifidi. Semina
subglobosa striata glabra pariter et flori

verticillatum f. foliis verticillatis capellanibus Lin. Spec. pl. pag. 363. v. f. v.
pag.

Daucus pratensis Dalech. hist. 710.

Daucus pratensis, millefolii palustris folio Bauh pin. 150

Habitat in Gallia, Pyrenaeis &

Caulis erectus simplex siccus pedalis teres striatus. Folia pauca
remota alterna glabra. folia pennata foliola multipartita
setacea mucronata semiunguiculata oppositionibus appromi-
natis involucri et involuella hexaphylla. semina gla-
bra striata umbella unisofoli 9-10 radiis parvis totidem

inundatum L. repens umbellae bifidae fl. paei 3974 fl. Dan. Tab. 89

Suum minimum foliis imis femulaceis Monf. hist. 3. p. 223. f. 9. 7. 9. f. 5.

Suum minimum umbellatum, folio varians Pluken t. 61. fig. 3

Habitat in Europa inundati

ramosi rami oppositi folii

Caulis longi vel breviores glabri teretes. Folia caulina et
inferiora caput subbipinnata capillacea suprema et ramosa
per nata foliola sessilibus subunciformibus oppositi apice
subnerviis ~~et~~ feminaequivalantibus glabris trium parvis petioli-
bus vaginantibus. Peduncululi oppositi folii involucrium nullum
semita flores 6. 7. ⁱⁿ ~~floribus~~ ^{umbella} fructus oblongi glabri
strati

Lalium Syon foliis radicalibus compositis: foliolis subverticillato fasciculatis lanceolatis
caule aphylo, ramis umbelliferis dichotomis *Lin. Suppl. pery. 1817. t. V. p. 205.*

Habitat in saltibus limosis aridissimis circa Nolegam.

Folia tantum radicalia, caulina nulla, fasciculata, breviora, pinnata. Pinna
posita, oblonga: pars primum decompositum; reliqua vero non. Foliola pinnae
lanceolata, vixidia, margine membranaceo-alba, fasciculata. Caulis compositus
ex ramulis umbelliferis cum bracteis subulatis ad ramificationes. Ramuli
divaricati. Umbella parva, erecta. Involucra parva, subulata. Folia ve
rigena, et postquam evanuerunt exerescit caulis, et mensura angusta florescit
quasi aphyllus *Lin. l. c.*

*Crinitum foliis omnibus triper natis capellanibus; involucri daci compositi
fetacei Pallas ad. Petrop 1779 pag. 256. tab. 7.*

non vid.

crinitum Linn.

Habitat herb. Ventenat.

Caulis perithamius, crispis pennis anserinis, glaber, striatus, simplex, inferne foliosus.
Folia petiolata, 3-4 pollicaria, tripinnata: pinnae lineares, integerrime, breves.
Involucra bipinnata, longitudine umbellae: involucella pennata, longitudine
umbellulae. Umbella multiradiata. Semina oblonga, glabra, styli duobus
terminata.