

Sisymbrium

x Siliquis declinatis brevibus

1. nasturtium l. foliis pennatis foliolis subcordatis
2. thenerge. foliis lyrato-pennatis fidis. laciniis obtuse dentato-subargu-
catis in ferne angustatis, basi dilatatis
3. Indicum l. siliquis pedunculatis rectis patentibus, foliis lyratis ovatis
lobatis.
4. glandium l. foliis lyrato-pennatis foliolis oblongis profunde serratis
aeternis minoribus pinnatis serratis
6. amphitrum l. foliis ^{inferioribus} pennatis foliolis pennatis fidis serratis
5. terrestris l. foliis pennatis fidis laciniis lanceolatis acutis denta-
to serratis
7. pycnanium l. foliis inferioribus lyratis, superioribus bipennatis fidis
amplexicaulebus, stylis siliiformibus
8. sylvestris l. foliolis lanceolatis serratis glabris
9. tanacetifolium. foliis pennatis foliolis lanceolatis recurvo-pinn-
atis ^{et ceteris} pubescentibus extimis confluentibus
10. Venus folium l. ^{foliis} ^{inferioribus} ^{tripennatis} fidis ^{supremis}
integris

xx filiquis simplicibus axillaribus

11. *supinum* L. filiquis simplicibus, foliis dentato subpinnatis pinnatifidis caule
retrosum pubescentibus
12. *polycentium* L. filiquis subulatis aggregatis, foliis repando dentatis, caule
glabro
13. *bursifolium* L. racemio flexuoso, foliis lyrato pinnatifidis caule erecto
xxx filis caule subnudo
14. *musale* L. subacaulis, foliis lanceolatis dentato subpinnatis elongatis
lobis ciliatis, scapis subscabris atqueque obtusis
15. *monense* L. acaulis, foliis pinnato-dentatis, scapis lobatis.
16. *longatum* L. glabrum, foliis radi calibus pinnato-subpinnatifidis, caulibus
lanceolatis integerrimis.
17. *vimineum* L. acaulis, foliis lyratis lobatis, scapis ascendentibus,
floribus minutis.
18. *glabrum* L. foliis pinnato-fidis, radi calibus pinnatifido-lyratis,
caulibus lanceolatis serratis filiquis rostratis
19. *bracteanum* L. caule subnudo ramoso, foliis radi calibus radice
dentatis hispida.
20. *serratifolium* L. foliis radi calibus lanceolatis serratis subpinnatis
scapis decumbentibus. (collocatur proxime post musale)
21. *arenosum* L. caule subfolioso ramoso, foliis lyratis rectangulis dentatis
nervis ramosis

23. valentinum l. caule simpliciter erecto superne glabro, foliis lanicollibus bipinnatis antrosum² dentatis
 xxx + foliis pennatis⁴ caulibus foliosis²
24. emicissimum l. caule demum folioso caulescens, foliis multinatis-pinnatis bipinnatis glabris, caule et rosum hispido
25. Parva l. demum caulescens, foliis multinatis muticatis, floribus nubilibus natis
26. asperum l. siliquis scabris, foliis pennatis bipinnatis: pinnis linearibus lobatis subdentatis, corollis calyce longioribus
27. dentatum l. foliis radicalibus cum caulis dentatis: caulibus pennatis bipinnatis
28. mellefolium l. foliis supradecompositis tomentosis, petalis calyce majoribus, caule fruticoso
29. Sophia l. foliis decompositis glabris, petalis calyce minoribus caule herbaceo.
30. pannonicum l. foliis caulibus superioribus pennatis glabris: pinnis linearibus in 2-3 gemmis extrema elongata (quasi ~~do ad altissimum~~ affinis mihi videtur maxima)
31. altissimum l. foliis multinatis glaberrimis: foliis sublinearibus ut gemmis ~~pedunculis~~ terminalibus superioribus elongatis, pedunculis latis

32. Ino s. foliis uncinatis dentatis caule terminali lanceolata lanicula
 Inaequali sa dentata cauleque glabro
33. stipulae cum s. glabrum, foliis bipulatis pennatisque pinnatis
 serratis; ex tenoribus brevioribus; siliquis arcuatis
34. columnae s. foliis uncinatis dentatis cauleque villosi subincanis,
 siliquis erectis
35. Loeplii s. foliis uncinatis acutis hirtis, caule retrosum hispido
36. orientale s. foliis uncinatis tomentosis, caule lori
37. barbarea s. foliis simplicibus pectunculato-dentatis amplexicaulis
 lobis nudis.
38. catholicum s. siliquis siliiformibus loricatis, foliis pennatis dentatis
 demphyllum ciliatis caulibus
39. glaciace s. siliquis siliiformibus loricatis, foliis pinnatis: foliis
 lobis reniformibus ciliatis: impari crenato.
 x x x x x foliis indurpis
40. sagittatum s. pubescens, siliquis subcylindricis recurvis,
 foliis obovato-oblongis sagittatis dentatis
41. hispanicum s. foliis radice alibus cineratis inaequaliter
 dentatis, caulibus lanceolatis serratis subdentatis
42. struthium s. foliis lanceolatis serratis utraque villosis

terrestre l. foliis hastatis viridis, foliis pennatifidis inaequaliter dentatis, radice
simplici, petalis calycibus brevibus Smith. fl. angl. 2. pag. 701.

Seym

muscle l. subaequali, foliis lanceolatis pinnato-serratis coruscantibus,
Pappi subglobosi ascendentibus. Lin. l. C. p. 595 & Spec. pl.
n. 9184

Eruea rumex ibendi folio, flore luteo Barr. u. 131.

Habitat in Gallia, Italia & Anglia 4 ^{infer folio}

Caules plures erecti basi ramo uno vel altero, scabripuli
saepe pili rarissimi adpressi. Folia radicalia plurima
utrinque attenuata glabra subtus pili rarissimi.
si pinnata dente utrinque uno vel altero remotissimo
in medio subpinnatifida. paucia in caule. Calyces
semipatenti, rari pili apice foveolati. Corolla lutea
obtusissima, magna diametro foliorum. Siliqua crassi
usculo, compressa, valvulis obsolete connatis
figura Barcleni minus quadrat. Speciei Brasilia
est uti monent secundum Hudsonium.

dent subdentato pinnato

Serratifolium L. foliis radicalibus lanceolatis serratis subsinuatisque, stipulis decumbentibus

Erica parva ibidem folio Boerh. mus. tab. 102

Habitat in insulis inque barbaria

Caulis basi umosus vel interdum nulli. Folia radicalia vel caulina basi attenuata glabra extrosum serrata pollicaria angusta interdum ~~etiam~~ ^{etiam} majora latiora obtuse dentata subsinuata. Saepe ~~etiam~~ ^{interdum} vel pedunculata sicuti formae decumbentesque labii basi veli reversi varionibus calycis pediculi ~~etiam~~ ^{etiam} subtriti. Flores magni sulphurei siliqua latiore quam in murali rostroque linear siliqua multo angustior terminata unguiculata

Convenit et cum Barcl. 131. fide quo mutale huius

cujus varietatem erit proferentem cum per bene cum in descriptione murali. conquit si vero Hudsonii ~~est~~ ^{est} *Brasilia muralis* L.: s. murale est nostrum minime erit folia enim omnino diversa forte quod planta haec diversa ab uti haud raro ob synonyma confunduntur si diversa huius: murale nomen adum erit alter Hudsonii

monense l. caule, foliis pennato-dentatis subpetioli sicapii Combr.
Linn. Spec. pl. p. 9104

Enicla perennis et saxatilis, radice crassa e rupe victoriâ Tournef.
Schol. Bot.

Enicla monensis laciniata, flore luteo majora Dill. elth. 135. V. III. fig

¹³⁵
Habitat in Insula Mona Anglia, rupe victoriâ gallopro. &
Similemum procedenti magnitudine planta, foliorum, flo-
rum, fructuum. Folia pennatofida lineana raris pili-
adpressa: pennis remotis obtusiusculis, sicuti ppteris
sicapii excita, tener. Calyces clausi. Petala lutea integra

Folia prima cuneata integerrima uterque utrinque dente
parvo uno vel altero utrinque

rusticum montanum buxo pastori folio loculis angusti-
simis Boer. mus. 83

gen. Syn.

glabrum
Corydalis L. Foliis radicalibus pinnatis subpinnatifidis caulinis lanceolatis
integerrimis

Habitat.

Caulis plures ^{adscendentes} pithamos, vix ramosi, uti tota planta, glabri
folia radicalia petiolata dentibus utraque tribus magnis
pinnatis, obtusa polliciana, dente uno vel altero superius
in petiolo: caulina sessilia lineari lanceolata acuta
sesqui polliciana. Flores albi. Stylus unguiculae tenuis

Culta an Radice petrosa cum qua uldenu confuenda vel cum
nonnullis aliis et affinis

vimineum L. acule, foliis lyratis lobatis, scapis adscendentibus, flori-
bus minutis Lin. Spec: pl. pag. 9194

Encia minor flore, mospeliensis Bauh. hist. 2. p. 862.

Encia pumila sicula, bursa pastoris folio Boiss. pi. 19. t. 10.

Encia vinealis, parvis luteis floribus Monf. bot. 263.

Habitat in Sicilia, Montpellier.

Racis procedentium Planta palmari. Folio tantum inferne
in caule glabra arenaria in pedicula in petiolum attenuata
pennatifida lyrata laciniis utraque tres vel quatuor triangulari-
bus. vel sublaniculatis dentibus uno alterove terminali oblongo
obtusissima subtridentata. Scapi plures sonati pulsi varisimis
adpressi ^{in pinnis} ^{ve rami} uno albore
cedentium. Siliqua sequipollicari facie pro-

Descriptio
uti et differentia
ad monachum
mandatum
forte et Syn.

13

subcaule lyrato pennatifido glabri laciniis terminali
obovata subtridentata

vide

flores in mea magnitudine ut in monacho dentatis. Lin. vero
ut in S. Sophia habet an igitur mea petalis monacho ad exacte cum
sequitur Boiss. convenit

Tactis duorum procedentium. Folia licet par digiti longitudine
lyrata omnino Barbara, obtusa cava. Scapi filiformes
erecti spuli. flores lutei. Sepalo floribus non majoribus. Petala
erecta obtusa, ut calycis duplo longiora. An
Folia nulla in scapo scapi digitali palmari. Aliquo unguis
culari

Scabrum ^{punctato scabro}
1. foliis radicalibus pennatifido-lyratis, caulis lanceolatis
serratis siliquis rostratis
Habitat Tuncti.

Caules plures ascendentes simpliciter palmatis vel spitha-
mici retrosum hirti subfoliosi. Folia plurima radi-
calia vel inferne in caulis petiolatis dentibus
lacini utrinque duobus, subdentatis terminalibus oblonga
dentata, polliciana venosa, supra punctis elevatis
copiosis cui insident pili solitarii minuti adpressi subtus
puncta per nulla caulina sessilibus unguiculata
traximus terminalis. Flores pallide flavi per
symbria muralis modo minores. Siliqua calyce villo-
si. Siliqua unguiculata tetragona compressa
apice stylo unguite obtuso siliqua triplo brevior
terminata

Banuelieri P. caule subnudo ramoso, foliis radicalibus uncinatis den-
tatis hispido Lin. Spec. pl. p. 914*

Enicla sylvestris minor, bursa pastoris folio Bauh. prodr. 39. p. 90.

Enicla Banuel. 4c. 1016.

Habitat in Hispania, Italia &

Folia radicalia plurima uncinata ^{enica} pennatifida, polliciano
et ultra interdum quadripolliciano seti pillicidi profertim in
costa et vena subtus hispida lacinis dentata, terminalis major
seca irregulari dentate subnervis. Scapus folia nulla in scapo
nisi unicam parum supra basin et sub ramis subulatan
indiget nimirum scapus pedalis erectus, superne in ramordi
visus basi pilosus superne fere glaber. Calycis glabri pur-
purascens. Siliqua sesquipollicaris glabra ad femina tona
lepis.

Prospitum ^{folio} dissectum humistrato gust. v. ind. hupf.

Folia radicalia copiosa, fere s. pithamosa, uncinata, si ab-
lacinis lanceolata, alternis, inaequaliter dentata, subtus setis
albidis hispida. Scapus erectus, pedalis et ultra glaber, striatus
pedunculati pariales remotissimi hupf.

arenosum s. caule subfolioso ramofo, foliis lyratis rectangulo-dentatis hispida:
pulis ramofis. Lin. Spec. pl. p. 9194

Enicæ coerulea in arenofis proveniens Bauh. prod. 40. pin. 99. Bar
4c. 196.

Enicæ sylvestris major minorque, foliis suboprens in orbem parvis

herb. Gust. Loef. prus. 68. 4. 13.

Summiti alp. Habitat in Germania, Helvetia &

folus ^{pin.} hispida. Caules plures pithamidi simpliciter super
ne tantum ramis uno alterove brevifloris. Solaa

Tournef. f. c. r. h. radicea plurima lanciolata basi in petiolum attenua

Cardamine hespi da dentibus 3. 4 remoti fenuato sublyrata. caulina
sa fr. grayoni Col. paucis lanciolata polliciana remote ^{cau.} pili dentata

Esph. 2. pag. 2

flos summae angusta subintegerrima. Pili in caule
simpliciter in foliis ⁶ fenuati s. trifidi pedunculati & hae
mi terminales et ex ultimis ramis axillis pedunculi

et pedicelli minuti hirti pili fenuati in calycibus.
rariotibus in siliquis ut siliqua unguiculari.

Corollula subviolacea

valentinum l. caule simpliciter erecto superne glabro, foliis lanceolatis
hispidis antrosum dentatis Lin. Spec. pl. p. 920. *

Encia hirsuta, floribus albis Boic. mus. 2. p. 84. Y. PO. Barr.

fr. 195. fig. 1.

Habitat in Regno Valentino, madonti O

caulis erectus vix pedalis, tenuior vix ramosus, inferne raris
pilis adpressis, superne lavis. folia radicalia angustis lan-
ceolata, dentibus quatuor validis antrosum et flantibus
hispida, pilis albis simplicibus longioribus et brevioribus. cau-
lina ramosa lanceolata-lineariter non dentata. Pedunculi
filiformes flore longioribus.

Folia radicalia uti caulina hispida, pinnatifida vel sublynt,
interdum bipinnatifida, digitalia: laciniis subdentata; caulina pau-
ca, vix adpressis, pinnatifida laciniis linearibus angustis, sub-
terrenis. Caules plures, hispidi, pedales, erecti, teretes, subramosi
superne glabri. Siliqua glabra. herb. 7us.

Spec. 7us. quadrat. cum figura Barrel, haud vero cum descriptione
ne lvi. aliud specimen odorat foliis latioribus minus hispitis
conspicuis laciniis oppositis, 3-4 vel pluribus,

Simplex frum s. caule simplicissimo, foliis radicalibus ovatis ciliato-hispidis
petiolatis integerrimis Gmel. et. 3. p. 303. tab 36. fig. 3
Habitat

1819

na vdi

molle

S. foliis mollebus denticulatis, caulibus hastatis oblongis, siliquis
pubescentibus ~~quibusdam~~ var. ~~pub.~~ OS.
Habitat

non vidi

enclastrum L. subcaule demum caulescens, foliis uninatis - pinnatis
tipsis glabris, caule retrosum subhirsuto
nassutium montanum bursa pastoris folio, Log. ulis angustis
f. m. Boerh. mus. tab. 83.

Symbium enclastrum sub-caule, foliis lyrato-uninatis
lobatis, caule hirsuto Gouan. illustr. pag. 42. tab. 20

Habita in Europa australi Barbaria & C

Primum a caule demum caulescens foliosus. Caulis
subramosus pedalis adpressus pilis raris et seris
Folia petiolata venosa laciniis lanceolata dentata
pinnata saepe serrata lanceolata. Pedicelli remoti
declinati. Siliqua pollicariis rostro brevi obtuso
scopi primum decumbentes nudi dein adpressentes
calycis - foveolati apice pilosi

mixtum in herb. Turf. cum semine uti una eademque species

Parra L. caulescens, foliis mucronatis mucronatis Lin Mant. 255. + L.V.

P. 595 +

Habitat in Parra O &

multa similia habetium Bandieri et eandem primo anno ^{dem ad huc}
~~et ac caulis absque foliis sunt eandem facile crederi~~

Folia radicalia in orbem expansa subtruncata, sex busse partem
Caudinis lanceolatis vix unguiculatis postice dentata unico vel
altero sup. extrema utroque, supra, profertim margine mucro-
sa remota s. tuberculis parvis, mucronatis, mucrone apice hyali
no in adultioribus evanescentibus. subtus etiam scabra
pilis acino acaulis est utroque et tamen florida. Scapi erecti
lovis frugis remotis parvis paniculati pedales. Pedicelli
remoti, patentes, fructi, flore longiores uno altero die ante
sui recurvati dein erecti. Calyx lavis pallidus. Petala flava
Reliqua teres lavis ad semina torulosa.

folia cuneis subulata sub-ranicationibus integerrimis

sub

floribus nubilibus nutan

Asperum f. Siliquis siliabis, foliis pennatifidis: pinnis lineari-lanceola-
tis subdentatis, corollis calyce longioribus. An. h. V.

Sinapi parvum siliqua asperum Bauh. prodr. 41. p. 99.

Sinapi monspesulanum, siliqua aspera hirsuta Bauh. hist. 2. p.
850.

Habitat Mospelii in paludibus. O

Caulis plures erecti ramis aequis simplicibus axillaribus
brevibus glabris basi interdum tuberculati minuti raris pimo-
sibus. Folia angustissima in culta parum latiora
et longiora inferiora saepe pollicana superiora breviora
Cacinae plures alternae angustissimae ^{interdum} in culta saepe lacini-
inferne versus acute. ^{saepi utrinque} ^{dente uno vel alio} ^{terminali} ^{et ex apice}
numerosi siliquis subulata acuta tuberculi minuti siliabis
siliulis flori flori

Ger. Syn

subdentatisque

linearibus interdum

Dentatum L. foliis radicalibus cuneatis dentatis caulinis pennatis
Silybnum foliis radicalibus ovatis dentatis, caulinis pinna-
tis, pinnis linearibus, extrema maxima Hall. bot. fl. n. 481.
Encicofuticosa serpyggante alpina Canon. fl. 80. t. 34.
Silybnum dentatum All. fl. ped. n. 1007. tab. 57. fig. 3.
Habitat in pratis alpini montis s. Bernardi. A
Caulis plures digitales vel pauci ultra ad centem vellosi
simplicissimus erectus. Folia radicalia petiolata
unguiculata dentibus utraque tubis obtusis. Cau-
lina obtusa pinnis ^{polliciana} pinnis linearibus
integerrimis terminali major trifida vel tridentata
glabra crassiuscula. Racemus bipollicaris filique
vix pollicares tetragono subcompresso
Tanta est convenientia cum Cardamine repensfolia
ut facile eandem dicere nisi forte serpyggandum
filique tantum obstant

album P. foliis pinnatifidis incanis: lacini oblongo lineari-
obtusis subtentis Cal. filiquis lineariteribus Pall. et. 3. p. 239

Tab. II. fig. 1.

Habitat in Sibiri
prole deestato

non vidi

Rupulgaicum glabrum ^{sepulcra}
arvum. Folia pennatifida pennis integerrimis exterioribus breviori-
bus; filiquis intersus annatis.

Habitat

ex horto Parisiensi

Caulis flexuosus glaber uti tota planta; & nudimento
ramorum et axilli. Folia petiolata pennatifida laciniis
oppositis, et vel 5 utrinque extremis ⁴ ⁵ confluentibus
lanceolatis basi angustioribus obtusiusculis unguiculati-
bus integerrimis ^{paucis} ~~duobus~~ extremum parum breviores.
Racemi terminales uterque gemini. Flores minuti
siliques filiformes pollicares enervi. glabri
sepala utrinque dimidia to arata in acumine longis
attenuata

an hujus generis flores non examinari

polyeratum L. siliquis axillaribus sessilibus subulatis aggregatis, foliis
repando dentatis Lin. l. v. Faëque hort. t. 79.

Frös altera Dalech. hort. 653.

Crysinum polyeratum f. corniculatum Bauh. pin. 101.

Habitat in Helvetiis, Italia nideratis O

Caules ^{interdum} plures simplicissimi vel inferne ramo uno vel altero
sossu glabra folia petiolata. Radicales palmaria subpinnu
sifida laciniis dentatis, caulenis dentato sinuatis pollicaria
Cappi siliqua unguicularis f. 2. 3 in singula axilla

bursa folium l. raiemo flexuoso, foliis lyratis, caule erecto folioso

Lin. am. 4. p. 3234

Draba palustris plicata major alpina, bursa pastoris folio

Cup. p. 3.

Habitat in Italia montibus subhumidis O

Tota glabra spithamea erecta superne ramo uno vel altero
Eulcia petiolata laciniis linearis obtusiuscula basi reflexis
interioribus saepe denticatis, terminalis oblonga denticata
suprema in laciniis paucioribus diversa. Siliqua breviter
fere pedicellata bipollicari fructu. Petala alba

foliis lyrato pinnatifidis caule erecto

alba

Duc. Elect. 1779-7-14-1779 1777.

Herbar.

Nasturtium l. foliis pinnatis: foliolis subcordatis L. V. p.
p. 690.

Sisymbria cernua Euth. h. 723.

Nasturtium aquaticum superum Bauh. pin. 104.

Habitat in Europa & America septentrionali ad fontes & inque omni
te.

Caulis sive squaridatus inferne radicans caespitibus sive digitis
minimi ^{perenne hamatum} proplect glaber peltatus folia 2-4 supra crapan
pinnata folioli peltatis alternis oblongis vel subcorda
tis uti tota planta glabra obscure sive parva
seorsim albi

chinense *S. foliis pennatifido lyratis laciniis obtuse dentato subangulatis*
et inferne angustatis basi dilatatis

Habitat in China ex herbo panpani

Similis *S. amphibia*. Caulis decumbens striatus glaber. Folia
palmata basi dilatata amplexicaulia laciniis oppositis vel
alternis pollicares extrorsum latiores ad costam dilatata
et trique dentibus inaequalibus. Flores parvi siliqua *S. anaphi-*
bia

Indicum L. siliquis pedunculatis rectis patentibus, foliis lyratis ovatis
lobatis. Sin. Spec. pl. pag. 917. *

Habitat in India orientali ☉

Species L. amphibia aut Sin. arvensis. Caulis ramosus patulus
lori. Folia ovata lyrata obsolete dentata, petiolata
Racemi axillares nudi. Siliqua lora, pedicellis sili
formibus, flore minuti

Glandium L. ~~foliis~~ lyrato-pinnatifidis; foliolis ovalibus dentatis
fl. Dan tab. 409. Mur. in Com. Gotl. 1772. p. 81.

Habitat in Glandia

Tacet Symbrii amphibi; an ejus modo varietas tota gla-
bra palmari diffusa. Folia pinnata ^{minuta} ~~caerulea altera~~ alter
nis minoribus alternis majoribus oblongis profunde serratis

aliqua oblonga

Folia pinnatis foliolis oblongis profunde serratis alternis
minoribus

Terrestre l. radice annua, foliis pennatifidis dentato serratis ^{laciniis} plicatis
qui foecundis Curt. fl. Lond.
Symbnum aquaticum, foliis variis Saull. bot. p. 105.

Habitat in Europa & aquosis
Caulis erectus glaber pedalis et ultra longus. Rami axillares
apice in pedunculor floriferos alternos duas semel alter
natim divisi folia pennatifida laciniis serratis termi
natis oblonga basi petiolus e folio decurrente alatus
basi dilatatus auriculis laciniatis. Racemi breves
ad apicem ramorum alterni plures. Siliquis oblongis
mucronatis.

Præterea aquaticis foliis in profundis lacunis
durius Bauh. prod. p. 30 hæc pertinet.

amphibium. S. filiquis oblongo ovatis, folioli pennatifidis serratis
lex. b. v.

palustre Raphanus aquaticus, foliis in profundas laciniarum divisi
Bauh. prodr. 30. t. 30. p. 97.

aquaticum β .

Raphanus aquaticus alter Bauh. prodr. 30. t. 30.

Raphanus aquaticus rapum foliis Bauh. p. 97.

~~tenes v. v.~~

~~Symphitum aquaticum, foliis variis Vaill. bot. P. 108.~~

~~Habitat in Europa septentrionali aquis.~~

β . Cauli erectus serratis sepe mucosus squigedalis.

Folia inferiora spatulata lamina oblonga obtusa
inqualiter serrata per petiolum decurrent lato

Rami ad lateri margine petiolum ad folium in lobos duos. Interdum
dilatatus superiora festuca lanicollata attenuata

pyrenaeicum L. filiquis subovatis, foliis inferioribus lyratis, superioribus
bipinnatifidis amplexicaulis stylobus feli formibus Lin.

L. V.
Raphanus minimus repens luteus, foliis tenuiter divisis Monj
his t. 2. p. 236. f. 3. t. 7. fig. 1.

Alysum foliis pinnatis multiforribus, floribus racemosis
luteis All. ped. 40. t. 7.

Habitat in Pyrenaeis, Helvetiis alpebus &

Caulis ^{pinnatis, sive foliis} erectus palmatis vel semipedalis parum flexuosus
glaber superne ramis uno vel altero. Stipulae raris
petiolatae lyratae lacina terminali oblonga dentato
subrotunda subrepanda. Caulis ^{caulis} sessilis pinnatis
canaliculatis inciso subpinnatifidis
auriculae duo ad basin in foliis caulibus ^{caulis} amplexicaulis
variat foliis glabris et pilosis

lyn. ex Act. helv.

Sylvestris. Siliquis oblongo-oratis, folioli lanceolatis serratis Lin. 1. 2

p. fl. Dan. 1. 409?

Enicæ sylvestris Duch. hist. 263.

Enicæ palustris nasturtii folio, siliqua oblonga Bauh pin 9 P.

Enicæ sylvestris minor, luteo parvoque flore Bauh. pin 9 P.

Enicæ quibusdam *sylvestris* repens, flosculo luteo Bauh. hist. 2.

p. 666.

Habitat in Germaniâ, Helvetiâ, Galliâ moderatè &

caulis luteus vix pubescens ^{foliis} pectus ramis pinnis oppositis
foliis linearibus lanceolatis incisè serratis femurquiculatis ut
vixi panem murem. Floris parvi flavi

glabris

~~La symb. ind. spec. pl. adda ut nota sui rursus~~

Tanacetifolium L. foliis pennatis: folioli lanceolatis inciso serratis
extimis confluentibus. Lin. I. V. p.

Enciclopedia Tanacetifolium Monf. hist. 2. p. 231. p. 2. t. 6. f. 19.

Habitat in Sabaudia

Caulis pedalis et ultra, erectus ramis fructibus pubescentibus
interdum glaber. ^{triv. e. quad. pollicina} foliola ~~obovata~~ lanceolata extima
decurrentia lanceolata profunde serrata subtus saepe cune
frentia utriusque sensim minor extrema interdum pollicina
na rariem ex axillis ultimis saepe compositis. pliquo parva

pubescentibus

tenuifolium s. *foliis integerrimis*: *inferioribus pinnatifidis*; *superioribus*
integris
Sinapis foliis lobatis glaucis, *pinnis lineantibus raris et dentatis*
Hall. in act. helv. 6. p. 84. n. 17.

Sinapi obovato-folii *Bauh. pin. 99.*

Enicæ tenuifolia perennis *Bauh. hist. 2. p. 861.*

Habitat in Italia, Gallia, Helvetia &

michi ignota

Cunila glabra. foliis linearibus ad v. s.
Habitat in Honaria ^{Thaur}
Caulis ramosus ^{mit ramis} terribus. Folia angustissima crassiuscula
integerrima. Racemi laterales oppositi foliis. Flores parvi
flavi. Segetes s.ymb. amphibii.

Lepidense S. foliis inferioribus pennatis: summis inferioribusque
pinnis integerrimis Wulfer in Coll. Taiqu. 2. p. 161. Ic. rar
Cent. 2. t. 62.

non ordi

Luzitatum L. pubescens, siliquis subcylindricis recurvis, foliis obovato-oblongis sagittatis dentatis Hort. kew. 2. p. 396.
Habitat in Sibiria 2

non vidi

Legumen 1. Stipis axillaribus subsessilibus solitariis, foliis dentate
pinnatis Lin. l. V. Journ. illust. pag. 43. *

Erucis lupulina alba, siliqua singulari a foliorum alis enim
pente Agr. ait. 1724. p. 295. t. 10.

Habitat pannis ad agrorum margines, in que Hispania
Caulis erectus palmari pilis reversis subhispidis ramorum
ramis simplicibus diffusis caule longioribus. Dolia peltis
lata pinnata subtus pilis raris adpressis, supra gla
brosa pollicaria laciniis obtusis pilis ^{paucis} dente uno vel altero.
Siliqua axillares solitarii breviter pedunculato glabro ungui
culari

pinnatifida