

Sisyrinchium

Spicatum Siphnachi caule compresso, spathis alternis multifloris flombis  
spicati Cavan. ic. pag. 2. tab. 104.

Habitat in Mexico inferne alata e foliis decurrentibus  
Caulis articulatus bipedalis. Folia ensiformia enervi ante  
plicata inferna. Spica semipedalis interrupta. flori  
plures a singula spatha pedicellati. membrana lanceolata in  
ter pedicellos. Cor. lutea. petala petalis ovato oblongis emar  
gnatis subtus rubro lineatis. Caps. 3 gona apice circumscissa  
Semina globosa et aperita Cav



*Sisyrinchium ensiformibus* Scapo altilibus, panicula  
ixioides ~~Morosa~~, foliis distichis nervosis, florum umbello pedun-  
culatis Thunb. Goss. Mor. n. 7.

Habitat in nova Zelandia.

Folia radicalia, plurima, longitudo fere scapi, <sup>erecta,</sup> linearia,  
angusta, apice attenuata, <sup>multinervis</sup> glabra, unicum in scapo. Scapus

# *Spithameum*: apice ramosus, erectus, bipedalis et ultra, striatus, glaber.  
floralia pedun <sup>Pedunculi</sup> ~~longa~~ in ramulis terminaliter, <sup>triflori</sup> umbellati, minuti, tri- qua-  
culis breviora. <sup>dispositi</sup> ~~tu~~, <sup>duo</sup> ~~alli~~. Spatha lanceolata, pedunculis brevioribus <sup>cellis</sup>

# *Loesneri*, Pedunculi capillares, pollicares. Thunb. l. c.

albi

*Sisyrinchium ixioides*; foliis ensiformibus conduplicatis longissimis,  
panicula trichotoma, petalis exterioribus dimidio minoribus Goss.  
prodr. n.

*Morosa ixioides*. foliis distichis nervosis, florum umbellis pedun-  
culatis Thunb. Goss. Mor. n. 7

flavidum Enicodon

Habitat in America boreali herb Richard.

habes



collena M. scapo tereti, folio dependente, laciniis corollae subaequalibus  
Thunb. M. n. 13.

Habitat in Cap. b. per

Scapus ramosus erectus, multiflorus, glaber, pedalis. Rami alterni compressi  
si, spathe involuti glabri, uniflori, bipollicari: ex eodem centro cir-  
ca 3. inaequales. Folium unicum ensiforme, scapo duplo longius  
inferne vaginans, integerrimum striatum, glabrum, conicariisculum  
dependens. Flores terminalis, in ramis solitariis. Spatha bulbosa  
pedunculata vaginans lanceolata, longe acuminata, conicariis striata  
glabra, vixi, pollicari: vulvula subaequalis. Corolla laciniis oblon-  
gis, obtuse subaequalis, patentes, carnea vel flava, ciliis linea  
nigra inferne ~~et~~ flores incarnato vel viridi flavescens. Stigma  
latius trigono subtrilobata, cucullato bi loba Thunb.

Species desynonymi

ad Moros Thunb. ~~si~~ ~~synonymum~~ et ~~Cervaniam~~ ~~refert~~ ~~ad~~ ~~junior~~?

ferrasiola M. caps. verti flexuoso floribus terminalibus subgeminis, foliis caulicis  
aetitudine capsae

Morosa ferrasiola Gaud. coll. 4. p. 141.

Habitat ad Cap. b. sp. 4

Tota glabra. Radicem radicealem nullam cupis loco vagina alba  
purpureo strata. Caulis plura albena patula axilla strata  
concurrentia, superne angustiora linearia plerumque albidina  
caulis inferiora linearia angustiora. Caulis pedalis sesqui-  
plex flexuosus debilis. Flores plerumque duo terminaliter  
recti axillares. Bractea membranacea hyalina longitudine germi-  
ni caetera folio terminali inflata. Petala flava <sup>longe</sup> <sup>super</sup> <sup>longe</sup> <sup>super</sup>  
visque ~~at~~ rostrata angustiora immaculata. Foliis

non vidi Species Synnottii



*Nanospider Sifynachium*

Habitat

herb. Quil.

Folia linearia, supremo caule longior. Vaginae marginatae, uti marginae perichaetia  
membranaceae. Limbi latius oblongi, attenuati

micranthum Sesynanthum

Habitat herb. Græc.

Folia ensiformia, equitantia, angusta, vix <sup>bi</sup> pollicaria. Caudis foliis parum  
altior.



*Sipyrachum?*

Habitat in arenosis monte sideo Connes. herb. fus.  
Caules plures, herbacei, erecti, dichotome ramosi, compressi, flexuosi. Cola laevio-  
costa, attenuata, distantia, striata, glabra, unguiculata. Spatha termina-  
tis, diphylla, structura foliorum. Flores solitarius, parvis, lateris.

*Sisyrinchium*

Habitat ad fretum magellanicum Com meson Herb. Mus.

Spatha 1-2-3-flora

habes



*Syntherisma*

Habitat ad fretum magellanicum <sup>in montibus</sup> Commerson herb. Mus.  
flores ochroleucis, u reflexis

habeo

*Sisyrinchium chalybeum* Thunbergii dictum Ranz. Cat. orient. Germ. fl. Ori-  
ent. pag. 115.

Thunbergii incolis, foliis septem vel octo flexuosis in caule rotundo

Ranz. heder. p. 1. c. 9. pag. 114. 115

Habitat Halepi herb. Ranz. Wolfen

Radix bulbosa. Caulis vix pedalis, erectus, flexuosus, simplex, vertus-  
saginis foliorum. Folia lanceolata, sive pollicana, patentia, alternata  
et nata. Flores terminalis, solitarius  
an 4ni, sic mihi videtur ex habitu



*Catifolia* C. foliis ellipticis acuminatis subtus incanis

*Carepa Catifolia* foliis ovatis acuminatis subtus cinereis  
aubl. fl. Gu. Ind. pag. 561. Tab. 224. fig. 3.

Habitata in Guana }

Folia petiolata alterna, palmata et altera integerrima supra  
glabra subtus tomentis tenuissimis incanis nervis <sup>alternis</sup> costata

bermudianum Lefyr. foliis ensiformibus enervis Lin. l. V. p. 820

~~Synanthemon conuleum parvum, gladiato caule, virginianum  
Pluk. alm. 340. t. 61. fig. 1.~~

~~Bermudiana graminea, flore minore conuleo Dill. Elth.  
49. t. 41. fig. 49.~~

B. ~~Synanthemon bermudense, floribus parvis ex conulo et aureo  
mixtis Pluk. alm. 340. tab. 61. fig. 2.~~

~~Bermudiana iridis folio, radice fibosa Dill. elth 48. t. 41. fig.~~

<sup>48</sup>  
Hab. data in virginia B. in Bermudis 2

a folia ensiformia angusta. Scapus erectus pedalis alatus  
superne folio linearis canaliculato pedunculorum longitudini  
respile carinatum subperthaceum. Pedunculi gemini stri-  
tura fere apice foliolis geminis lanceolatis margine  
membranaceis pollicibus florem unicum involventes  
B. differt scapo tereti

Lat caule angusti canoso foliis spathis subaequalibus flore  
bermudibus L. Mart. Enc. Carr. dij. pag 346. tab 192. fig. 1



Micranthum. S. caule ac peti. comoso folioso, floribus minimis. Parva. 24.

Gray 345. Feb 191. fig. 2

Habitat in Pen

non vid.

aniceps S. caule simplici anicipiti subaphyllo, prothio flore longioribus Cavan  
Desf. pag. 345

*Synanthium coeruleum* parvum, glabrate caule, virginianum  
Pluch. Aln. 340. V. 61. fig. 1.

Bermudiana graminea, flore minus coeruleo Dill. Elth. 49  
+ 41. fig. 49

Habitat in Virginia 2

non vidi



grandiflorum L. caule tereti simplicij; foliis oppositis Caran. desj. p. 346. tab.  
192. fig. 2.  
Habitat in Peru

non vidi

nanuspedes L. caule tereti, foliorum vaginis in flatu, corollis reflexibilibus  
formibus mutantibus Casan. d. s. p. 347. Tab. 191. fig. 3.  
Habitat ad fretum neapolitanum

non vid.



collinum S. pa

caulescens  
Compressum

Sf. foliis <sup>laevibus</sup> ~~capo~~ compressis sulcatis alatis floribus lateralibus

resplendentibus

Habitat in Cap. b. spei

Folia equitantia ensiformia pithamoanerviata. Caulis  
erectus foliis bipedalis simplicissimus glaber folia caulina  
ensiformia amplexicaulia carinata complexata dodranta  
lea semper minor. floralia membranacea latiora lanice  
lata attenuata remota.

an huius generis flores non vidi. Mossa forte est