

Skimmia

Japonica L.

Triphylla thymifolia folus ternati
Triphylla septa Lour. fl. Cochinch. pag. 22.

Habitat in Cochinchina sylvis
Arbor 10 pedalis ramifera folia ternata lanceolata integerrima
undulata, glabra. flori albis minimis. Petala plicata germina
superiora stylis puberulis. Stigma obtusum micis axillares

non vidi

japonica *Stemodia* Thunb. Desf. n. Gen. p. 58. flor. Jap. pag 62 *
Sin Pan, vulgo *Mijama* *Stemmi* Komf. Am. Et. Jap. v. p. 779.
Habitat in Japonia

Caulis fruticosus, erectus, glaber. Rami alterni, subtetragoni. Folia in summitatibus
ramorum subalternis, petiolata, frequentia, oblonga, undulata integra, apicem versus
obsolete crenata, erecta, margine reflexo, digitalia; supra viridia rugosa; subtus
pallida punctata; sempervirentia sapore aromatico. Petioli semiteretes, coarctati
unguiculari. Flores terminaliter paniculati. Peduncululi teretes, rarisssimi, ungui-
culari. Thunb. l. c.

Rami saepe verticillato terni. Folia ad apicem ramorum, saepe quina herb. Royai.