

Solanum

paniculatum L. foliis sinuato-angulatis, supra glabris; <sup>calycibusque</sup> <sup>inermibus</sup> floribus paniculatis  
hirsutum L. fruticosum, foliis cordatis angulatis tomentosis aculeatis; pedunculatis  
latis lateralibus aggregatis calycibusque hirsutis simis

Præmorsum L. fruticosum, foliis cordatis angulatis lobatis integris subtus  
inermibus, subtus tomentosis sculis

marginatum L. fruticosum foliis cordatis sinuato-repandis margine albis  
cooperse L. fruticosum, foliis sinuato-pinnatifidis aculeatis nudis: lacinis  
natis alternis integris obtusis

fuscum L. fruticosum, foliis ovatis obtusis lobatis aculeis utrinque rectis:  
superioribus coloratis

peruvianum L. fruticosum aculeis caulinis aciculatis; foliis oblongis basi atten-  
nuatis utrinque acutis calycibusque aculeatis, <sup>racemosis</sup> floribus <sup>racemosis</sup>

scandens L. fruticosum scandens, foliis angulatis, petioli, rachis, calycibusque  
aculeatis, racemis latis

Torsum L. fruticosum, aculeis curvis, foliis cordatis ovatis sinuatis tomentosis,  
rachibus aculeatis, calycibus inermibus

indicum L. fruticosum, aculeis incurvis, foliis oblongis sinuatis subtus enerviis  
calycibusque aculeatis, racemis paucifloris

Carolinense L. caule annuo, foliis hastato-angulatis sinuatis. aculeis utraque  
rectis, racemis latis

angustatum L. fruticosum, caule folisque aculeatis spinis: aculeis rectis acicula  
ribus, foliis lanceolatis dentato-sinuatis subpinnatifidis  
bipinnatum L. caule annuo, foliis pennatis pennis pennatis fide utraque aculea  
sodomeum <sup>ti</sup> L. fruticosum, foliis pennatifido-sinuatis sparsim aculeatis nudis, ca  
lyxibus aculeatis  
aculeatis spinum L. fruticosum aculeatis spinum, aculeis caulibus recurvis, foliis  
oblongis quinquelobis sinuatis, pedunculis unifloris  
dispositum L. fruticosum, ramis distortis aphyllis, aculeis aciculantibus rectis, foliis  
obovatis glabris integris <sup>sub septemlobis</sup> <sup>caulinis, paucis</sup> pedunculis unifloris  
sanctum L. fruticosum, aculeis tomentosis foliisque oblique subcordato-ovatis  
repandis reticulis subtus aculeatis  
coagulans L. fruticosum, foliis oblongis repando-sinuatis tomentosis aculeatis:  
lobis rotundatis integris aculeis rectis caulibus aciculantibus  
hybridum L. fruticosum, foliis ovatis subinermibus acutis repandis, venellis dorso  
et ad ovaria violaceo pulverulentis  
solenneum L. fruticosum, foliis ovatis subrepandis uno albore aculeae ornatis  
subtomentosis  
tomentosum L. fruticosum aculeis acerosis, foliis cordatis inermibus subrepandis  
venellis purpureo-pulverulentis  
cordatum L. fruticosum tomentosum, foliis cordatis ~~laevibus~~ lanceolatis attenu  
tis subrepandis

polygamum l. fruticosum, foliis ovato-oblongis subrotundis supra scabris <sup>in</sup> <sup>subtus</sup> <sup>tomentosis</sup> <sup>puberulis</sup>

bohamense l. fruticosum, foliis lanceolatis repandis obtusis margine reflexis, <sup>in</sup> <sup>subtus</sup> <sup>tomentosis</sup> <sup>puberulis</sup>

cyneum l. fruticosum, foliis lanceolatis attenuatis integris basi utraque revolutis, <sup>in</sup> <sup>subtus</sup> <sup>tomentosis</sup> <sup>puberulis</sup>

lanceolatum l. fruticosum, foliis lanceolatis integris basi utraque revolutis <sup>in</sup> <sup>subtus</sup> <sup>tomentosis</sup> <sup>puberulis</sup>

spinosissimum l. fruticosum, foliis lanceolatis integris basi utraque revolutis <sup>in</sup> <sup>subtus</sup> <sup>tomentosis</sup> <sup>puberulis</sup>

obscureum l. fruticosum, foliis ellipticis lanceolatis planis, <sup>in</sup> <sup>subtus</sup> <sup>tomentosis</sup> <sup>puberulis</sup>

niveum l. fruticosum, foliis ellipticis integris <sup>in</sup> <sup>subtus</sup> <sup>tomentosis</sup> <sup>puberulis</sup>

separatilis l. fruticosum, foliis cordatis integris, corollis subregularibus, <sup>in</sup> <sup>subtus</sup> <sup>tomentosis</sup> <sup>puberulis</sup>

unicatum l. fruticosum radicans, ramis mucronatis, foliis <sup>in</sup> <sup>subtus</sup> <sup>tomentosis</sup> <sup>puberulis</sup>

puberula l. fruticosum fruticosum, foliis lanceolato-ellipticis integris <sup>in</sup> <sup>subtus</sup> <sup>tomentosis</sup> <sup>puberulis</sup>

respitifolium l. fruticosum, foliis ovato-lanceolatis sessilibus <sup>in</sup> <sup>subtus</sup> <sup>tomentosis</sup> <sup>puberulis</sup>

villosum L. fruticosum aculeis recurvis, foliis ovalibus subintegris canescentibus  
inermibus.

lobatum L. fruticosum glabrum, foliis angulato subquinquelobis <sup>ovalibus</sup> ~~caulis aculeis~~  
~~recurvis~~, pedunculis unifloris calycibusque inermibus

trilobatum L. fruticosum, foliis <sup>lanatis</sup> lanceolatis trilobis glabri obtusis inermibus, pedunculis <sup>sub</sup> unifloris

Caulis spinosus

Lycioides L. fruticosum, ramis spinis scabris, foliis ellipticis.

scabrum  
flexuosum

Solanum caule aculeato fruticoso, foliis lanceolatis dentato-pinnatis  
et obtusi margine planis racematis cæterulis  
Solanum bahamense Forst. descr. pag. 46

*Solanum violaceum* caule fruticoso aculeato, foliis cordatis lobato sinuatis, petiolo pedunculi calyubusque aculeatis, racemis fasciatis Oth. Jac: pag. 56

Habitat in Botany Bay

Erigitur undique aculeatum, ulnaris. Caulis erectus, a radice ramosus, subtenuis, superne compressus, levis et tomentosus, violaceus, nitidiusculus. Folia petiolata, sparsa, cordata, lobato sinuata, obtusa, tomentosa, patentia. Petioli teretes, foliis parum breviores. Aculei caulium incurvi, foliorum recti, inaequales. Pedunculi racemi fasciati, racemosi, pauciflori. <sup>ramulorum</sup> latiora altera uniflora. Flores nutantes, secundae. Pedicelli longitudine fere foliorum florum. Calyx aculeatus. Corolla dilata violacea, calyce quadruplo longior. Bacca magnitudine cucurbitae Othym

non vidi

~~Cucurbitum. caule suffruticoso inermi glaberrimo, foliis pinnatifidis: laciniis lanceolatis acutis, paniculis axillaribus binis ternisve Hort.  
Newspap. 277.  
Habitat in Nova Zelandia~~

Solan. gemmatum calyce campanulato, 2 dentato Stamene  
1 reliquis longior

michi ignota

Remondale V.



irregular  
cordatum Solanum foliis cordatis integris supra villosis subtus tomentosis, flori  
tristetrandris racemoso  
Habitat herb. Guisoti

Rami teretes, inferne inermes, tuberculati, superne villosi canescentes, adpressi aciculis frequentissimis, rectis, flavis, nitidis semiunguicularibus, basi dilatatis, teretibus. Stipulae petiolatae, 2-3 pollicariae, cordatae, acutae, integrae, supra villosae crebrae nervosae, aculei pauci in costa subtus, tomentosae subtus tomentosa inerme. Petioli bipollicariae, superne aculeo uno alterove, interdum inerme. Racemi laterales. Peduncululi aculeati. Pedicelli unguiculares, flavescenti tomentosi, ut flores extant. Calyx parvus, quadrifidus dentatus. Corolla laciniis quatuor, lanceolata-foliolata, duo breviores. Stamina 4. tria brevissima, 1. reliquis triplo longior. antherae attenuatae.

Diversa a S. cordato ex herbo Madagascariensi

rigidum Solanum foliis <sup>ovatis</sup> dimidiato-subpinnatifidis pinnis acutis subdentato-angulatis villosis; pedunculis subtrifloris

Solanum rigidum; aculeatum, frutescens, humile, foliis ovatis, pinnato-angulatis, aculeatis, nudiusculis: aculeis rectis, albidis La Mark.  
Illustr. 2. p. 23.

Patna ignota Herb. La Markii 5

Caulis pedalis, erectus, rigidus. Rami teretes superne villosi. Aculeis in caule, foliis utrinque, petioli, calycibusque, rectis, compressis, glabris, flavis, basi fuscis, minoribus in caule, majoribus in foliis. Solia tri-polliciana, dentato-subpinnatifida, venella incana, adulescentia villosa: laciniis ovatis, raro subdentato-angulatis. Pedunculi brevissimi.  
Affine videtur Sol. melongena adwerpium ut mihi videtur.

pelosellophus P. folia lanceolata integris sessilibus margine pelosi, pedunculis  
elongatis laxe ramosi Kenigst.

Habitat in oriente

Caulis tereti leviter pelosi prostrati. Folia ciliata. Flores parvi  
~~pauciflori~~ ~~caespitosi~~ ~~caespitosi~~ ~~caespitosi~~ ~~caespitosi~~ ~~caespitosi~~ ~~caespitosi~~ ~~caespitosi~~ ~~caespitosi~~ ~~caespitosi~~  
axillares plerumque folio longioribus. bractea minuta ad dorsum  
folia calycis villosa ovata acuta

Convolvulus orientalis du Ruyf. pelosello. foliis Tournef.  
cord. maj. 1.

non vidi

caulis prostrati

Argenteum Solanum foliis oblongo lanceolatis <sup>subtus</sup> ramis argenteo nitidis, pedunculis gemi  
natis unifloris  
Habitat in Brasilia herb. Guss. 5

Rami alterni, teretes, argentei, nitidi. Folia petiolata, 2-4 polliciana, lato-lan  
ceolata vel oblongo-lanceolata, obtusiuscula, mucronata, attenuata, integerrima,  
venis venosa, utrinque nitida, subtus argentea more Elagni. Pedunculi  
superne, <sup>gemi</sup> caeterales, anguiculares, geminati, uniflori, petiolo parum longiore. Caly  
cis laciniis ovatis, argentei.

virgatum *Solanum* foliis elliptico lanceolatis <sup>canescentibus</sup> pubtus tomentosis, umbellis terminali  
<sup>in uel duobus</sup> bus sessilibus, calycibus decemdentatis

*Solanum virgatum*, caule inermi, frutescente; ramis virgatis; foliis ovato  
acutis, pubtus tomentosis, umbellis sessilibus La Mart. Det. bot. Fl. West

Habitat in <sup>2. p. 15.</sup> Canariis? herb. Thourin 5

*Triticifolium*, inermis. <sup>Rami</sup> Caulis inferne glabri, <sup>Dichotomi</sup> superne tomentosi incani. Folia petiolata,  
bi-<sup>3.</sup> tripollidaria, elliptica lanceolata. Pedunculi utrinque acuti, supra <sup>apice</sup> ~~apice~~  
lato-pilosa punctata, pubtus canescentia. Pedunculi in apice ramulorum cum  
foliis, umbellati, plures incano-flavescentes, uti calyces. Calycis 10 dentati.  
Corolla lobi ovati, violacei

reticulatum Solanum. foliis ellipticis utrinque venoso-reticulatis subtus argen-  
teis ferrugineis punctatis. pedunculis <sup>sub</sup> geminis bifidis.

Habitat in Brasilia. herb. Turic. 5

Inermis, frutescens. Rami angulati, crassitie penne Cygnae,  
Tomentosi, nullo canescentes. Folia petiolata, pedalia et ultra, integra  
basin versus pensim <sup>nanum</sup> angustata, acuta, supra glabra nitida, sub  
tus argentea punctisque minutis ferrugineis ut in Cappanda  
puteo adspersi. Petioli angulati sesqui pollicares. Pe-  
dunculi laterales, gemini vel terni, semel vel bis bifidi. Flores  
breviter pedicellati, racemosi, secundi. Calycis lacinae ovatae.  
Cordis lacinae lineares, uti pedunculi ferrugineo tomentosi.

geniculatum  
municatum Solanum.

Habitat in fl. Domingo h. d. Despat 3. ~~Arctica~~ <sup>geniculati</sup>. Diffusi  
Inermis. Caulis fruticosus: rami dichotomi, <sup>flexuosi</sup>, <sup>ad solum</sup> divariati, glabri; cortice  
purpureo, et punctis elevatis punctati. Folia petiolata, <sup>inquinulana</sup>, altero  
<sup>geminata</sup> <sup>ovata</sup> <sup>terminalia</sup> <sup>trijugum</sup> <sup>tertia</sup> <sup>lateral</sup>  
parva majora, integerrima, oblonga, majus altero latere <sup>parum</sup> brevius, supra  
glabra, avenia, coria, remote oblique lineata, subtus tomentosa, nerva, nerva  
terminalia <sup>et ter</sup> <sup>ordinales</sup> <sup>ternaria</sup>. Pedunculi axillares, solitarii, uni flori, glabri, longitudine  
folia. Calyx glaber truncatus, squidentatus. Baccis magnitudine Conandi.

genuculatum Solanum foliis ovatis subtus <sup>niveo</sup> ~~caerules~~ tomentosis, ramis dichotomis  
flexuosis mucronatis, pedunculis unifloris

Habitat in St. Domingo herb. Desfontaine.

Caulis ramis si simus. Rami diffusis, a foliis ad folium flexuosi, genu-  
culati, divaricati, glabri, cortice purpureo, punctis elevatis adspersi.  
Folia petiolata, ~~semi~~ <sup>semi</sup> pollucaria geminata, terminalia ramorum ter-  
na, semi pollucaria, lateralia parva nervosa, ovata vel ovato oblonga,  
integerrima, supra glabra, laevia, acuta, remote obliqua lineata, subtus  
nervosa. Pedunculi axillares et terminales, solitarii, glabri, longitu-  
dine foliorum. Calyx glaber, truncatus, quinquedentatus. Bovis mag-  
nitudine Coniadi.

*(written upside down)*  
genuculatum Solanum foliis ovatis ~~oblongis~~ <sup>oblongis</sup> supra laevibus subtus ~~nervosis~~ <sup>nervosis</sup>  
tomentosis, ramis dichotomis ~~flexuosis~~ <sup>flexuosis</sup> mucronatis



*Crotonodes Solanum.*

Habitat in America horti Guss.

Rami Veretes <sup>fusco, acuminati</sup> incani, apice ferruginei, superne a petiolo parum decurrante angulati, <sup>in ramulis sive pinnatis, altero simplici, minor</sup> alio uno alterove brevi. <sup>integerrime venoso</sup> Solia petiolata, bipollicana, ovato-lanceolata, acuta, supra glabra, nitida, <sup>petioli brevis, tomentosi</sup> secundum venas lineata, subtus incana <sup>subris, raris et brevibus</sup> tomentosa, adulta supra nigro punctata, altero latere breviora. Pedunculi laterales, solitarii <sup>flavo</sup> tenuiflori. Calycis laciniae uti corolla extus <sup>flavo</sup> incanae, lanceolatae. Calyx 4-dentatus. Corolla parva al. obscure diversum <sup>et que fida: laciniae lanceolae.</sup> Anthera 4 longitudine corolla. Stylum non vidi a 2-dicium vel polyga 4 brevis. Flores umbellati, sive <sup>flavo tomentosi</sup> mum.

negosum Solanum. foliis elliptico-ovatis integris, <sup>utroque acutis,</sup> glabris sublaevibus, <sup>floribus</sup> racemosis  
secundis

Baifera ~~caulis~~ syriaca Aubl. fl. Guian. p. 217. tab. 85

Habitat Cayennae (est Richardi) sylvis umbratis herb. Richardi 5  
Inermis. Caulis fruticosus, 4 pedalis: rami glabri. Folium petiolatum, semper  
ovale, elliptico-ovata, utroque acutis, integerrima, articulim nervosa, are-  
nea, glabra, sublaevia & racemulis axillaris, solitariis & glanceis, revoluti-  
floris secundis, duplici serie, residui: cal. phyllis, turbinateis, obtusis  
quenque dentatis. Corolla regulari, subrotata. Lobis sive partibus  
laciniis ovatis cum acuminulo, inter se versis, sub pubescenti. An-  
theris sive, corolla duplo brevioris, in globum con ni versis, apice dehi-  
scens. Germe subrotundum. Stylus erectus. Stigma simplex, obtusum  
Bacca 2 loculari. Semina indurata, plurimos, sub reniformia: bac-  
ca immatura tantillum compressa utroque marginis acuta, negosa

eritoroides Solanum foliis ovato lanceolatis supra glabris nitidis, subtus tomentosis  
80 incanis, umbellis lateralibus.

Solanum eritoroides: fruticosum, aculeatum; foliis elliptico lanceolatis,  
supra glabris, subtus tomentosis, inermibus; aculeis rectis, rariusculis. La Mart.  
<sup>Illustr. p. 2. p. 24.</sup>  
Habitat in Martinica herb. Fuscoi?

Rami teretes, tomentoso incani, apice ferruginei, superne petiolo parum  
decurvante angulati, Stipuli sparsi, haud frequentes, parvi, teretes, recti,  
inæquales. <sup>90ne</sup> Folia petiolata, bipolliciana, plerumque globosa, interdum in  
ramulis geminata, altero minore, <sup>altero latera breviora</sup> a luta, integerrima, supra nitida,  
subsenosa, secundum nervos lineata, subtus venis sub simplicibus exserti-  
bus, ad utrumque supra nigro punctata. Petoli breves tomentosi. Pedunculi  
ut petioli inermes, incani, globosi, flores quinque semina quicquidari;  
ferrugines tomentosi: pedicelli squæ, nitidæ. Flores minuti. Calyx  
4 dentatus. Corolla profunde 4 quefida. lacini lineares, sti extus uti calyx  
ferrugines tomentosi. Ar divida vel polygona?

4 Stamina  
400

~~Stamina 400~~

azureus Convolvulus caule petiolis et foliis ad nervos et oras puberulis  
foliis omnibus oblongiuscule cordatis, pedunculo fasciculato  
multifloro Act. Soc. Sci. N. Paris. 1. pag. 107.  
Habitat in America merid.

Convolvulus pentanthos Jacq.

microphyllum Solanum foliis oblongis integerrimis villois

Aquaticum microphyllum; foliis minimis integris subnudis; aculeis subgemini-  
natis patentibus La Mart. illust. 1. p. 327. t. 82. fig. 2.

Habitata St. Domingo Herb. La Martii f

Trunculus v. uno v. rami patenti, tenues, teretes, rigidi, glabri: ramuli subiacenti  
aculei gemini, stipulares, ad basin foliorum et ramorum et foliorum,  
unguicularer, patentes, aciculares, rigidi: folia petiolato, vix hemis-  
guicularia, rarisima extorsum dente minuto incisa, obtusa, stellata  
retusa. Pedunculi axillares, solitarii, uniflori, spina longiora. Flores un-  
guicularer. Calycis et corollae laciniis linearilanceolato, extus cano.  
Corolla calycis longior

Genippa

menan

Habitat in Guiana C. Blond dedit La Marti

Rami <sup>uli apice oppositi lob</sup> hirsuti. folia brevissima petiolata, pedalia, acuminata, villo-  
sa, <sup>state</sup> ad utraque supra glabra, costa subtus hirta, subtus pulchre venosa,  
subcostata. Pediculi in apice, brevissimi, plures, uniflori. Corolla hirsu-  
tissima, basi apiceque subsessile calycis dentibus subulatis

Genippa menana omnibus partibus hirsuta folus oblongo  
obovatis, floribus in axillis mixta congestis, fructu depresso  
globoso hirsuto Act. Soc. h. nat. Paris t. pag 107

Duroia laxaule Lin.

niveum Solanum foliis pinnatifidis - subtus nives tomentos; laciniis ~~connatis~~ lanceolatis brevioribus

<sup>in</sup>  
Habitat in Brasilia.

Caulis herbaceus, sesperne, uti petioli, folia subtus, nervosa utrinque et basi aculeorum nives tomentosi. Folia petiolata, pinnatifida: laciniis lanceolatis, acutis <sup>laciniis acutis,</sup> pinnatis, basi subcordatis, 3-4 pollicaria, etate supra glabra. Aculei compressi parum recurvi, auranti, basi fusi. Petioli uti vena major utrinque et in aculeati.

brasilianam Solanum foliis pennatifidis subtus subpilosius <sup>laciniis</sup> pinnis laciniolatis

Habitat ad Rio Janeiro <sup>reducens a Gualeatopemi</sup> herb. us. ad

Caule herbaceo? pilosus, superne incanus; ad presens aculeis conoposiformis, rufescentibus, subulatis, compressis rectis, unguiculatis, interspersis minoribus aciculatis.

Folia petiolata, pedalia, pennatifida, supra glabra, subtus pilis rarisimis solitariis, utraque aculeis frequentes in costa et nervis, saepe semipollicares: laciniis

<sup>H vel alter</sup> oppositis lanceolatis <sup>no</sup> dentato-sinuatis, palmatis et ultra, extenuatis et intima minoribus, dentes ovatis mucronatis, later <sup>alter</sup> dexte uno altero se. Petiolus bi-

pollicari. Pediculi laterales, incani, aculeatis simi. Calyx aciculati aculeatus, profunda quinquefidus: laciniis lanceolatis. Corolla magnitudi-

udine s. tuberosi, albisima, immaculata, venenissima. Fructus coriacea

confer cum 9049



peripterisifolium Solanum caule fruticoso inerme, foliis ovatis glabris integerrimis ~~floribus~~ <sup>paniculatis</sup> cymis ~~caulis~~ <sup>terminalibus</sup> bifidis  
hab. in Bonaria

Rami teretes glabri,

Folia <sup>majora</sup> alterna, petiolata, ovata, integerrima <sup>minora</sup> ~~obovata~~, glaberrima, patentia pollicaria. Ramulorum oblonga <sup>attenuata</sup> ~~obovata~~ <sup>et obtusa</sup>

Petiolus longitudine folii.

Pedunculus oppositifolius bi-3 pollicares, glabri teretes, flores <sup>cymosi</sup> paniculati. Pedicelli filiformes apice crispores <sup>et clavati</sup>

<sup>pollicariis</sup> Calyx subquiescens glaber, laciniis oblongis obtusis subrotundis.

Corolla fannacea

Dulcamara L. caule inermi frutescente flexuoso, foliis superioribus hastatis,  
racemis cymosis Linn. V. Hb. Dan. 607.

Solanum scandens s. Dulcamara Bauh. pin. 167.  
β. Solanum dulcamarum africanum, foliis crassis hirsutis Dill. Elth. 365.  
t. 273. fig. 352.

Habitat in Europæ siccis humilibus &  
glaber inferne lignosus ramis herbaceis verticillatis oculo armato per  
pubescenti. Folia petiolata remota, tri- & tripolliciana altero latere  
interdum aequalia integerrima acutiuscula parum attenuata, venosa  
integra vel basi altero latere vel utraque laciniâ lanceolata extus  
latiori hastata interdum superiora solum interdum fere intermedia.  
Pedunculi laterales longitudine foliorum bifidi pedicelli subracemo  
si calycis laciniâ subrotunda corolla violacea profunde quin  
quefida laciniis lanceolatis. Baccæ globosæ magnitudine pipere

suffruticosæ — foliis integris hastatisque

*Cucurbitaria*  
*arviculare* <sup>sup</sup> caule <sup>sup</sup> fruticoso foliis lanceolatis integris pennatifidisque gla-  
bris, nodis axillaribus subimpositis  
*Solanum arviculare* caule inerme fruticoso, foliis pinnatis pinnis  
trifidis: corymbis terminalibus. Forst. prodr. pag. 10.

Habitat in nov. zelandia  
Rami purpureo-fiantes glabri. Folia petiolata subarenaria, pal-  
maria transverse nervosa utraque acuta basi equalia attenu-  
ata integra <sup>et</sup> pinnis solitariis vel ab utraque latere lan-  
ceolata. pedunculis ex axilla et axillaribus brevibus flori-  
feris natisque pedicellis angulatis calycis lacinis ovatis  
glabris uti corolla

*Soltanaria* <sup>arviculare</sup> caule suffruticoso inerme glaberrimo, foliis pennatifidis  
laciniis lanceolatis acutis pedunculis axillaribus brevibus ternis  
ve. Hort. kew. 1. pag. 247.

*Solanum arviculare* caule inerme fruticoso, foliis pinnatis  
pennatifidis corymbis terminalibus Forst. flor. Inf. II.  
pag. 10.

~~una laciniata invenitur eadem planta est~~

castratum Solanum fruticulosum inermis <sup>concoloribus</sup> foliis oblongis trilobis hastatis glabris floribus  
racemosis

Habitat in Brasilia

Fruticulus digitalis parvus, basi subramosus, Rami simpliciter, glabri, dense

ves  
folia alterna petiolata, <sup>canaliculata semiunguicularia supra basi</sup> oblonga in medio auriculis binis patentibus  
obtusis, ~~intermedia productione~~, <sup>obtusis</sup> basi ~~obtusis~~ <sup>lobis</sup> integerrimis obtusis

<sup>sem</sup> Pedunculi lateralis vel terminalis altitudine Rami Veses glaberrimi

tripollicares, Pedicelli racemosi, unguiculares, sursum crassiores

Flores nutantes <sup>Solanum tuberosum</sup> magnitudinis ~~plante~~ <sup>Solanum tuberosum</sup> ~~magnae tuberosi~~ duplo minoris

lacina foliola Calicina oblonga obtusa  
lacina corollae lanceolata acuta

quercifolium / caule inermi subherbaceo angulato, flexuoso scabro, foliis  
pinnatifidis, radicis Lymphi Lin. spec. pl. pag. 2647  
Solanum foliis quercis: Bauh. pinus. 722. 7. 15.

Habitat in Peru 4

Habitat Dulc'amara. Caulis angulatus erecti, scabri. Folia lancea  
oblongo-lanceolata in petiolum decurrentia, venosa, glabra, subtus  
scabra pinnata ~~fructu~~ subpinnatifida laciniis obtusi. Peduncul.  
ramosi. Corolla rotunda maculis duabus viridibus ad basin singuli  
lobi. Bacis ovata lris

Legura Fenseloi an hinc spectet an  
solia cultura mutatur  
an mea sola  
cultura ~~differt~~?  
an Solanum hastatum  
hinc spectet cultura  
non videtur Tusi

erecto pinnato pinnatifidis laciniis ob  
scurand. specimen herb. Schum. ex holo paniceo vix  
nisi magnitudine florum differt ideoque spectemur vix  
etiam quod si sed nullo modo cum figura hinc conveniunt

radicans. caule inermi herbae loco teretis sculo prostrato radicante, foliis  
pinnatifidis, racemis cymosis Linn. decad. 1. 7. 10\*

Habitat in Peru. 4

Caulis subangulatus & petioli parum decumbentibus saepe raris pilosus. Dactyloctenium

ad gemmula  
radicans. Folia petiolata, pinnatifida laciniis utraque duo vel tres lanceolatis  
utrinque angustioribus apice acuti inferius minoribus glabris  
integerrimis oppositi intimi alterni minoribus. Racemus brevi  
lateralis calycis et corollae laciniis ovatae glabrae. Baccis sub  
globosis, flavis magnitudine Ruperis

caule folisque teretibus

Differet proterea laciniis 5que nec septem ut in quibusdam foliis  
in olla plantata evadit erecta nec radicans sed quoque frutescit in semine

quodque loco  
planta quasi vidi gaudet caule perenni erecto

laciniis acutis

an igitur haec radicans sedem minima caule  
Linn. Caull. convenit

bombax L. inermis, foliis ovalibus integerrimis, racemis corymbose saepe  
herb. pag. 49

Habitat in America meridionali circa Carthagenam;

Arbustula 12 pedali comosa. folia in planta juniore saepe  
pedala. floris parvi albi saepe obtusa basi acuta scaberrima

Raniflorae folia ovali oblonga utraque attenuata scabra subtus tomentosa  
opice fusi pilis ~~racemi bipedali~~ <sup>supra e pilis minutis stellatis punctata</sup>, subtus e pilis densioribus  
stellatis minutis  
adpressi pallidiora. Racemi longitudine foliorum

— floris racemose

non vidi

Vitis Solanum Caule inermi frutescente, foliis lanceolato-oblongis subrepandis glabris, radice subymosis Tacq. hist. pag. 80. Tab. 40. fig. 2.  
In martinica legit Dr. v. Rohr. ex herb. Dr. Lund

Rami teretes, glabri

Folia petiolata, palmata et ultra, elliptico-lanceolata, glabra, nervoso-venosa acuta, per petiolum parum decurrentia, integra vel obscure repanda.

Pedunculi laterales pollicares, multiflori. Flores cymosi.

Calyx brevis glaber: laciniis rotundatis.

Corolla laciniis lanceolata.

Solanum basiliense frutescens capice: foliis basiis rubri Bauh.  
prop. secund. herb. Turf.



~~apostala Oka~~

havanense Solanum caule inermi frutescente, foliis lanceolatis nitidis integerrimis, pedunculis subbifloris Mart. 47. R. S. V. p. 223. Jacq. Amer. 49. 835.

Habitat in Martiniensis sylvis umbrosis, maritimis 5.

Flores et baccæ cœules L.

Caulis fruticosus, 3-4 pedalis, ramosus, inermis; ramis erectis terribus, glabris. Folia alterna petiolata, oblonga, basi cuneata, apice brevi obtuse, integra, nervosa, utraque glabra, infra pallida, crassora. Racemi rari terminales, solitarii, 4-7 flori. Flores pedunculati. Pedunculi uniflori, breves. Calyx semispartitus: laciniis oblongis perpendicularibus margine albo coloratis. Corolla magiscula cœulea: limbo semiquinguefidis: laciniis latis, plicatis R.

havanense Sol. caule inermi frutescente, foliis oblongo lanceolatis integerrimis nitidis, racemis axillaribus R. obs. pag. 82

*Ligustica Achillea*

racemofum 1. caule inermi frutescente, foliis lanceolatis repandis undulatis  
undulatis, racemis longis erectis Lin. Mant. 47. Jacq. Am. 50. T. 36

Habitat in Martinica 5

Simili Sol. ignea diversa tantum absentia aculeorum Racemi  
interdum compositi. bacca magnit. pupari rubra

~~vel interdum~~ ~~racemi~~ ~~terminati~~ ~~racemi~~ ~~specimen est herb. huj. foliis~~ ~~oblongo lanceolatis~~ ~~obtusis~~ ~~brevibus~~  
~~malei pluribus~~ ~~foliis palmatis~~ ~~juniora tomentosa~~ ~~majora utraque e pilis minus~~  
~~vel recurvis~~ ~~com~~ ~~stellatis punctata~~ ~~et ab~~ ~~supra~~ ~~glabra~~ ~~calyx~~ ~~parvus~~ ~~et dentatus~~  
~~nostris~~ ~~tunica~~ ~~molle~~ ~~lineari~~ ~~extus~~ ~~reticulata~~

attenuatis

Pluken. 227. fig. 2. secund. herb. Sallust

macrocarpum L. caule inermi suffruticoso, foliis cuneatis repandis glabris.  
Lin. Mant. 205. \*

Solanum arborescens, angulato <sup>bispito</sup> foliis fructu luteo maturo tenui  
Parr. 3. p. 61. t. 46.

Solanum arborescens, foliis angulatis, fructu aureo Plum. 1. 224. fig. 4

Solanum caule inermi suffruticoso, foliis oblongo-ovalis sinuatis gla  
bris Mill. G. 294.

Habitat in Peru 5

Caules suffruticosi erectus, uti tota planta glaber virens, cespitibus di  
giti levis, ramis annuis erectis. <sup>breviser basi</sup> folia petiolo <sup>aequalia</sup> ~~decrasso~~, magna  
basi ~~vix~~ angustata per petiolum decurrentia repando sub-<sup>germini</sup> ~~perna~~  
4a obtusa simpliciter venosa. Pedunculis lateralibus 3-5 <sup>alter</sup> ~~floris~~  
bracteis <sup>alter</sup> unifloris validioribus <sup>et</sup> ~~bracteis~~ <sup>pluris</sup>  
pennis. Calycis laciniis <sup>caricolato</sup>. Bacis magnitudine pomi  
globosa, flavo subsericeis

Zanoni 1. tab. 158.

an Plumieri idem cum Zanoni cum Plum: suum caulem  
arborescens assignat quod minime cum nostra convenit

Tuberosum L. caule inermi herbaceo, foliis pinnatis integerrimis, pedunculis  
subdivisis. Lin. S. V.

Solanum tuberosum sp. alentum Bauh. prod. 89. t. 89.

Habitat in Peru: innotuit Bauhino 1590 7.

Radix tuberosa. Caulis bi-3 pedalis rubro punctatus. Petioli decurrentes.  
Soleola 5:7. subrotunda hirsuta impari major.

interrupte pinnatis

~~Specimina non possideo conferenda igitur illa cum planta tabacii sub hoc  
nomine cui corolla lacini unica reliquis major videtur~~

debile Solanum Paule herbaceo: inermi, <sup>lato</sup> foliis lanceolato ellipticis glabris integerrimis,  
Pedunculis umbellis lateralibus

habitat in Ins. Domingo

Rami herbacei teres ~~fulci una alterave~~ inferne laves superne sulcati glabri  
tenuis.

Folia petiolata, <sup>lanceolato elliptica,</sup> alterna, interdum <sup>altero minore</sup> bina ex eodem puncto, integerrima, plana  
<sup>basia</sup> utraque acuta, <sup>apice acuminata</sup> glaberrima altero latere interdum angustiora

Pedunculi inter in medio axis supra foliacea, inferne in medio inter  
stitutionem, filiformes patentissimi.

Flores umbellati, umbella pauciflora <sup>5-6</sup> floribus ante inflorescen-  
tiam cernui, pedicelli filiformes apice crassiores.

Calicis calycis oblonga.

Corolla extus farinacea

parviflorum Solanum herbaceum, inermis, foliis ovatis integerrimis glabris umbellis  
lateralibus

Habitat in Java

Caulis herbaceus rami <sup>geminati</sup> vertes <sup>altero minore</sup> striati glaberrimi <sup>acuminati</sup>

Foliis supremis <sup>pubescentibus</sup>, petiolatis ovatis, basi <sup>obtusis</sup> ~~obtusis~~ integerrimis, acutis  
planis, glaberrimis, pollicatibus.

Petiolus planus folio dimidio brevior

Pedunculus e latere parum infra foliis, filiformis vertes, erectus  
pollicaris. Flores nutantes parvi, pedicelli capillares

Calycis foliola oblonga acuta

82

————— geminatis altero minore

————— basi acuminati



~~in equilateralibus~~ ~~sub~~ ~~rubrum~~ glabris, epifernis  
P. foliis geminatis altero minore ovatis basi pedibus  
lati <sup>interiusque</sup> umbellulis lateralibus pedunculatis

Habitat in India orientali

affine nigro: Caulis angulatus adpressus <sup>utrinque</sup> <sup>minus ornato</sup> puberulus  
ramis ramulosis. Folia attenuata basi dente  
uno alterove obtuso <sup>m</sup> glabra tenera bypochloria  
altero dimidio minore. Pedunculi unguiculares  
potentispermii pubescentes Pedicelli quatuor vel  
5que flores parvi. Bractea magnitudine bipenni

ou rubrum lina

~~Corymbosum L.~~

~~Solanum corymbosum Jacq. Coll. 1. pag. 70.~~

~~Habitat in Peruvia 7~~

~~Habitat S. Dalmatiae, inermis. Caules plures crassitie calami, teretes. basi perennantes ramosi alii erecti alii debiles procumbentes. Folia ovata ad petiolum attenuata, glabra, acuta integerrima. Racemi oppositifolii, crassitie, bifidi: 3-4 fidi multiflori foliis brevioribus. Flores parvi. Corolla cremulea. Bacca aurantia, magnitudine pepi minoris Jacq.~~

conf. Nutt. obs.

rubrum Solanum caudice inermi subperennante, foliis geminis ovatis integerrimis,  
pedunculis subumbellatis Kn. f. v. p. 224.

~~Habitat in America~~

non vidi

nigrum L. caule inermi herbaeo, foliis ovatis dentato-angulatis, racemis  
distichis nutantibus fl. Dan. T. 460

vulgatum & Solanum officinarum Bauh. pin 166

Solanum caule inermi herbaeo, foliis ovatis angulatis. Len. vind. Cliff.

patulum  $\beta$  <sup>15</sup> rami teretibus glabris, foliis integerrimis glabris

Solanum procenae patulum vulgare fructu Dill. Elth. 367. t. 275.

fig. 355

vellosum  $\gamma$  rami teretibus villosis, foliis angulatis serrulosis

Solanum annuum hispanicum, baccis luteis Dill. Elth. 366. t. 274.

fig. 353

guineense  $\delta$  rami angulatis dentatis, foliis integerrimis glabris

Solanum guineense, fructu magno infra laseo Dill. Elth. 366. t. 274.

fig. 354

Solanum patulum Jacq.

virginicum  $\epsilon$  rami angulatis dentatis, foliis repandis glabris

Solanum nigrum vulgari simile, caulebus etiam peratis Dill. Elth.

360. t. 275. fig. 256.

Judaeum  $\zeta$  rami aculeatis incurvis, foliis repandis nudis

Habitat in oris horti cultis ☉

vulgatum a Caulis angulatus ramosus, vellis rarisimis adpressus. Folia bipollicaria acuta  
dentibus 4 vel 6 angulata basi per petiolum decurrentia. Pedunculi subpau  
bescentis 4-6 flori pedicelli subumbellati ramosi fructiferi penduli. Fructus  
baccis magnitudine rubrorum, nigro floribus albis

13.

villosum. Rami uti angulati uti reliqua planta villosa dentes foliorum frequentiores  
quam in vulgatum flori minoris

foliis dentato angulatis glabris caule angulato angulis mucronatis umbellis nutan  
tibus baccis rubris

rubrum caule lavi angulato glabro foliis oblongo ovatis attenuatis dentato angulatis  
integrisque umbellis nutantibus baccis rubris Nelen. t. 73. Rhed. bot. 11.

sinuatum caule angulato striatopulso foliis dentato sinuatis serrulosis non villosis  
e cap. 6. p. 114. t. 73.

varietas a minima varietas secund. Sprengel differt quod omnibus partibus major in eo  
dem loco ac negrum 2) catheni fuscis nec flavis 3) foliis integerrimis 4) quod  
senius floret.  
canescens caule vix villosa <sup>vulgo</sup> incanus foliis ovatis integris angulatisque <sup>calycis</sup> villosis calycibus  
incanis et anabia fructu nigro

22 negrum vellosum Solanum ramis teretibus ~~et~~ vellosi, foliis angulatis  
subullosi Linn. Spec. pag. 266.

Solanum egyptiacum Boiss. descr. pag. 46. n. 50

negrum hirsutum foliis ramis teretibus foliisque integerrimis hirsutis

Solanum fructu negro, foliis integris vellosum Boiss. descr.  
pag. 46. n. 51.

~~Volubilis~~  
Scandens Solanum inerme, caule volubili, foliis cordatis ovatis dependens subtus  
Scandens mollissimis, paniculis terminalibus Lin. suppl. p. 147 \* s. v

Habitat in Surinamo.

Caulis herbaceus, volubilis, teres. Folia alterna, petiolata, ovata s. cordata, remota.  
Racemus terminalis, compositus ex tribus s. quatuor simplicibus. Calyx vix  
divisus. Corolla rotata: petalis lanceolatis, recurvis. Bacca globosa magni-  
tudine Cerasi, calyce brevi, sub fructu cordato gibboque quinque toculis  
Lin. l. c.

non vidi

quadrangulare) caule inermi herbaceo tetragono scabro, foliis rhombeis  
dentatis integrisque Lin. Suppl. p. 147. & L. V. p. 224

Habitat in Cap. b. p. i

Paulis et petioli decurrentibus <sup>et apato</sup> fere angulatus interdum inferne teres ad ap-  
pici pilis canonicis distinctis <sup>basia arealis</sup> superne ramosis rami tetragoni. folia  
<sup>reticulata</sup> ovato rhombea, integerrima <sup>interdum</sup> ~~reticulata~~ <sup>ad angulum</sup> ~~interdum~~ <sup>veantia</sup> ~~interdum~~ <sup>veantia</sup> ~~interdum~~ <sup>veantia</sup>  
<sup>obtusissima</sup> ~~obtusissima~~ <sup>obtusissima</sup> ~~obtusissima~~ <sup>obtusissima</sup> ~~obtusissima~~ <sup>obtusissima</sup> ~~obtusissima~~ <sup>obtusissima</sup> ~~obtusissima~~ <sup>obtusissima</sup>  
margine panem revoluta bipollicetana superiora minora obtu-  
suscula arearia <sup>interdum</sup> ~~interdum~~ <sup>interdum</sup> ~~interdum~~ <sup>interdum</sup> ~~interdum~~ <sup>interdum</sup> ~~interdum~~ <sup>interdum</sup> ~~interdum~~ <sup>interdum</sup>  
plenumque glabra. canis superiora <sup>interdum</sup> ~~interdum~~ <sup>interdum</sup> ~~interdum~~ <sup>interdum</sup> ~~interdum~~ <sup>interdum</sup> ~~interdum~~ <sup>interdum</sup> ~~interdum~~ <sup>interdum</sup>  
nalis pedicelli versus florem inermis calyces parvi laciniis ovatis  
margine interdum villosi. corolla calyce triplo vel quadruplo longior  
profunda quinque fida laciniis lanceolatis margine apiceque villo-  
sis  
variet. pedunculi villosi et glabri

varietas Sol. Dulci amara eadem cum <sup>delinpta</sup> ~~nostra~~ videtur fere  
maxime simili est specimine illo floribus magis on cytus  
Dillenii ~~figura~~ <sup>huc</sup> revocanda

V. a

rhombico ovatis subdentatis  
eodem descriptione non videtur crassifolium La Martini



lyratum caule inermi herbaceo erecto, foliis lyrate hastatis tomentosis  
Thunb. fl. jap. p. 92. t. V. 224.

Habitat in Japonia

Tota planta dense et obscure tomentosa. Caulis herbaceus, teres, primum flexuosus  
erectus, ramosus. Rami pauci. Folia parva petiolata, ovata, inferiora  
lyrato-pinnatifida, superiora hastata, pollicaria, pinna laterales  
suboppositae, quatuor, rarius plures, integra; terminalis major, acuminata,  
integra. Petiolus folio paulo brevior. Flores vespis summitatis axillares  
et terminales, paniculati. Panicula subdichotoma, pedicelli et calycis  
glori Thunberg

Solanum retrofractum, foliis ovatis glabris, ramulis axillaribus retrofractis, umbellis  
axillaribus terminalibusque sessilibus, calycibus truncatis.

Habitat in America meridionali &c.

Caulis fruticosus, inermis, volubilis? Rami teretes, glabri, flexuosi, <sup>anillares,</sup> ~~loves~~ <sup>rigidi</sup>.

Ramuli <sup>interdum bifurcati.</sup> alterni, retrofracti, pollicares, <sup>apice</sup> ~~apice~~ <sup>flori feris et foliosi</sup> ~~flori feris et foliosi~~,  
folia petiolata, alterna, ovata, attenuata, integerrima, et glabra, <sup>pin</sup> ~~pin~~

pluriter obscura venosa, sesqui pollicaria, duo saepe in apice ramulorum  
aeris munde.

Petioles ramulo dimidio brevior

Pedunculi filiformes, pollicares vel granum minores, aggregati, axillares  
quatuor, terminalis ramulorum ~~plures~~ quinque vel sex, uniflori.

Calyx truncatus, integer, glaber.

Corolla quinque fida, calyce triplo longior: laciniis ovatis.

(Affinis S. geminato differt ramulis validioribus retrofractis, pedunculis  
pluribus, calycibus dentatis, floribus minoribus.)

geminatum

Solanum foliis ovatis integerrimis glabris, pedunculis axillaribus geminis unifloris, <sup>calycibus decemdentatis,</sup> caula pendente.

Habitat Cayenna Dr. v. Rohrt  
Ramis teretes, glabri, <sup>oculo</sup> superne armatis teretes pulverulenti

~~4~~

# Fructus inermis

folia petiolata, alterna, bipolliciana, ovata, attenuata, acuta, in  
tergerrima, utrinque glabra, obscure venosa.

Petoli <sup>fini</sup> pollicares, glabri.

Pedunculi axillares, primum 4. duo <sup>dim</sup> ~~decem~~ cum ramulo alterius  
excrepantes, ~~decem~~ gemini, filiformes, alter longior primum flexus,  
longitudine petoli, alter brevior.

Calyx glaber, <sup>subcampanulatus</sup> corolla <sup>decemdentatus: dentibus</sup> triplo brevior, ~~dentibus~~ <sup>dentibus</sup> saepe lineari-subulatis, equalibus.

Corolla unguicilatis, glabra

(accedit cum insequente ad Solanum <sup>fragacem</sup> stellatum Facchini collect. 4  
May 123

Solanum

13

Solanum longiflorum, inerme, foliis ellipticis integris attenuatis subtus submentis  
sis, racemis lateralibus, corollis quinquepartitis.  
Habitat in Cayenna v. Robt. 5

Frutex. Rami teretes, inferne glabri, superne e illis minutis, stellatis  
sordide cinerei.

Folia petiolata, alterna, remota, tri vel quadri pollicaria, basi obtusa +  
subaequalia, apice attenuata, acuta, integra, integerrima; supra e  
~~et~~ illis <sup>ellipticis</sup> scabris armatis videndis scabris scabra, ad ultimum <sup>se</sup> glabra  
~~fructus sublonge obscure venosa: subtus villosiora; f. v. v. v.~~  
~~id e submentis~~  
~~proferim juniora~~

Petioles semipollicares, incani

Peduncululi superne, laterales; primum breves recurvati, sensim longiores  
et reciores. Pedicelli alterni, octo ad decem, anguicularas.

Calyx tomentosus - incanum? dentibus quinque, subulatis, corolla qua  
druplo brevioribus.

Corolla fere pollicaria, profunde quinquefida: laciniis linearibus  
lati, attenuatis, obtusis, extus tomentosus, intus glabris  
(An a Solano subinerme Jacq. et S. Salu. folio La Mark. Tab. Enc. pag. 14.  
diversum?)